Synthèse ornithologique lozérienne 2017

Association Lozérienne pour l'Étude et la Protection de l'Environnement

Grive mauvis - Rimeize - 05/01/17 - M. Quiot

ALEPE - Montée de Julhers - 48000 BALSIEGES - 04 66 47 09 97 - contact@alepe48.fr - www.alepe48.fr

Synthèse 2017 des observations ornithologiques en Lozère

Cette synthèse est une compilation de **51 839** données (46 102 en 2016) provenant de la base de saisie en ligne FAUNE-LR. Au total 231 espèces sont citées cette année (236 en 2016).

Une donnée est une ligne rentrée par un/une observateur/trice.
•un Tarier pâtre mâle vu un jour sur un site = 1 ligne
•un mâle et une femelle saisis un jour sur un site = 2 lignes
•ces deux mêmes oiseaux saisis par deux observateurs = 4 lignes et autant de fois qu'il y a d'observateurs ou d'individus différenciés
Le tri de ces « doublons » étant très fastidieux, il n'est pas fait. Cependant cela ne change rien aux statistiques en terme de phénologie, de répartition et du total d'oiseaux car on peut distinguer la donnée du nombre d'individus selon la requête faite sur Faune-LR.

Analyse globale des données 2017

Les données en 2017 ne se répartissent pas également dans le temps et dans l'espace, ce qui est classique.
Le mois de mai compile 8092 données contre 2675 pour décembre, écarts habituels... avec toutefois un nombre remarquable de données pour décembre comparativement à mai qui accueille nettement plus d'espèces et de possibilités d'observations qui n'est finalement pas si bien renseigné que cela !
Les espèces les moins notées sont les nocturnes et les espèces forestières.

Histogramme mensuel des données 2017

D'un point de vue spatial, sans surprise encore une fois, ce sont les vallées cévenoles et le grand Est lozérien qui ont le plus de lacunes, moins marquées cependant que les années précédentes ce qui dénote un léger effort de recherche dans ces contrées même si les lacunes cévenoles sautent encore aux yeux tout comme les franges du nord lozérien, le centre Est de la Margeride et les centres boisés des grands causses. Les vallées du Lot et Colagne, le lac de Naussac, le causse Méjean et les gorges, et dans une moindre mesure le Mont Lozère et le causse de Sauveterre, sont les mieux renseignés.
Le **nombre d'espèces nicheuses par maille** va de 3 (Albaret-le-Comtal) à 97 (causse du Massegros), 93 (Saint-Germain-du-Teil et causse de Sauveterre) et 87 (Marvejols).
Dans le même ordre, le **nombre d'espèces par maille** pour 2017 va de 40 à 163 ce qui traduit une amélioration de l'attention des observateurs qui notent plus systématiquement chaque espèce observée sans se contenter des "remarquables".

Nombre d'espèces par maille 2017

Nombre d'espèces nicheuses par maille 2017

Le **quinté de tête des communes les plus renseignées** en 2017 est : Saint-Germain-du-Teil (6757 données pour 154 espèces/sous-espèces pour 225 espèces/sous-espèces au total), Hures-la-Parade (2131-122-179), Sainte-Énimie (1985-128-176), Marvejols (1561-100-146) et Banassac (1256-103-143). Huit communes dépassent les 1000 données en 2017 avec Grèzes, Meyrueis et Saint-Laurent-de-Muret et 13 enregistrent plus de 100 espèces/sous-espèces (en plus de ci-dessus : Ispagnac, Le Buisson, Mende, Saint-Georges-de-Lévéjac et Saint-Bauzile).
Seule Saint-Laurent-de-Veyrès n'enregistre **aucune donnée** en 2017 même si 91 en cumulent moins de 100 (84 en 2016) et 14 moins de 10.
Il reste 13 communes avec moins de 100 données depuis l'ouverture de la base en 2012, par ordre croissant : Julianges (17), Saint-Michel-de-Dèze, Saint-André-Capcèze, Saint-Julien-des-Points, Saint-Andéol-de-Clerguemort, Saint-Privat-du-Fau, Saint-Hilaire-de-Lavit, Cocurès, Saint-Juéry, Saint-Gal, Saint-Flour-de-Mercoire, Paulhac-en-Margeride et Sainte-Hélène. **Amis prospecteurs, à vos jumelles !**
53 communes enregistrent moins de 70 espèces en tout ce qui dénote une sous-prospection de celles-ci (pour la liste de celles-ci sur Faune-LR : onglet de gauche / statistiques d'utilisation / statistiques des contributions / fréquentation communale puis tri croissant ou décroissant par les petits triangles).

D'un point de vue altitudinal, la Lozère a une altitude moyenne aux alentours de 1020 m avec un maximum d'habitants (et donc d'observateurs) dans les vallées Colagne, Lot et Tarn (entre 400 et 800 m). C'est en toute logique que 90 % des observations se font entre 600 et 1200 m, les basses vallées cévenoles et les plus hautes altitudes étant délaissées la plupart du temps (1,4 % des données au-dessus de 1400 m).

En bref, des efforts sont à faire :
- dans les Cévennes et plus largement pour les communes et mailles sous-prospectées avec moins de 70 espèces,
- aux basses altitudes (encore et toujours les Cévennes) et les hauteurs au-dessus de 1200 m,
- en zones forestières et loin des routes,
- en automne, hiver et cœur de l'été,
- la nuit ! (C'est beau la Voie Lactée).

Il y a encore à découvrir !

Bonnes observations 2018 !

Carte des données globales en Lozère 2017

Aperçu climatique 2017

Après un doux mois de décembre 2016, janvier connait une vague de froid de bonne intensité (le second plus froid depuis 2005) avec un -24 °C enregistré sur la Margeride, de la neige abondante sur le sud du département, le tout pendant une dizaine de jours. De février à mai, c'est la douceur qui domine avec quelques gelées fin avril mettant à mal une végétation en avance. S'ensuit une sécheresse généralisée qui s'installe durablement jusqu'en novembre inclus (hormis quelques bons orages, loclement, sur la Margeride en juin). La chaleur règne en juin (les circaètes en profiteront) et en août, moins en juillet et septembre sera le plus frais depuis 2001 lançant dans les airs son flot de migrateurs surpris et finalement pressés de partir (notamment les milans royaux, buses, etc.). Malgré octobre et novembre doux, le mois de décembre le plus froid depuis 2007 et bien arrosé finira de vider les cieux lozériens qui se révèleront bien calmes en cette fin d'année. Une pénurie alimentaire (d'origine climatique ?) amènera un bon flux de passereaux forestiers nordiques avec une ampleur inédite ces dernières années.

Remerciements

Ce sont **306** observateurs (261 en 2016) réguliers et occasionnels qui ont alimenté la base cette année pour la Lozère (relevé *Meridionalis* / M. BOURGEOIS). Nous les remercions collectivement très chaleureusement.
La simultanéité temporelle et/ou géographique de nombre d'observations rend la citation de chaque observateur/trice ingérable pour une rédaction compréhensible et une lecture agréable. Seule l'information synthétique est désormais retenue notamment pour les dates de premiers ou derniers contacts.
Seule une observation citée complètement (espèce, lieu, date, nombre) l'est avec son observateur/trice, sauf exception notable.
Quand une observation concerne plusieurs observateurs, ceux-ci sont cités dans l'ordre alphabétique.
Merci de votre compréhension... Mais que tout contributeur soit assuré que chaque observation saisie fait avancer notre connaissance ornithologique lozérienne et trouve ainsi toute sa place dans cette synthèse.

<u>Les observateurs réguliers dont le nom est abrégé se retrouveront ci-dessous :</u>
Thomas AUCOUTURIER (TAu), Emmanuelle BARTHEZ (EBa), Jean BELHACHE (JBe), Jean-Luc BIGORNE (JLB), Patricia BONNEFILLE (PBo) , Jérôme BOUARD (JBo), Jacky BRARD (JBr), André BROCARD (ABr), Dominique BUGAUD (DBu), Samuel CHAZALMARTIN (SCh), Marc CHOUILLOU

(MCh), Stéphane COURNAC (StC), Marie-Laure CRISTOL (MLC), Régis DESCAMPS (RDe), Rémi DESTRE (RD), Philippe FELDMANN (PFe), Alexandre FELTGEN (AFe), Jean-Christian GARLENC (JCG), Christine GONELLA (CGo), Philippe LECUYER (PhL), François LEGENDRE (FLe), François LOVATY (FLo) , Philippe LUCAS (PLu), Isabelle et Jean-Pierre MALAFOSSE (IM, JPM), Martine MULLER (MMu), Michel QUIOT (MiQ), Philippe THOUVENOT (PTh), Gérard TORREILLES (GTo).
et tous ceux que nous aurions malencontreusement oublié d'inclure...

Que tous trouvent dans cette synthèse l'expression des remerciements chaleureux de l'ALEPE et de *MERIDIONALIS*, gestionnaire de la base de données www.faune-lr.org dont sont issues les données cartes et histogrammes. Que ceux que nous aurions oubliés ou dont nous aurions écorché le nom nous en excusent et nous le fassent savoir (gentiment !).

Abréviations parfois utilisées :

Individu (ind), juvénile (juv), ac (année civile), adulte (ad), imm (immature), f (femelle)...
Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique (err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.), transhumant (trans.).

La liste des oiseaux est traitée selon l'ordre systématique en vigueur en 2012.
Les nouvelles espèces sont marquées d'un astérisque.

Précisions utiles sur quelques noms de lieux :

– Aubrac : haut plateau basaltique et granitique couvrant le nord-ouest de la Lozère, entre 1000 et 1469 m d'altitude, s'étendant secondairement sur le Cantal et l'Aveyron.
– Booz : petit barrage sur le Lot, commune de Saint-Germain-du-Teil, 530 m d'altitude.
- Cévennes : nom de la bordure sud-est du Massif-Central, principalement schisteuse et aux nettes affinités supra-méditerranéennes même si ses points culminants (Aigoual et Mont Lozère) sont clairement montagnards.
– Charpal : lac de barrage sis à 1325 m d'altitude sur la Margeride et s'étendant sur plusieurs communes.
– Ganivet : petit lac de barrage à 1050 m sur la Margeride sur la commune de Ribennes.
– Saint-Andéol, Le Born, les Salhiens, Souveyrols, Usanges : zones humides de l'Aubrac entre 1150 et 1250 m d'altitude. Les quatre premiers sont des lacs glaciaires.
– Malzieu (Le) : village de Lozère en Margeride nord doté d'une ancienne sablière (La Chazette/871 m) ayant un bel effet oasis.
– Margeride : haut plateau granitique entre 1000 et 1551 m couvrant la moitié nord de la Lozère.
– Méjean : nom du grand causse central, haut plateau calcaire entre 800 et 1248 m d'altitude.
– Mont Aigoual : sommet des Cévennes (1565 m) à cheval sur le Gard et la Lozère.
– Mont Gargo, Vébron : point culminant du causse Méjean à 1248 m d'altitude sur la commune de Vébron.
– Moulinet (Le) : petit lac de barrage à 1077 m d'altitude sur la commune du Buisson près de l'A75.
– Naussac : lac de barrage sis à 945 m d'altitude vers Langogne et s'étendant sur plusieurs communes.
– Puech Debon : point d'observation des migrations pré et postnuptiales sur la commune de Saint-Germain-du-Teil. Ce site domine la vallée du Lot sur la bordure sud-est de l'Aubrac.
– Point Sublime : point de vue sur les gorges du Tarn situé sur la commune de Saint-Georges-de-Lévéjac.
– Serre de Fourcat, Vébron : sommet proche du Mont Gargo sur le causse Méjean, commune de Vébron.
– Signal de Mailhebiau : point culminant de l'Aubrac à 1469 m s'étendant sur plusieurs communes.
– Sommet de Finiels : point culminant du Mont Lozère et du département à 1699 m d'altitude.
– Truc de Fortunio : point culminant de la Margeride avec le Signal de Randon à 1551 m d'altitude.

Faits marquants en 2017

- Premières mentions du Vautour de Rüppell et du Grand labbe.
- Second mention de la Bécassine double.
- Cinquième mention du Butor étoilé... en plein causse !
- Sixième mention du Crabier chevelu
- Nouvelles mentions d'Aigle criard et d'un hybride Criard x Pomarin
- Le retour de l'Outarde canepetière ? et de l'Alouette calandre ?
- Année record pour la Chouette de Tengmalm et la Fauvette à lunettes
- Migration importante de passereaux forestiers nordiques à l'automne

… et moult records de dates, de chants, de nombres, de migration d'espèces en expansions, d'espèces en régression, d'espèces dont le statut est incertain...

Nyctale de Tengmalm
Mont Lozère, 23/04/17, P. Lucas

Liste commentée des espèces 2017

CYGNE TUBERCULÉ *(Cygnus olor)* – **MH, rare** – *12 données.* 1-3 oiseaux circulent entre Saint-Chély-d'Apcher et la gravière du Malzieu mais sans reproduction cette année. Pas noté ailleurs.

OIE CENDRÉE *(Anser anser)* – **M rare** – *16 données.* Toutes de Naussac : Les 8 oies revenues le 29/11/2016 hivernèrent sur place malgré le grand froid et la neige de janvier. En mars, elles forment 4 paires : le 01/05, 5 poussins de quelques jours sont notés (RD) et le 13/05, un couple défend contre les goélands de probables poussins tandis qu'un autre surveille et que le quatrième se promène sans signe de reproduction. Sur 4 couples présents, 3 nichèrent donc mais un seul semble avoir réussi (troisième reproduction en Lozère, consécutive à 2015 et 2016) et la nichée sera notée jusqu'au 17/06. De très nombreux dérangements et intrusions dans la réserve furent signalés faisant sans doute fuir les oiseaux qui ne revinrent pas en automne.
À noter également, à Naussac, l'arrivée, le 19/03 vers 14h30, d'un oiseau marqué d'un hideux collier qui, renseignement pris auprès du bagueur, nous apprendra son origine polonaise : marquée le 02/06/2015 à Pobiedziska (656 jours) à 1307 km, c'était la première fois qu'elle était notée hors de Pologne où elle hiverna en 2015/2016 et d'où elle partit après le 29/10/2016.

TADORNE DE BELON *(Tadorna tadorna)* – **MH rég.**– *4 données.* Petite année. 7 oiseaux le 06/01 (PTh) et également le 19/02 (JBo) à Naussac et 1 le 22/03 à Charpal (RD).

CANARD SIFFLEUR *(Anas penelope)* – **MH rég.** – *19 données (43 en 2016).* Max de 65 le 07/01 à Naussac (FLe) et derniers le 19/03 puis de 2 à 5 oiseaux à Naussac à partir du 05/11. Également 2 à Ganivet le 24/09 (JLB) et 3 au Moulinet le 23/10 (PTh).

Sarcelle d'hiver, Booz, 05/03/17, F. Legendre

SARCELLE D'HIVER *(Anas crecca)* – **N loc., MH comm.** - *92 données.* Notée jusqu'au 01/05 puis à partir du 24/08. Aucune hivernante à Naussac, une première... mais 5 oiseaux à Booz jusqu'au 15/03. Passage net en février avec un max de 36 à Naussac. Notée sur tous les plans d'eau du département et parfois sur des rivières.

CANARD COLVERT *(Anas platyrhynchos)* – **N loc, MH comm.** – *433 données.* Partout en dehors des vallées cévenoles. Max de 98 le 15/01 et de 166 le 24/10 à Naussac et de 117 le 14/09 à Booz. La reproduction est avérée sur 7 sites pour 13 nichées produisant au moins 75 poussins (1x1 ; 2x3 ; 2x6 ; 4x7 ; 2x8 ; 1x10) entre le 06/05 et le 02/07.

CANARD PILET *(Anas acuta)* – **MH rég.** -*7 données (25 en 2016).* Pas d'hivernant cette année. 5 données du 05 au 26/03 dont un max remarquable pour la Lozère de 32 le 19/03 à Naussac (EBa, RD, FLe) et 3 données sur l'Aubrac. Puis 12 et 9 les 28/09 (JLB) et 26/10 (PTh) à Charpal.

CANARD SOUCHET *(Anas clypeata)* – **MH rég.** - *35 données.* Pas d'hivernage et passages du 12/03 au 04/05 (18 données) puis du 10/09 au 13/12 sans max supérieur à 10.

CANARD CHIPEAU *(Anas strepera)* – **MH rég.** – *3 données (19 en 2016).* Noté seulement à Naussac avec 4 oiseaux les 06-07/01 et 2 le 12/01.

couple de Canard chipeau Naussac, 07/01/17, F. Legendre

SARCELLE D'ÉTÉ *(Anas querquedula)* – **M, rég** – *19 données.* 15 données du 12/03 au 04/04 pour un max de 9 le 16/03 à Saint-Alban (JLB) et 4 données du 15/08 au 04/09 de 1-3 oiseaux à Booz (FLe).

NETTE ROUSSE *(Netta rufina)* – **M, rég** – *0 donnée comme une année sur deux depuis 2010.*

FULIGULE MILOUIN *(Aythya ferina)* – **MH rég.** - *5 données.* Cette espèce est devenue très rare en Lozère : 3 le 18/02 (MLC, FLe) et le 02/09 (FLe) à Naussac puis 1 les 4 et 05/09 à Ganivet (JLB).

FULIGULE MORILLON *(Aythya fuligula)* – **MH rég** – *0 donnée. Canard devenu exceptionnel en Lozère...*

GARROT À OEIL D'OR *(Bucephala clangula)* - **H, rare**. *1 donnée.* Donnée atypique de 3 mâles le 08/03 au Malzieu (K. DALLE). Première mention depuis le 15/01/2011.

Garrots à œil d'or mâles
Le Malzieu, 08/03/17, K. Dalle

HARLE BIÈVRE *(Mergus merganser)* - **H, rare**. *1 donnée.* 1 mâle en mue le **02/09** à Naussac (FLe), observation très précoce (précédent record le 27/10 en 2016) dans un contexte d'expansion de l'espèce en France (reproduction en 2017 en Ariège et Aveyron sur le Tarn). Seule donnée cependant cette année.

GRAND TÉTRAS *(Tetrao urogallus)* – **N loc, introduit** – *4 données.* 1 femelle à Belvezet (Y. BAY via C.NAPPÉE) le 03/05 dans une petite pinède isolée dans les champs et la femelle folle habituelle en mai à Finiels et la Brousse, capturée et relachée à Malavielle où se trouve également un mâle (C. NAPPÉE). Plusieurs observations de mâle et femelle adulte autour de Barrandon avec preuve de reproduction (PNC). Population (introduite) en voie d'extinction.

Grand tétras
reproduction 2000-2017

Perdrix rouge
Antrenas, 02/12/17, R. Destre

Perdrix rouge
reproduction 2017

Caille des blés
reproduction 2017

PERDRIX ROUGE *(Alectoris rufa)* – **N séd.** - *165 données.* Seulement 2 données au-dessus de 1200 m, jusqu'à 1400 m. Deux nichées répertoriées de 4 et 2 poussins les 23 (StC) et 29/07 (PFe).

PERDRIX GRISE *(Perdix perdix)* – **N séd.** – *3 données.* 1 le 20/03 au rochers de Trenze, Vialas (J. CABRERA), 8 à Barjac le 30/08 (D. BONNET), et 3 le 10/12 à Allenc (D. DEZOTHEZ). Origines cynégétiques.

CAILLE DES BLÉS *(Coturnix coturnix)* – **NM** – *169 données (196 en 2016)* : du 08/05 au 27/08 pour un max de 12 le 27/08 à Saint-Symphorien (P. MORO). Chants jusqu'au 03/08. Pas notée au-dessus de 1200 m cette année.

Faisan de colchide
reproduction 2017

FAISAN DE COLCHIDE *(Phasianus colchicus)* – **N loc, introduit** – 37 *données.* En dehors des lâchers de chasse d'automne, il y a quelques rescapés dont 15 données en période de reproduction et la **seconde reproduction avérée en Lozère** (première en 2016) avec au moins 3 poussins suivant une femelle le 23/05 à Saint-Bonnet-de-Chirac (StC).

Grèbe à cou noir
Naussac, 26/11/17, R. Destre

GRÈBE CASTAGNEUX *(Tachybaptus ruficollis)* – **NHM, loc**. – *59 données*. Noté en hivernage au Malzieu (max 3 individus) et sur le Lot à Mende et Banassac. Sans doute hiverne-t-il ailleurs sur le Lot ou sur d'autres cours d'eau comme le Tarn mais il n'est de toute évidence pas recherché. Retours en mars. Nicheur probable à Barrandon et certain à Naussac avec 2 poussins nourris le 10/09 (PTh). Max de 22 le 18/09 à Booz.

GRÈBE À COU NOIR *(Podiceps nigricollis)* - **M, rare** – *18 données*. 1 le 21/09 à Charpal (JLB), 1 le 16/10 au lac du Moulinet (RD) puis sur le même site, 2 du 14 au 24/11 (RD, FLe, PTh) et enfin 1 à Naussac le 26/11 (RD).

GRÈBE HUPPÉ *(Podiceps cristatus)* - **NHM, loc.** – *80 données (115 en 2016)*. Max de 75 le 19/01 à Naussac dans trois trous d'eau non gelés (JBo). Les dérangements sont de plus en plus nombreux et les échecs répétés : un nid de 4 œufs abandonné le 21/07 tandis qu'un autre couve... mais aucun poussin ne sera observé pas plus que sur les lacs d'Aubrac ou de Charpal où des adultes paradent, lacs devenus de banales bases de loisirs d'où la faune est exclue pour le seul plaisir humanocentrique. L'espèce est nicheuse en voie de disparition en Lozère !

GRAND CORMORAN *(Phalacrocorax carbo)* - **HM, comm**. - *230 données*. 42 hivernants à mi-janvier sur le département en 4 dortoirs : 24 à Naussac et 19 sur le Tarn, très petits effectifs en baisse régulière depuis quelques années. Passage reprenant en février et s'achevant le 24/05 sans vol supérieur à 61 oiseaux et sans estivage noté cette année sur Naussac (absence réelle d'oiseaux ou d'observateurs ?). Premiers retours le 05/08 puis très peu de migrateurs avec un petit vol max de 37 en octobre. Très peu d'oiseaux également en hivernage avec seulement 18 au plus à Naussac le 18/11. L'espèce régresse-t-elle en France ou s'agit-il d'une chute locale des effectifs (Climat ? Intrants ? Surpêche ? Tirs ?... Les quatre causes ?).

BUTOR ÉTOILÉ *(Botaurus stellaris)* – **M, très rare** – *4 données*. Cinquième mention départementale (dernière le 16/03/2012 sur l'Aubrac). 1 oiseau fait halte dans une haie d'aubépine le 25/10 à Boissets, causse de Sauveterre. Il sera vu se nourrissant dans un pré (MLC).

Butor étoilé
Les Boissets (Ste-Énimie)
25/10/17, ML. Cristol

Bihoreau gris adulte
Booz, 04/05/17
F. Legendre

BIHOREAU GRIS *(Nycticorax nycticorax)* – **M, très rare** – *23 données*. 1 stationne à Booz du 19/04 au 15/05, paradant même...sans suite visiblement bien que rejoint le 04/05 par un autre individu. Ensuite, 3 juv. le 13/08 et 1 autre le 08/09 (JLB) au Malzieu (TAu) et enfin 1 du 15/08 au 07/09 à Booz.

CRABIER CHEVELU *(Ardeola ralloides)* – **MN, rare** – *1 donnée*. Sixième mention départementale : 1 le 23/05 au Malzieu (L. CAUSSADE).

HÉRON GARDEBOEUFS *(Bubulcus ibis)* – **Err.** – *4 données* : 1 le 15/03 au Malzieu (J. NORMAN), 3 le 23/03 à Pied-de-Borne (AFe), 2 le 25/04 à Booz et 1 le 02/09 à Naussac (FLe).

AIGRETTE GARZETTE *(Egretta garzetta)* – **M, peu comm.** – *27 données*. 25 données du 04/04 au 01/06 pour un max de 5 le 25/04 à Booz (FLe) puis 1 le 02/09 à Naussac (FLe). Des oiseaux stationnent sur Booz et le Moulinet.

GRANDE AIGRETTE *(Casmerodius albus)* – **Err., peu commune** – *192 données (274 en 2016) !* Absente du 01/05 au 13/08 inclus. Max de 8 le 22/04 à Naussac (JBo).

HÉRON CENDRÉ *(Ardea cinerea)* – **N loc., MH. Comm.** – *577 données*. Seulement 16 et 11 données en juin et juillet, biais observateur probable. Max de 14 le 06/10 à Booz sur la vidange du barrage. Aucune colonie n'est suivie cette année.

Grande aigrette
phénologie 2017

Grande aigrette
répartition 2017

HÉRON POURPRÉ *(Ardea purpurea)* – **M, rég, rare** – *10 données.* 1 du 11 au 13/04 à Usanges, 1 en migration active au Puech Debon le 26/04, 4 contacts pour 2-3 oiseaux du 16/08 au 15/09 à Usanges et 1 en migration active nocturne (cris répétés) le 04/09 à Saint-Germain-du-Teil.

CIGOGNE NOIRE *(Ciconia nigra)* – **M, rég.** - *20 données* pour 31 oiseaux : 9 données pour 13 oiseaux du 02/03 au 04/05 pour des max de 3, puis 11 données pour 13 oiseaux du 10/08 au 06/10 dont 2 juvéniles stationnant à Booz du 04 au 06/10 (collectif). Petite année lozérienne alors que l'espèce enregistre plusieurs records de passage sur des sites de migration comme Orgambidexka (Pyrénées-Atlantiques) !

Cigogne noire 1ère année civile
Booz, 04/10/17, F. Legendre

Cigogne noire
répartition 2017

Cigogne blanche
répartition 2017

CIGOGNE BLANCHE *(Ciconia ciconia)* – **M, rég**. - *9 données* pour 13 oiseaux. 5 données du 13/03 au 05/04 pour environ 160 oiseaux dont **environ 120** (50 dénombrées sur photo de presse) le 23/03 à Saint-Étienne-Vallée-Française (anonyme). 4 données du 11 au 29/08 pour 95 oiseaux dont 53 le 25/08 à Recoules-d'Aubrac (anonyme). **Max annuel record** mais encore très humble **de 260 oiseaux**.

Bondrée apivore
Le Massegros, 14/06/17, P. Thouvenot

Bondrée apivore
reproduction 2017

BONDRÉE APIVORE *(Pernis apivorus)* – **NM, ass Comm.** - *197 données (137 en 2016).* Du 26/04 au 01/10. Aucun grand groupe noté en migration avec un petit max de 53 le 28/08 au Puech Debon. La carte montre clairement qu'elle évite les causses en période de reproduction. Parades en mai et jeunes en août : 4x1 jeune quémandant du 07 au 24/08.

ÉLANION BLANC *(Elanus caeruleus)* – **NM, rare** - *39 données (dont 17 de prospections ciblées négatives).* Parmi les données certaines, retenons : 1 adulte stationnant du 05 au 10/05 au Massegros (FLe) et une belle série sur le causse de Sauveterre sans reproduction avérée : 1 le 27/02 (A. REMOND/CEN) puis 1 à 2 du 27/06 au 03/09, 1 ou 2 territoires possibles ou oiseaux non fixés (collectif ALEPE). Côté observations du PNC : 1 le 12/03 sur le causse à Quézac (B. Chapelle,Emmanuel Dinaucheau.) 1 en juillet secteur du col des tribes (David Hennebaut, JP Malafosse PnC) et 1 le 14/08 Hures la parade (JM Tisné PnC).

Milan noir
reproduction 2017

MILAN NOIR *(Milvus migrans)* – **NM, ass. Comm. - 702** *données (478 en 2016).* Du 02/03 au **24/10**. Max de 111 le 13/03 au Puech Debon (total 570 oiseaux). Au passage postnuptial, max de 120 dès le 29/07 à Marvejols (RD) et à Rieutort-de-Randon (M. BROSSIER) et de **500** en plusieurs groupes le 10/08 à Champerboux (RD), valeur record pour la Lozère à ce passage pour un total minimal postnuptial de **1226** oiseaux sur l'ensemble du département.
Il y a 21 couples certains du 26/03 au 07/07 pour 5 nichées donnant 9 poussins au moins (2x1, 2x2, 1x3) à l'envol entre le 24/06 et le 07/07.

Milan royal
reproduction 2017

MILAN ROYAL *(Milvus milvus)* – **NM (H) ass. comm.** – *1557 données (1420 en 2016).*
Au Puech Debon : migration prénuptiale précoce du 29/01 au 26/03 pour un max de 49 dès le 29/01 (total 132) et du 24/08 au 03/12 pour un max de 256 le 22/09 (total record de 1281). Le pic de passage postnuptial eut une dizaine de jours d'avance, sans doute en relation avec un mois de septembre frais (record depuis 2001 en Europe de l'Ouest) avec de la neige marquée dès la moyenne montagne notamment en Suisse.
Le comptage national des 07-08/01 donne 59 oiseaux en 4 dortoirs (44+8+6+1).

Jean-Luc BIGORNE, coordinateur départemental "Milan royal" communique les résultats 2016 :
Sur les 24 sites contrôlés, 22 étaient occupés, 21 couples nichèrent (dont 12 sur la zone-échantillon de 100 km² au Nord-Ouest de la Margeride) et 15 réussirent produisant 29 jeunes (2x1, 9x2, 3x3). Les poussins sont notés au nid du 21/05 au 14/07. Il y eut 14 sites occupés et suivis sur la Margeride et 6 sur les contreforts et vallées (Lot, Jourdane). Au total, le taux d'échec est de 25% et le succès reproducteur de 1,53 mais il tombe à 1,36 sur la Margeride probablement en lien avec des densités de campagnols restant à un niveau relativement bas cette année.

GYPAÈTE BARBU *(Gypaetus barbatus)* – **réintroduit en 2011** – *72 données.*
4 jeunes gypaètes furent relâchés cette année en Aveyron mais malheureusement l'un d'eux (Durzon) est retrouvé mort le 12/02/2018 sur le causse du Larzac :
- Durzon (mâle) partit en juillet jusqu'en Allemagne puis revint dans les causses.
- Viaduc (mâle) se contenta d'une escapade dans le Limousin début août avant de revenir au bercail.
- Calandreto (mâle) visita La Villedieu début août et l'Ardèche en octobre avant de revenir au bercail.
-Arcana (femelle) ne quitta pas les abords du causse Méjean.

En outre, au moins 4 oiseaux (identifiés) fréquentèrent les Grands causses en 2017 (infos Faune-LR et site LPO rapaces.lpo.fr/gypaetes).
- Layrou (lâché en 2013 en Aveyron) est observé uniquement sur le Méjean qu'il ne quitte plus après sa mésaventure qui lui valut quelques plombs... fera-t-il partie du premier couple nicheur dans les grands causses ?
- Adonis : relâché en mai 2014 dans la Jonte est revenu en 2017 après un beau périple européen (cf photo).
- Girun, lâchée en 2016 dans les Baronnies (Drôme) passa du 13 au 15/06 sur Chaudeyrac avant de repartir en Ardèche puis dans les Alpes.
- ProNatura, femelle réintroduite dans les Baronnies (Drôme) envolée le 21 juin 2017, quitta les Baronnies le 17 juillet pour Chambord (!) où elle resta 2 jours avant de s'installer le 25 juillet sur le causse Méjean où elle mourra électrocutée vers Villeneuve le 26/08 (info T. DAVID/LPO-GC) !

Quelques nouvelles et péripéties des Gypaètes caussenards lâchés depuis 2012 dans les Grands causses :
- les disparus, potentiellement vivants : Basalte (lâché en 2012) pas revu depuis mars 2015, Cardabelle (lâchée en 2012) n'est pas revue depuis mai 2016 dans les Pyrénées, Jacinthe (lâchée en 2014) pas

revue depuis fin septembre 2014, Cayla, (lâchée en en 2016) pas revue depuis le 28/08/2016.
- <u>les morts</u> : Dourbie (lâchée en 2013), électrocutée dans la Jonte en juillet 2013 ; Cazals (lâchée en 2015) n'a pas réussi à reprendre son envol avec succès. Elle est en centre d'élevage en captivité ; Larzac (lâché en 2015), électrocuté en Allemagne en juillet 2016, Aigoual (lâchée en 2016), mordue par une vipère avant son envol et donc Durzon tout dernièrement retrouvé mort en février 2018 sur le Larzac.

Gypaète barbu périple européen d'Adonis

VAUTOUR PERCNOPTÈRE *(Neophron percnopterus)* – **Estivant N, loc.** – *25 données*. Du 10/03 au 02/09.
Pas noté hors secteurs traditionnels causses / vallée du Lot. Un couple reproducteur dans les gorges de la Jonte donne 1 jeune à l'envol en juillet (+1 dans la Dourbie, Aveyron, qui donne aussi un jeune qui sera capturé affaibli quelques jours après son envol, relâché et recapturé 3 jours après... troisième tentative au printemps 2018).
(<u>infos Philippe LÉCUYER/LPO-GC</u>).

VAUTOUR DE RÜPPELL *(Gyps rueppellii)* – **Err., exc.** - *1 donnée*. Première départementale de ce vautour africain apparaissant régulièrement en Espagne avec un oiseau pris au piège photo sur le charnier de Cassagnes, causse Méjean, le 19/03 (T. DAVID/LPO-GC). Cinquième mention française *a priori* après celle d'un oiseau en photo également le 10/09/2013 sur le Larzac (B. BERTHÉMY).

Vautour fauve reproduction 2017

Vautour moine reproduction 2017

VAUTOUR FAUVE *(Gyps fulvus)* – **N séd., loc.**- *1168 données.*
Vu partout sur le département, de plus en plus régulier sur le Mont Lozère et la Margeride avec des oiseaux en vadrouille notamment en été et semblant concerner surtout des immatures en dispersion et recherche alimentaire.
À noter : 2 Grands Corbeaux mangeant un œuf (clair ?) au Point Sublime le 09/03 (PhL) et une petite curée sur un faon de Chevreuil tué par la faucheuse le 07/06 au Massegros (PTh).
<u>Bilan de la reproduction 2017 Aveyron/Lozère (infos Philippe LÉCUYER/LPO-GC)</u> :
Premier accouplement le 14/12/2016 et première ponte notée le 09/01.
577 pontes recensées pour **438** jeunes théoriquement envolés. **50** poussins bagués au nid.
Lozère : **351** couples (8 communes). Aveyron : **226** couples (7 communes).
VAUTOUR MOINE *(Aegypius monachus)* – **N séd., loc.**– *109 données.*
Contrairement au fauve, sort peu du domaine caussenard et vallée du Lot. Il y a 11 données de mai à septembre sur Margeride et Mont Lozère jusqu'à Sainte-Eulalie où 2 oiseaux sont attablés sur une vache foudroyée le 02/06 (TAu).

À noter le retour sur les causses d'un oiseau bagué en 2014 dans la Dourbie, plus revu du 21/03/2015 au 21/03/2016 où il est noté dans les Baronnies (Drôme) d'où il disparait de nouveau le 19/10/2017 pour être revu à Marvejols le 03/12 (B. GRINDEL *via* RD, info bague LPO GC).
<u>Bilan de la reproduction 2017 Aveyron/Lozère (infos Philippe Philippe LÉCUYER/LPO-GC) :</u>
*Il y eut 27 couples et pontes (20 en 2016) pour 16 jeunes à l'envol, tous bagués au nid, se répartissant comme suit : Lozère : **6** couples (3 communes), Aveyron : **20** couples (6 communes), Hérault : **1** couple (1 commune).*

De gauche à droite et de haut en bas :

1 - Milan noir St-Germain-du-Teil, 05/0317, F. Legendre
2 - Milan royal, 29/05/17, causse Méjean, J-L. Ronné
3 - Gypaète barbu ProNatura, 22/08/17, causse Méjean, F. Legendre
4 - Vautour de Rüppell, Cassagnes (Méjean), 19/03/17, T. David-LPO GC
5 - Vautour fauve, gorges de la Jonte, 17/09/17, V. Miquel
6 - Vautour moine, gorges de la Jonte, 02/09/17, J. Pinaud
7 - Vautour moine, Ste-Eulalie, 02/06/17, T. Aucouturier
8 - Vautour fauve, gorges de la Jonte, 23/02/17, G. Tolmos

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC *(Circaetus gallicus)* – **NM, comm.** – *668 données.* Du 10/03 au 17/10 avec très peu de données en Margeride cette année.
Jean-Pierre MALAFOSSE nous fait part du suivi 2016 sur la zone parc national des Cévennes et alentours.
162 couples potentiels ; 79 sites contrôlés ; 64 occupés ; 42 couples suivis => 29 jeunes soit 0.69juv/couple. Une bonne année enfin.

Circaète Jean-le-Blanc
Barjac, 02/09/17
D. Bonnet

Circaète Jean-le-Blanc,
Le-Pont-de-Montvert, 30/07/17
L. Chevallier

Circaète Jean-le-Blanc
reproduction 2017

BUSARD DES ROSEAUX *(Circus aeruginosus)* – M rég. – *60 données pour 63 oiseaux.* 20 oiseaux du 25/03 au 15/06 (max 4 en migration le 26/03) puis 68 du 05/08 au 27/10 pour un max de 12 le 23/09 au Puech Debon.

Busard des roseaux
répartition 2017

BUSARD SAINT-MARTIN *(Circus cyaneus)* – **NMH** – *217 données.* Aucun dortoir hivernal dépassant 1-2 oiseaux n'est trouvé mais un dortoir sur l'Aubrac accueille 15 oiseaux le 23/09, **23 le 08/10** et encore 7 le 23/11 (JLB).
Jean-Luc BIGORNE, coordinateur départemental du Groupe "busards" communique les résultats 2017 : 13 couples sont observés pour une population estimée entre 15 et 25 couples nicheurs. Six nids sont localisés et suivis dans des milieux naturels et semi-naturels. L'espèce semble stable ces dernières années en Lozère. Deux nids ont échoué et les 4 autres ont donné 12 jeunes à l'envol (1x2, 2x3, 1x4) entre le 02/07 et le 20/08. Ce bon succès reproducteur de 2 est à relativiser car deux couples ont fort probablement tenté et échoué une reproduction en parcelles fourragères sur les grands causses, ce qui porterait le taux d'échec à 50 % et le succès reproducteur à 1,5.

Busard St martin
reproduction 2017

BUSARD CENDRÉ *(Circus pygargus)* – **NM** – *296 données.* Du 08/04 au 07/09. Deux dortoirs accueillent 6 oiseaux en mai-juin sur le Sauveterre et 8 sur le Méjean en juillet dont un individu mélanique.
Jean-Luc BIGORNE, coordinateur départemental du Groupe "busards" communique les résultats 2017 :
Il y eut 30 couples observés et 24 nids localisés pour 22 couples nicheurs. Dans le Parc national des Cévennes, une petite augmentation est constatée, notamment en Zone Cœur (5 à 7 couples nicheurs + 5 couples nicheurs en aire d'adhésion). Sur la Margeride, l'effectif reste très bas (5 couples nicheurs au lieu de 10 à 12 en 2010), en partie du fait de densités de rongeurs faibles cette année. Dans l'ouest de la Lozère, les nids sont pour la plupart dans les cultures (7 couples nicheurs) avec un tassement des effectifs suite à la disparition d'une grosse colonie dans des blés et à une pression de surveillance en baisse. Le succès reproducteur est de 1,05 et le taux d'échecs de 59 % : c'est la plus mauvaise année depuis 2010. Treize couples ont échoué et les 9 autres ont donné 23 jeunes à l'envol dont 7 grâce aux

Busard cendré
reproduction 2017

protections du 19/06 au 05/08 (1x1, 2x2, 6x3). Dix interventions étaient nécessaires : 9 dans des prairies artificielles et 1 en prairie naturelle, 6 ont pu être effectuées dont 2 ont échoué complètement et une partiellement. Les landes accueillent la moitié des jeunes à l'envol. En prairies naturelles, les prédations et la pression agricole due à la sécheresse causent l'échec de la majorité des nids. La population lozérienne reste, malgré un investissement humain conséquent, une population puits avec un succès reproducteur faible : entre 1 et 1,6. Sans les interventions, ce dernier se situerait selon les années entre 0,6 et 1,24 pour une population estimée entre 30 et 45 couples nicheurs.

Autour des Palombes
reproduction 2017

Épervier d'Europe
répartition 2017

Buse variable
reproduction 2017

AUTOUR DES PALOMBES *(Accipiter gentilis)* – **N séd., M** – *44 données.*
Parades du 06/02 au 13/03 (6 territoires). Sans doute largement sous-détecté, à rechercher en poste fixe principalement de mi-février à mi-mars lors des parades bien visibles mais souvent brèves.

ÉPERVIER D'EUROPE *(Accipiter nisus)* – **N séd., M** – *393 données.* Parades du 11/03 au 13/05 et nourrissages du 06/06 au 09/07 sans nichée observée. Migration 25/02 au 26/03 et du **04/08 au 03/12**.

BUSE VARIABLE *(Buteo buteo)* – **N séd., MH comm.** – *1664 données.* Parades du 22/02 (avec accouplement !) au **28/05**. Couvaison dès le 25/03. Bien qu'omniprésente elle fait l'objet de seulement 4 nichées observées pour 9 jeunes au moins (4x1, 1x2, 1x3) du 24/06 au **03/09**. Migration du 29/01 au 26/03 et du 10/09 au 03/12 pour un total record de **876** oiseaux au Puech Debon dont 125 le 23/10 et surtout **387** le 03/12 en fuite hivernale en début d'après-midi (froid et neige).

Buse variable
Marvejols, 02/12/17, R. Destre

Épervier mâle adulte
Bagnols-les-bains, 22/12/17, D. Bugaud

Autour des palombes mâle 1ère ac,
Marvejols, 07/10/17 , R. Destre

Busard cendré juvénile
Trélans, 15/08/17, F. Legendre

Busard cendré mâle adulte
05/08/17, Lachamp, R. Destre

AIGLE CRIARD x POMARIN *(Aquila clanga x pomarina)* – **M, exc** – *1 donnée.* L'oiseau lituanien bagué poussin au nid en 2015, qui a déjà traversé la Lozère de la Margeride à l'Aubrac les 7 et 08/10/2016 passe à nouveau le 12/10/2017 au-dessus de Saint-Andéol-de-Clerguemort (Cévennes). Il est arrivé en Casamance, Sénégal le 13/11 (Ornitela.com).

AIGLE CRIARD *(Aquila clanga)* – **M, exc** – *1 donnée.* Tonn, Aigle criard femelle baguée en 2008 en Estonie est déjà passée en Lozère les 01/04/2011, 30/03/2012 et 21/10/2016. Cette année, elle prit le temps, traînant en Autriche et Suisse malgré la neige et le froid... Pointée le 02/12 au soir à Paulhac-en-Margeride en provenance de la plaine du Forez (Loire). Elle passa la nuit en limite Haute-Loire/Lozère dans une pessière vers 1200 m d'altitude par un froid glacial et en repartit le lendemain matin vers 8h30 par -11 °C atteignant Figeac (Lot) dans l'après-midi...

Aigle royal
reproduction 2017

AIGLE ROYAL *(Aquila chrysaetos)* – **N séd., loc.**– *235 données (155 en 2016).*
Jean-Pierre MALAFOSSE (PNC et Groupe rapaces sud Massif Central) communique les résultats 2017 pour la Lozère :
Il y a 12 couples potentiels, 10 sites occupés mais seulement 3 jeunes à l'envol, uniquement dans la vallée du Lot (après une année blanche) dont une très rare nichée de 2 jeunes.
Chronologie traditionnelle des couples lozériens : parades en janvier, recharges dès février, fixation près du futur nid début mars, ponte vers le 20 mars, éclosion vers le 10 mai et envol vers le 15-20 juillet. Dans le Parc national des Cévennes (Gard/Lozère), 13 couples ne produisent qu'un jeune à l'envol. Population "Sud Massif central" (y compris Aude) : environ 40 couples certains + 5 potentiels.

Aigle botté
reproduction 2017

AIGLE BOTTÉ *(Aquila pennata)* – **N loc, M** – *125 données* (31 en 2016) : du 03/04 au **26/10**. Il y a 4 couples certains produisant au moins 6 jeunes (3x2) (Banassac, La Canourgue, Saint-Bauzile - nouveau couple enfin trouvé, suspecté depuis 2 ans -, Les Vignes) et au moins 4 couples probables à localiser : Saint-Léger-de-Peyre (2 couples ?), Le Monastier/Chirac, Banassac (1 de plus)... sans compter le Bès et la Truyère toujours pas prospectés cette année. La population lozérienne semble bien en augmentation avec une dizaine de couples. Max de 8 le 31/08 au Puech Debon, deux couples et leurs nichées présumées (FLe).

AIGLE DE BONELLI *(Aquila fasciata)* – **M, err. rare** – *2 données.* 1 immature le 06/01 dans la Jonte (T. DAVID/LPO Grands Causses) et 1 juvénile en migration le 10/09 au Puech Debon (FLe).

BALBUZARD PÊCHEUR *(Pandion haliaetus)* – **M rég.** – *40 données.* 14 oiseaux du 09/03 au 01/05 puis une vingtaine au moins (la comptabilité sur Charpal étant impossible) du 23/08 au 04/10.

Aigle botté
Laval-du-Tarn, 04/08/17, L. Toquebiol

Aigle royal
causse Méjean, 26/10/17, R. Destre

FAUCON CRÉCERELLETTE *(Falco naumanni)* – **Visiteur rég.** – *120 données.* Du 29/07 au 24/09, essentiellement sur le Méjean hormis 3 oiseaux en vadrouille plus au nord le 29/08 au Puech Debon. Le suivi du dortoir du causse Méjean donne chronologiquement : 90 le 29/07, 200 le 04/08, 300 le 12/08 (PFe), au moins 379 le 14/08 (EBa, T. Daumal, FLe) et 400-450 le 30/08 (comptage national, collectif ALEPE et Parc national des Cévennes).

Faucon crécerelle
reproduction 2017

FAUCON CRÉCERELLE *(Falco tinnunculus)* – **NMH comm.** – *1140 données (943 en 2016).* Il y a toujours un net creux hivernal de nombreux oiseaux quittant le département même s'il en reste un peu partout. Migration visible essentiellement au passage postnuptial, du 10/09 au 15/11 dont un beau max de 86 en 45 minutes entre deux passages pluvieux le 21/10. 11 nichées sont notées du 10/05 au 19/07 pour 33 poussins (6x2, 2x3, 3x5).

FAUCON KOBEZ *(Falco vespertinus)* – **M, assez rare mais rég.** – *18 données.* Du 29/04 au 28/05. Max de 9 le 25/05 à Malbouzon (SCh, FLe). Noté sur le causse Méjean (max 6), à Saint-Germain-du-Teil et sur les Bondons. Pas de mention postnuptiale cette année.

Faucon hobereau
reproduction 2017

FAUCON ÉMERILLON *(Falco columbarius)* – **MH rég.** – *18 données. 6* données du 23/01 au 05/05 puis 12 du 23/09 au 16/12, toujours à l'unité.

FAUCON HOBEREAU *(Falco subbuteo)* – **NM** – *56 données.* Du 16/04 au 05/10. Aucune reproduction certifiée.

FAUCON D'ÉLÉONORE (*Falco eleonorae*) – **M rare** – *5 données.* 1 adulte le 18/05 au Massegros et le 11/06 à Laval-du-Tarn (FLe), 3 (2°ac) le 05/07 sur le Méjean à la Croix du Villaret (PTh), 1 (3°ac) aux Salces le 13/08 (FLe) et 1 le 14/08 à Bassurels (JLB).

FAUCON PÈLERIN *(Falco peregrinus)* – **N séd., MH** – *140 données.* Accouplement dès le 01/02. Jean-Pierre MALAFOSSE qui coordonne le suivi pour la Lozère nous communique les résultats 2017 :

41 sites répertoriés ; 31 sites contrôlés ; 29 couples potentiels ; 24 occupés ; 14 suivis dont 8 pontes et 6 nichées pour 14 jeunes à l'envol (2x2, 2x3, 2x4) soit 1,4 juv/couple ou 2,3 par nichée réussie.

Faucon pèlerin
reproduction 2017

Faucon pèlerin femelle adulte
gorges de la Jonte, 20/09/17, V. Miquel

RÂLE D'EAU *(Rallus aquaticus)* – **N rare, M trans.** – *8 données.* Aucune donnée printanière faute de prospection ou faute d'oiseaux ? Du 16/08 au 21/11, max de 10 environ le 16/08 à Usanges (FLe), locaux probables. Noté également à Ganivet et aux Salhiens.

MAROUETTE PONCTUÉE *(Porzana porzana)* – **N rare, M trans.** – *1 donnée.* Une criant longuement à Usanges le 11/04 mais ne chantant pas... sans suite dans cet habitat qui pourrait convenir à sa reproduction.

RÂLE DES GENÊTS *(Crex crex)* – **N, M très rare.** – *2 données.* 1 chanteur (migrateur) le 21/05 aux Rajas, Aubrac (FLe) et une donnée de seconde main (à prendre avec prudence mais intéressante à citer) d'un chanteur le 12/06 à Cubières.

Daniel Bonnet 2017

Philippe Feldmann © 2017

Page précédente, de gauche à droite et de haut en bas :
1 - Faucon crécerelle, Arzenc, 03/09/17, D. Bonnet
2 - Faucon d'Eléonore 2ème année civile, Méjean, 05/07/17, P. Thouvenot
3 - Faucon crécerelllette mâle, 12/08/17, causse Méjean, P. Feldmann
4 - Faucon pèlerin 1ère année civile, gorges du Tarn, 24/08/17, R. Monlong
5 - Faucon crécerelle mâle, Les Salces, 12/04/17, F. Legendre
6 - Faucon kobez, male adulte, Chanet, 29/04/17
7 - Faucon kobez mâles 2ème année civile, causse Méjean, 20/05/17, P. Feldmann

GALLINULE POULE D'EAU *(Gallinula chloropus)* – **N loc., M** – *78 données*. Notée en janvier à Ganivet, Saint-Germain-du-Teil (dans une mare) et Mende mais pas en février. Retours perceptibles en mars. Nidification certaine réussie du 19/06 au 03/09 : Booz (1 poussin seulement), Le Malzieu (2 *pulli*), Naussac (au moins 3 *pulli*) et probable à Usanges. Cette espèce très commune en plaine reste rare en Lozère mais est sans doute plus présente qu'il n'y paraît, notamment sur le Lot, La Colagne ou le Tarn qui ne font l'objet d'aucune mention de reproduction.

Gallinule poule d'eau
St-Germain-du-Teil 18/03/17
F. Legendre

FOULQUE MACROULE *(Fulica atra)* – **N loc., MH** – *19 données*. Notée toute l'année à Naussac avec un max de 21 le 15/01 (comptage Wetlands) et de 22 le 05/11 (PTh). Deux couples nichent le 13/05… mais faute de suivi local on ne sait si les nichées réussirent. Pas notée ailleurs cette année.

Foulque macroule
Naussac, 07/01/17, F. Legendre

OUTARDE CANEPETIÈRE *(Tetrax tetrax)* – **M rare** – *40 données (dont 32 négatives de prospections ciblées).* Dernières observations précédentes : 04/08/2015 sur le causse Méjean (RDe) et 1 ind le 29/08/2016 (Jean-Michel TISNE PNC). Les recherches spécifiques en juin ne donnent rien… Cependant, **3 mâles immatures** sont notés le 17/05 sur le Méjean (H. PICQ/PNC) et 1-2 mâles sont observés en parallèle du 02/07 (EBa) au 08/08 (EBa, MLC) avec même 2 mâles immatures ce dernier jour. À suivre en 2018 !

Grue cendrée
répartition 2017

GRUE CENDRÉE *(Grus grus)* – **M irrég.** – *17 données pour 111 oiseaux.* 11 données du 21/02 au 01/04 pour 42 oiseaux dont 19 le 06/03 à Booz (Fle) puis 5 données du 22/10 au 04/12 pour 69 oiseaux dont 39 à Mas-d'Orcières le 10/11 (JLB). À noter le séjour, probablement d'un même individu, entre les 18 et 25/03 à Usanges (RD, Fle).

ÉCHASSE BLANCHE *(Himantopus himantopus)* – **M, rare** – *2 données*. À Usanges, 1 m le 23/04 (FLe) et 1 f le 26/04 (RD).

OEDICNÈME CRIARD *(Burhinus oedicnemus)* – **N loc., M** – *42 données (71 en 2016)*. Du 05/04 au 20/09 uniquement sur causses Méjean et de Sauveterre où les parcelles disponibles se réduisent petit à petit sous l'assaut de la déprise agricole. Max de 10 le 27/08 sur le Méjean (PTh).

PETIT GRAVELOT *(Charadrius dubius)* – **N loc., M** – *29 données*. Du **15/03** au 02/09 uniquement sur l'Aubrac et Naussac. Parades et accouplements à Usanges (1 c), Rieutort-d'Aubrac (1 c) et Naussac (2 c) sans reproduction réussie avérée.

Oedicnème criard
Drigas, causse Méjean,
21/06/17, J. Lesourd

PLUVIER GUIGNARD *(Charadrius morinellus)* – **M, assez comm. Local.** – *35 données.* (44 oiseaux en 2015, 226 en 2016) : addenda avec une donnée de 2015 arrivée cette année d'un mâle en photo le **28/05** (!) au serre des Lattes, causse Méjean (A. LEBOSSÉ).
Six mentions prénuptiales (un record en Lozère !) avec un passage bien plus précoce qu'habituellement : 2 dès le 26/03 sur le Gargo (S. RIOLS *et al.*), seconde mention de mars en Lozère (précédente le 11/03/2009 sur l'Aubrac, RD), 1 le 12/04 au Mailhebiau, Aubrac, en migration active (FLe), 1 le 16/04 au serre de Fourcat, causse Méjean (F. OLIVIER), 5 le 21/04 au sommet de Finiels, Mont Lozère (comm. orale *fide* PLu), 2 au même endroit le 22/04 (MLC, FLe) et encore un tardif le 16/05 au mont Gargo, causse Méjean (A. LEBOSSÉ).
Passage postnuptial : 1 le 17/08 au serre de Fourcat... puis plus rien jusqu'au 26/08 et ensuite belle série de 18 observations pour 103 oiseaux jusqu'au 15/10 pour un max de 19 le 05/09 au sommet de Finiels (JM. CORBIER) et de 17 le 06/09 au serre de Fourcat (EBa, FLe). 9 derniers le 15/10 au serre de Fourcat (A. RICHARD), bel effectif pour une date tardive.

Pluvier guignard
Serre de Fourcat, 06/09/17, F. Legendre

PLUVIER DORÉ *(Pluvialis apricaria)* – **M, rare** – *2 données.* 15 du **19/02** au 21/02 à Prinsuéjols, Aubrac (RD).

VANNEAU HUPPÉ *(Vanellus vanellus)* – **N loc., MH peu comm.** – *70 données.* 8 oiseaux en fuite hivernale le 03/01 puis passage du 17/02 au 10/03 soit avec une quinzaine de jours d'avance sur la moyenne qui est début mars pour un max de 44 le 22/02 à Usanges (PTh). Parades à partir du 15/03. Sur la dizaine de couples présents sur l'Aubrac, 1 seul semble avoir réussi avec 4 poussins le 22/05 à Usanges (RD). Aucun à partir du 05/07 puis migration du 25/10 au 26/11.

Vanneau huppé
Malbouzon, 22/05/17, R. Destre

Vanneau huppé
reproduction 2017

BÉCASSEAU VARIABLE *(Calidris alpina)* – **M, rare.** – *4 données.* Toujours à l'unité : 19 et 24/08, 22/09 à Usanges et 22/09 à Charpal.

COMBATTANT VARIÉ *(Philomachus pugnax)* – **M, peu comm.** – *5 données.* Uniquement à Usanges : 6 le 11 et 12/04 (FLe, PTh), 2 et 1 le 16 et 23/04 (FLe), 5 le 22/09 (PTh).

BÉCASSINE SOURDE *(Lymnocryptes minutus)* - **MH, peu comm.** – *59 données.* Du 15/03 au 19/04 pour 156 oiseaux vus et/ou bagués dont 44 le 31/03 sur plusieurs sites de l'Aubrac pour un max de 9 les 22/03 et 06/04 sur un même site (info C. RIEUTORT / FDC-48). Pic la dernière décade de mars avec un total de 82 oiseaux. En automne, pas d'infos de la FDC-48 et seulement 1 oiseau tué le 17/10 sur le Mont Lozère (PLu).

BÉCASSINE DES MARAIS *(Gallinago gallinago)* – **N rarissime, M comm H rare** – *109 données.* Notée jusqu'au 24/04 et à partir du 16/08 sans mention nuptiale mais sans vraie recherche spécifique. 2 données en janvier, 1 en février et 4 en décembre. Max de 22 le 28/08 et de 16 le 22/03 sur l'Aubrac (C. RIEUTORT / FDC-48).

BÉCASSINE DOUBLE *(Gallinago media)* – **M, exc.** – *1 donnée.* 1 le 23/04 à Usanges (FLe), seconde donnée contemporaine (hors données de chasse) après celle du 26/04/2015 sur le même site.

BÉCASSE DES BOIS *(Scolopax rusticola)* – **N loc., MH** – *68 données.* 7 données en janvier et en février. Croule notée du 17/03 au 22/06 avec de beaux scores cette année sur la Margeride : 103 contacts en 6 soirées du 07 au 22/06 sur 26 sites (18 positifs) dont 3 individus simultanément le 09/06 à La Villedieu (info C. RIEUTORT / FDC-48). 1 donnée en août et retours ressentis à partir du 25/10 pour 37 données jusqu'à fin décembre. 19 sont capturées pour baguage dont 8 sur la même parcelle du causse Méjean en décembre (C. RIEUTORT / FDC-48).

Bécasse des bois
Margeride, juin 2017, L. Caussade

Bécasse des bois
reproduction 2017

Bécasse des bois
comptage croule juin 2017
FDC48

Bécasse des bois
Margeride, juin 2017
L. Caussade

COURLIS CENDRÉ *(Numenius arquata)* – **N loc., M rare** – *89 données (48 en 2016).* Hormis 2 jeunes en halte à Chanet, causse Méjean du 24 au 26/08, noté uniquement sur l'Aubrac du 07/03 au 22/06 puis 1 qui traîne du 24/08 au 24/09. 20 territoires sont repérés cette année avec chants et alarmes du 15/03 au 01/06. Comme presque toujours, aucune reproduction n'est observée, l'espèce étant extrêmement discrète, toujours fondue dans les herbages.

CHEVALIER ARLEQUIN *(Tringa erythropus)* – **M, rare.** – *1 donnée.* 1 le 19/04 à La Baume, Prinsuéjols (PTh).

CHEVALIER GAMBETTE *(Tringa totanus)* – **M rég.** – *9 données.* 8 données du 26/03 au 09/05 pour un max de 16 le 16/04 à Usanges (FLe) puis 1 le 22/08 à Charpal (StC).

CHEVALIER ABOYEUR *(Tringa nebularia)* – **M, rég** – *16 données.* 5 données du 4 au 20/04 (max de 4) puis le reste du 24/08 au 16/10 pour un max de 11 le 31/08 à Charpal (RD).

CHEVALIER CULBLANC *(Tringa ochropus)* – **M rég.** – *96 données.* 1 mention hivernale le 15/01 à Booz, site classique (FLe). Passages du 05/03 au 16/04 (1-6 oiseaux) pour un beau max de **15** le 20/03 aux Salhiens (collectif) puis du 10/06 au 05/10. Un oiseau commence à hiverner à Booz et 1 autre le 04/12 à Pied-de-Borne (FLe), hivernant local potentiel.

CHEVALIER SYLVAIN *(Tringa glareola)* – **M rég.** – *11 données.* Du 11/04 au 03/05 pour max de 7 à Usanges. 1 le 30/07 au Bleymard (DBu) et 1 le 24/08 au Moulinet (PTh), seules mentions postnuptiales.

Chevalier guignette reproduction 2017

CHEVALIER GUIGNETTE *(Actitis hypoleucos)* – **H rare**, **N loc.**, **M rég. Comm.** – *112 données.* Pas d'hivernant sur 2016/2017. Retour du 17/02 au 04/10 (max 7), puis début d'hivernage 2017/2018 à Booz. 8 territoires sont repérés dont 6 sur le Lot en amont de Banassac mais aucun jeune n'est observé cette année.

GRAND LABBE *(Stercorarius skua)* – **M, exc.** – *1 donnée.* Première mention départementale : 1 migrateur le 23/09 au Puech Debon qui file droit à vol battu au milieu des hirondelles, à 200-300 m du sol. Espèce annuelle à l'intérieur des terres (plusieurs chaque année sur le lac Léman par exemple), il survole peut-être régulièrement la Lozère à haute altitude. Les oiseaux vus sur le littoral régional (tous labbes confondus) ont sans doute traversé la France.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *(Larus melanocephalus)* – **M, rare** – *5 données.* Belle série pour la Lozère qui n'enregistrait jusqu'alors que 8 données ! 1 le **22/03** à Charpal (RD), 4 (1x ad, 3x 2ac) le 13/05 et 1 le 02/09 à Naussac (FLe) et une donnée atypique d'un oiseau de 1ac posé sur la plaine de Chanet, causse Méjean le 19/08 (PFe, D. ROUX).

MOUETTE RIEUSE *(Larus ridibundus)* – **A niché, MH rég.** – *17 données.* Susceptible d'être vue partout tout le temps mais toujours peu fréquente en Lozère même à Naussac où elle semble devenue plus rare. Max de 21 le 11/07 à Naussac (JBo) et de 50 le 03/03 au Malzieu (C. PAUL).

Mouette mélanocéphale 1ère ac Chanet (Méjean), 19/08/17 P. Feldmann

Mouette mélanocéphale 1ère ac Chanet (Méjean), 19/08/17 D. Roux

GOÉLAND CENDRÉ *(Larus canus)* – **M, rare** – *1 donnée :* 1 immature le 07/01 à Naussac (FLe).

GOÉLAND BRUN *(Larus fuscus)* – **M, rég** – *1 donnée :* 1 le 07/01 à Naussac (FLe), seule donnée cette année pour ce goéland qui est moins présent depuis quelques années.

GOÉLAND LEUCOPHÉE *(Larus michahellis)* – **N loc., MH** – *209 données.* Uniquement sur la moitié nord du département. Max de 227 le 07/01 (FLe) et de 9 (seulement !) à Naussac le 15/01 (comptage Wetlands, vague de froid). La colonie très (trop) mal suivie de Naussac donne au moins 43 oiseaux couvant le 13/05 et 3 poussins nés... mais pas de suite ! Max automnal de 210 le 26/11 à Charpal (RD). Noté ailleurs par petits groupes n'excédant pas 6 oiseaux.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*) – **M, très rare** – *1 donnée.* Une mention très originale autant par le lieu que par la date : 1 sterne *sp.* (probablement pierregarin cependant) en vol à Ribennes le 31/07 (JLB).

GUIFETTE MOUSTAC *(Chlidonias hybrida)* – **M rég.** – *3 données.* 1 le 13 (FLe) et 2 le 14/05 (SCh) à Naussac.

GUIFETTE NOIRE *(Chlidonias niger)* – **M rég.** – *3 données (13 en 2016).* 6 à Naussac le 09/05 (JBo), 1 et 4 à Charpal les 12 et 28/09 (JLB).

PIGEON BISET féral *(Columbia livi)* – **N, Très rare en ilieu naturel, peu commun en ville M rég.** – *21 données.* L'absence de commentaires sur les plumages et les localisations ne permettent pas de faire la part entre des bisets retournés à l'état sauvage (population férale) de ceux encore domestiqués.

Pigeon colombin
reproduction 2017

PIGEON COLOMBIN *(Columba oenas)* – **NM, peu comm.** – *87 données.* Du 01/02 au 25/10. Chants du 12/03 au 06/07. Pas d'effectif supérieur à 17.

PIGEON RAMIER *(Columba palumbus)* – **NM, ass. Comm.** – *588 données.* Semble devenir moins rare (ou mieux noté ?) en hiver avec 23 données en janvier et 31 en février. Chant du 19/01 (avec un premier isolé le 30/12/2016) au 22/09. Migration du 24/09 au 03/12 pour un max très humble de 4190 au Puech Debon (671 le 14/10). Cinq données de reproductions certaines : 2 poussins le 24/04, 1 œuf prédaté le 29/04, nids à 10 m dans un pin ou 4 m dans un arbuste et jeune nourri le 24/06.

TOURTERELLE TURQUE *(Streptopelia decaocto)* – **N séd.** – *488 données.* Chants notés tous les mois même si ceux-ci sont intermittents d'octobre à février. Max de 30 en août. Pas notée en centre Margeride et peu en vallées cévenoles : biais d'observation ? Seules 2 mentions de reproduction certaine : 1 poussin tombé du nid le 26/03 et une couvaison le 08/06. Nul doute qu'il y a des progrès à faire dans le suivi de cette espèce…

TOURTERELLE DES BOIS *(Streptopelia turtur)* – **N rare, M peu commun** – *8 données.* Du 05/05 au 04/07 seulement. Chants uniquement au Massegros, à Champerboux et à Grèzes.

COUCOU-GEAI *(Clamator glandarius)* – **NM rare.** - *2 données.* 1 immature les 9 (FLe) et 15/06 (JLB) au Massegros.

COUCOU GRIS *(Cuculus canorus)* – **NM comm.** - *478 données (394 en 2016).* Du 20/03 au 01/09. Chants du 20/03 au 02/07. 3 données en juillet et belle série aoûtienne de 12 données. Noté jusqu'à 1400 m. Une seule donnée de reproduction : nourrissage d'un jeune par un Pipit des arbres le 02/07 à Prinsuéjols (RD).

Tourterelle des bois
Le Massegros, 31/05/17
P. Thouvenot

Tourterelle turque poussin
St-Germain-du-Teil, 26/03/17
F. Legendre

Coucou gris
reproduction 2017

Effraie des clochers
reproduction 1999-2017

EFFRAIE DES CLOCHERS *(Tyto alba)* – **Rare** – *1 0 données (39 saisies sur 1999-2017).* Le mieux-aller de l'espèce en Lozère semble se confirmer après une reproduction en 2016. Quatre sites ont accueilli des oiseaux à Palhers, Saint-Bonnet-de-Chirac, Grèzes et Mende. Le couple de 2016 présent jusqu'au 31/05 n'a pas niché dans son nichoir. A-t-il niché ailleurs ? Quelques nichoirs posés n'ont pour l'instant pas donné de résultats. Également 1 observation dans la vallée de la Mimente le 24/06 (Rémy Barraud/PNC).

Petit-Duc scops
reproduction 2017

PETIT-DUC SCOPS *(Otus scops)* – **NM** – *58 données.* Du 30/03 au 09/09. Chants jusqu'au 03/08. Une donnée de reproduction avec un poussin bien emplumé tombé du nid le 26/07 au Born (MLC).
En région : du 04/02 (8 données entre le 04/02 et le 10/03) puis arrivée nette à partir du 15/03, au 07/09.

GRAND-DUC D'EUROPE *(Bubo bubo)* – **N séd.** – *57 données*. Au moins 14 territoires notés (comme en 2016) pour 1 nichée de 2 poussins le 08/05 à Lanuéjols (MJa). Chant audible toute l'année.

CHEVÊCHE D'ATHÉNA *(Athene noctua)* – **N séd. Peu comm.** – *78 données*. Au moins 13 territoires sur le Méjean et 9 sur le Sauveterre ainsi qu'1 dans le village de Bédouès (IM pour le Parc national des Cévennes). Sur le reste du département ce sont 16 territoires qui sont repérés aléatoirement dont 3 nichées observées entre les 04 et 22/07 produisant 7 jeunes (2x2, 1x3). Il y a donc au moins 39 territoires occupés en Lozère ce qui est indubitablement sous-estimé.

CHOUETTE HULOTTE *(Strix aluco)* – **N séd., comm.** – *278 données (140 en 2016)*. Des chanteurs toute l'année. Il n'y a que 16 données de 1100 à 1300 m, pas au-delà. Quatre données de reproduction certaine : 1 œuf au sol d'une loge (hêtre) le 17/04 (C. GIORDANO) puis 3 nichées de 2, 1 et 3 poussins du 08/05 au 26/06.

Grand Duc d'Europe
reproduction 2017

Chevêche d'Athéna
reproduction 2017

Chevêche d'Athéna
Chirac, 18/01/17, F. Legendre

Chouette hulotte
reproduction 2017

HIBOU MOYEN-DUC *(Asio otus)* – **NMH** – *58 données (20 en 2016)*. Le dortoir habituel du Massegros compte 1 seul oiseau en janvier/février et décembre (record de 81 en 2015, moyenne de 30 oiseaux). La pinède initiale telle qu'en 2007 a beaucoup changé depuis et n'est peut-être plus favorable à un dortoir ? Chants du 29/01 au 16/06 sur au moins 30 territoires principalement de 1000 à 1400 m et, fait peu commun, surtout en forêt le long des pistes, ceci sans doute à cause d'un déficit de rongeurs dans les prairies tandis qu'ils étaient nombreux en forêt grâce à une bonne fructification des conifères. 8 nichées produisent 16 jeunes (1x1, 6x2 et 1x3) du 12/05 au 06/08.

Hibou Moyen-Duc
reproduction 2017

Hibou moyen-duc
Le Massegros, 02/02/17
F. Legendre

HIBOU DES MARAIS *(Asio flammeus)* – **HM, rare** – *22 données (mais seulement 5 avec prospections positives)*. 1 le 07/01 au Massegros (R. NADAL), 2 le 12/02 à Chanet, causse Méjean, hivernants ou migrateurs puis 1 le **28/09** à Bonnecombe, Aubrac, 1 le 19/11 au Massegros et 2 le 27/11 à Sauveterre sur un dortoir déjà connu (FLe).

NYCTALE DE TENGMALM *(Aegolius funereus)* – **N séd loc.** *-160 données (59 en 2015) dont 57 données avec contact positif)*. Le réseau "Petites Chouettes de Montagne" (ALEPE et Parc national des Cévennes) s'étoffe peu à peu avec un très bon cru 2017 : **78-83 territoires**, au moins 39 reproductions dont 12 nichées observées produisant 44 jeunes.
Concernant le territoire du Parc national des Cévennes (Gard/Lozère), les résultats sont les suivants : 100 contacts de mâles chanteurs pour **55-60 territoires** estimés et 5 nichées complètes produisant 25 jeunes dont une nichée de **7 poussins** !
- 24-27 territoires sur le massif de l'Aigoual, 18 reproductions, 3 échecs,

- 5 territoires sur le massif Causses-Gorges, 2 reproductions,
- 24-30 territoires sur le Mont Lozère, 11 reproductions, 10 loges occupées (sur 114 loges trouvées) et 6 nichées produisant 14 jeunes (1-4).
- 0 contact dans les Vallées Cévenoles.

Sur le reste du département de la Lozère, bien qu'encore très parcellaire au vu de la surface potentielle, le suivi s'organise et s'étend peu à peu. Le bilan est là aussi très bon avec **23 territoires**, 3 reproductions certaines pour 5 poussins au moins.
- Aubrac : 5 territoires et 3 chanteurs,
- Margeride : 17 chanteurs (Goulet, 8 et une nichée à 5 poussins), Gardille (5) et Margeride nord-ouest (4),
- Causse Méjean : 1 chanteur.

Nous avons assisté à un printemps remarquable suite à une importante faînée en 2016 et donc de belles populations de rongeurs forestiers. La précocité de l'espèce fut exceptionnelle avec des chanteurs entendus dès début décembre et l'observation à la loge d'un poussin le 6 avril indiquant une ponte dans les premiers jours de février.

Nyctale de Tengmalm juvénile
Mont Lozère, G. Chamming's

Chouette de Tengmalm
reproduction 2017

La **CHEVÊCHETTE** ne fut pas recontactée sur l'ensemble du territoire malgré des recherches systématiques à l'occasion des prospections de Tengmalm.
(collectif ALEPE et Jérôme Molto/Parc National des Cévennes).

Engoulevent d Europe
reproduction 2017

ENGOULEVENT D'EUROPE *(Caprimulgus europaeus)* – **NM, ass. Comm. -** *83 données.* Du 21/04 au 06/09. Chants du 12/05 au **06/09** à Gabrias (JLB) et 20 données au-dessus de 1000 m dont 15 en période nuptiale. Max de 4 le 27/05 à Saint-Pierre-des-Tripiers (L. CHEVALLIER). Un jeune à l'envol noté le 20/07 à Altier (JLB).
En région : du 14/04 à Ferrières-les-Verreries-34 (S. POPY) au 18/09 à Fitou-11 (K. KNUDSEN).

MARTINET NOIR *(Apus apus)* – **NM, comm.** – *395 données (299 en 2016).* Du 11/04 au 10/09 avec arrivée massive la première décade de mai et départs la dernière de juillet. Il y a 18 données de reproductions certaines du 23/05 au 26/08. La migration est notée du 27/04 au 11/05 (max 100 les 07, 08 et 11/05) et du 20/07 au 10/09 pour un max de 1000 le 20/07 à Rieucros, Mende (Jbe).
Jean Belhache nous communique quelques résultats du suivi 2017 (qu'il réalise annuellement sur plusieurs colonies de Lozère) :
La médiocre météo de la première quinzaine de mai n'a pas d'incidence néfaste sur la reproduction des martinets en cours d'installation. Par contre, le beau temps chaud qui s'installe durablement leur permet d'élever leur nichée en un temps record et d'écourter leur séjour (déjà plus d'un millier en migration le 20 juillet à Mende).
À périmètre égal (6 communes concernées), 6 nouvelles anfractuosités ''actives''sont découvertes en 2017, ce qui porte à 162 le nombre de cavités connues pour avoir été utilisées au moins une fois depuis 8 ans. 99 d'entre elles sont contrôlées depuis la rue ; 52 étaient fréquentées (soit 52,5 %, un taux habituel), dont 39 par des reproducteurs avérés (75,0 %, un taux élevé) et 13 par des oiseaux sans attache familiale (25,0 %). Aucune nichée tardive n'est décelée (envol postérieur au 15 août).
2017 s'inscrit dans la suite des ''bonnes années''.

En région : du 21/03 à Frontignan-34 (P. GENIEZ) au 18/10 Portiragnes-34 (P. GITENET).

Martinet a ventre blanc
reproduction 2017

MARTINET À VENTRE BLANC *(Tachymarptis melba)* - **N loc., M** – *80 données*. Du 25/03 au 21/09. 3 données de reproduction : nourrissages le 30/07 à Saint-Georges-de-Lévéjac, 2 couples sur le récent viaduc autoroutier de la Colagne au Monastier le 05/06 rentrant sous le tablier et 1 couple le 02/06 à Sainte-Énimie (FLe).
Migration postnuptiale notée du 27/08 au 20/09 avec max de 128 en un seul groupe le 10/09 en migration au Puech Debon.
En région : du 04/03 à Port-la-Nouvelle-11 (J. PAOLI) au 18/10 à Cerbère-66 (K. MONOD).

MARTIN-PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) – **N, trans.** – *135 données (182 en 2016).* 4 données cette année au-dessus de 1100 m (2 en 2016) et toujours un nombre bien plus élevé d'observations en période post-nuptiale (deuxième décade d'août à première de janvier). Les observations en période de reproduction se situent quasi exclusivement dans la vallée du Lot et les Gorges du Tarn. Il y a 2 données seulement de reproduction avec 1 jeune volant nourri le 11/06 à Sainte-Énimie et un nourrissage à Booz le 15/06 (FLe).

Martin-pêcheur d'Europe
reproduction 2017

Martin-pêcheur d'Europe
phénologie 2017

Martin-pêcheur d'Europe
Marchastel, 23/09/17, R. Destre

GUÊPIER D'EUROPE *(Merops apiaster)* - **M peu commun, régulier** – *26 données pour 211 individus*. Du 23/04 au 20/06 et du 26/07 au **22/09**. Max d'une quarantaine d'individus le 17/08 à Ribennes (JLB). Encore une belle année pour l'espèce. 1 individu observé les 18 et 20/06 au-dessus de Marvejols comme l'année passée sans nicheur trouvé (RD), à suivre...

ROLLIER D'EUROPE *(Coracias garrulus)* – **M peu commun** – *61 données pour **53** oiseaux.* Du 02/08 au 18/09. Encore une belle année après une année déjà riche en 2016 (26 données pour 51 oiseaux) avec des observations sur tout le département et jusqu'à 1200 m mais avec plus d'oiseaux sur les causses (biais observateur probable). Max de 5 individus le 26/08 (FLe) et 30/08 (MLC, FLe) sur le causse Méjean.

Guêpier d'Europe
répartition 2017

Rollier d'Europe
Trélans, 21/08/17, P. Thouvenot

Rollier d'Europe
répartition 2017

Huppe fasciée
hivernage
(du 01/12/15 au 29/02/16)

Huppe fasciée
hivernage
(du 01/12/16 au 29/02/17)

Huppe fasciée
reproduction 2017

Huppe fasciée
St-Etienne-du-Valdonnez, 21/03/17
M. Jamier

HUPPE FASCIÉE *(Upupa epops)* – **NM, peu comm.** – *163 données (124 en 2016, 89 en 2015).* Du 12/03 au 18/09 et 1 le **14/11** à Saint-Laurent-de-Trêves (R. BOUAT) (!!). Chants du 08/04 au 14/06. L'espèce semble poursuivre sa progression en hivernage en région (198 données de décembre à février pour 171 hiver 2015/2016) mais elle n'est pas encore notée en hiver en Lozère. Notons 1 individu chanteur en migration à 1500 m (!) sur le Mont Lozère (PLu/PNC). Nourrissages dès le 21/04 et 6 nichées notées pour 12 jeunes (1x1, 1x3, 4x2) dont 3 poussins au nid dans une ruche tronc le 28/06 à Saint-Maurice-de-Ventalon (obs. Parc national des Cévennes).

TORCOL FOURMILIER *(Jynx torquilla)* – **NM, peu comm.** – *56 données (130 en 2016).* L'espèce enregistre cette année le moins d'observations depuis 2013. Présence le plus souvent dans les vallées du Lot, Tarn et sur les causses du 10/04 au 06/09. Chants du 29/04 au 27/06 et aucune donnée de reproduction… Espèce à suivre pour l'année à venir.

Torcol fourmilier
reproduction 2016

Torcol fourmilier
reproduction 2017

PIC VERT *(Picus viridis)* – **N séd.-** *645 données*

Chants du 04/01 au 24/06 puis les 26/07 et 21/08. Deux nichées de 3 poussins notées les 24/06 et 08/07.

PIC NOIR *(Dryocopus martius)* – **N séd.** -*188 données.* Tambourinages du 29/01 au 18/03. Trois données de reproduction certaine avec une nichée d'un seul poussin le 26/05 sur Mont Lozère (PLu) et au moins 1 poussin le 07/07 à Grèzes (MLC).

PIC ÉPEICHE *(Dendrocopos major)* – **N séd. -** *541 données.* Tambourinages du **01/01** au 25/04 puis les 10/10 et 12/10. Chants du 01/01 au 14/05 puis bribes de chants le 09/08. Nourrissages du 16/05 au 24/06 avec 4 nichées détaillées (2x1, 2x2).

Torcol fourmilier
Le-Pont-de-Montvert, 26/08/18
F. Burst

Pic mar
reproduction 2017

Pic mar juvénile
Banassac, 03/06/17
F. Legendre

PIC MAR *(Dendrocopos medius)* – **N rare** – *28 données.* Toujours 6 territoires notés autour de Banassac mais pas noté ailleurs en période nuptiale. Chant noté le 25/03 et un jeune juste volant à Banassac le 03/06 (FLe, EBa). À noter une observation excentrée le 14/04 à Cassagnas (PNC), signe que l'espèce continue son expansion géographique vers l'est. À suivre…

PIC ÉPEICHETTE *(Dendrocopos minor)* – **N séd. Peu comm. -**
20 données. Tambourinages du 18/01 au 22/04 puis le 25/10 et chant noté le 21/01 sans donnée de reproduction certaine. Aucune donnée au-dessus de 1000 m, essentiellement dans les vallées du sud du département où la "gestion" actuelle des rives avec élimination des vieux arbres (qui sont soit disant un risque pour les ouvrages d'art en cas de crue) menace l'espèce déjà en forte régression en France.

Pic épeichette
reproduction 2017

ALOUETTE CALANDRE *(Melanocorypha calandra)* – **N ? loc. Rare** –
2 données. 1 individu observé le 30/08 au sud de Drigas sur le causse Méjean (RD, PFe). Première observation confirmée depuis 2009.

ALOUETTE CALANDRELLE *(Calandrella brachydactyla)* – **N loc. Rare** – *1 donnée*. 1 individu aux Redoundous, Méjean le 17/05 (Alain LEBOSSÉ); site classique pour cette espèce très difficile à détecter au milieu du concert des alouettes des champs.

ALOUETTE LULU *(Lulula arborea)* – **NM, H rare** – *535 données*. Du 29/01 au 29/11. Chants du 31/01 au 26/07 puis du 22/09 au 28/10 n'excédant que rarement 1300 m. Nourrissages du 13/05 au 06/06 et 5 nichées détaillées pour 17 jeunes (1x2, 1x3, 3x4). Migration du 17/09 au 19/11 avec max de 73 en 4 heures le 21/10 au Puech Debon.

Alouette lulu
reproduction 2017

Alouette des champs
reproduction 2017

ALOUETTE DES CHAMPS *(Alauda arvensis)* - **NM, H rare** - *840 données*. Notée toute l'année mais peu fréquente avant mi-février et après début décembre. Max de 150 à Allenc le 10/03 (MLC, A. RICHARD). Chants du 15/02 au 22/08 puis un le 18/10. Nourrissages du 17/05 au 10/07 sans nichées détaillées. Migration du 29/01 au 11/03 et du 22/09 au 19/11 avec max de 602 en 1 heure le 27/10 au Puech Debon.

HIRONDELLE DE RIVAGE *(Riparia riparia)* – **M rare** – *16 données*. Du 21/03 au 30/06. 1 le 06/08 puis du 02/09 au 30/09. Max d'une dizaine à Naussac le 02/09 (FLe).

HIRONDELLE DE ROCHERS *(Ptyonoprogne rupestris)* – **NM** – *491 données*. 1 individu noté le 09/01 puis du 17/02 au 15/11. Nourrissages du 18/06 au 31/08. 8 nichées notées pour 28 jeunes. (1x2, 3x3, 3x4, 1x5).
Migration notée le 20/02 à Booz (FLe) puis du 24/09 au 11/10 au Puech Debon.

Hirondelle de rochers
reproduction 2017

Hirondelle de rochers
Marvejols, 01/07/17, R. Destre

Hirondelle rustique
Le Pompidou, 13/06/17, M-N. & B. Couturaud

HIRONDELLE RUSTIQUE *(Hirundo rustica)* - **NM, comm.** - *611 données*. Du 13/03 au 21/10. Nourrissages du 06/06 au 23/08 et 35 nichées notées de 2 à 6 poussins pour 128 jeunes.
Migration du 13/03 au 21/05 et du 23/08 au 21/10 avec max de 2036 individus au moins en 3 heures 45 en flux quasi monospécifique le 23/09 au Puech Debon.
En région : du 09/02 à Castelnou-66 (P. MACH) au 25/11 à Villeneuve-lès-Maguelone-34 (M. FLAMAND).

HIRONDELLE DE FENÊTRE *(Delichon urbicum)* – **NM, comm.** – *353 données.* Du 12/03 au 12/10. Poussins au nid du 14/06 au **22/09** avec une seule nichée de 5 jeunes inventoriée (seulement 1 ou 2 poussins sont le plus souvent visibles au nid et donc notés comme tels).
Migration du 27/04 au 11/05 et du 20/08 au 07/10 sans max notables.
En région : du 22/02 à Villeneuve-lès-Maguelone-34 (M. GAGLIARDONE) au 24/11 à Port-la-Nouvelle-11 (G. OLIOSO).

Hirondelle de fenêtre
Sainte-Enimie, 13/05/17
E. Barthez

Hirondelle de fenêtre
reproduction 2017

PIPIT ROUSSELINE (*Anthus campestris*) – **NM, comm. Loc.** - *170 données.* Du 21/04 au 24/09 essentiellement sur les causses Méjean et de Sauveterre. Peu de chants notés, du 15/05 au 12/06. Nourrissages du 29/06 au **12/08** à Drigas (PFe). Hors causses : 2 territoires notés au ravin des Sagnes (Prévenchères) le 16/05 (FLe) et nidification probable sur 2 territoires au Massegros (FLe). À noter une observation en période nuptiale le 20/07 à Altier (JLB). Il serait intéressant de le rechercher sur les plateaux secs de l'est lozérien.

Pipit rousseline juvénile
causse Méjean, 31/07/17
E. Barthez

PIPIT DES ARBRES *(Anthus trivialis)* – **NM, comm.** – *259 données.* Du 10/04 au 21/10. Chants du 10/04 au 28/07 dans l'ensemble du département. Il n'y a que 4 nourrissages notés du 25/05 au 25/07.
Migration postnuptiale notée au Puech Debon du 23/08 au 21/10 avec max de 125 en 3 heures le 10/09.

Pipit farlouse
reproduction 2017

Pipit farlouse
Marchastel, 28/10/17, R. Destre

PIPIT FARLOUSE *(Anthus pratensis)* – **NM, H rare** – *409 données.* Contacté toute l'année mais se fait rare jusqu'à fin février et après fin décembre. Chants du 15/03 au 08/07. Nourrissages du 30/04 au **24/08** aux Salces (P. BOISSIER).
Migration prénuptiale notée du 25/02 et 26/03 et du 20/09 au 19/11 avec max de 124 en 1 heure 20 le 27/10 au Puech Debon.

PIPIT À GORGE ROUSSE *(Anthus cervinus)* – **M, rare** – *5 données.* Sur l'Aubrac : 1 ind le 12/04 au Mailhebiau avec des pipits spioncelles, 1 le 23/04 puis 1 femelle le 30/04 à Usanges (FLe), 4 aux Salhiens le 26/04 (RD) et enfin 1 femelle observée à la lavogne de Hures (Méjean) le 21/04 (L. BARBARO).
En région, quasi uniquement sur le littoral : 106 données pour 194 oiseaux (34 en 2016, max 77 données en 2014) du 02/04 à Port-la-nouvelle-11 (G. OLIOSO) au 13/05 à Villeneuve-lès-Maguelone-34 (V. ROBERT) puis noté en migration le 04/10 à Vendres (S. REYT).

Pipit spioncelle
reproduction 2017

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*) – **N loc., MH peu comm.** – *149 données (131 en 2016).* Rare du 01/05 au 28/10, migrateurs notés les 29/01 et 22-23/10 au Puech Debon et petit max de 18 le 06/04 à Saint-Alban-sur-Limagnole (JLB). Chants les **22/04** et 21/05 sur Aubrac et Mont Lozère (MLC, FLe). Noté en période nuptiale sur Aubrac, Mont Lozère et Aigoual.
Il y avait 6 territoires notés le 21/06 lors de prospections ciblées autour du Mailhebiau, Aubrac (9 en 2016) avec chants, parades et nourrissages (FLe). Première donnée nuptiale récente sur l'Aigoual avec un jeune à l'envol noté le 31/05 à Bassurels (GTo), secteur à suivre..

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *(Motacilla flava)* - **N loc., M peu comm.**

Bergeronnette printanière
Usanges 23/04/18, F. Legendre

Sous-espèce non spécifiée : *74 données* du 25/03 au 18/10. Migration notée au Puech Debon du 24/08 au 18/10 avec max la première décade de septembre.

- Sous-espèce britannique *flavissima* (Bergeronnette flavéole) : *0 donnée*
- Sous-espèce type *flava* : *8 données* du 23/03 au 20/05 dont 1 chanteur à Usanges les 11 et 23/04 (FLe).
- Sous-espèce scandinave type *thunbergi* : *2 données*. 1 mâle noté les 28 et 30/04 aux Salhiens (F. OLIVIER, FLe).
- Sous-espèce ibérique *iberiae* : *0 donnée*
- Sous-espèce « centratlantique » *flava x iberiae* : 11 données du 11/04 au 03/08 au moins pour 3 couples à Usanges (au moins 2 jeunes produits), 1 couple aux Salhiens et un nouveau à Montbel le 16/05.
- Sous-espèce d'Italie *cinereocapilla* : *1 donnée*. 1 mâle le 03/05 à Usanges (FLe).

Bergeronnette grise juvénile
Canilhac, 02/08/18, G. Tolmos

Bergeronnette des ruisseaux
reproduction 2017

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *(Motacilla cinerea)* – **N séd., trans.** – *308 données*. Chants du **21/02** au 21/05 et nourrissages du 31/03 au 13/07. 4 nichées détaillées pour 11 jeunes (2x2, 1x3, 1x4).

BERGERONNETTE GRISE *(Motacilla alba)* – **NM comm., H rare** – *684 données*. Peu fréquente jusqu'au 28/02 et après le 01/11 . Chants du 09/03 au 03/06 puis 1 le 01/07. Nourrissages du 04/05 au 27/07. Jeunes notés le plus souvent à l'unité et seulement 4 nichées détaillées pour 12 jeunes (2x2, 1x3, 1x5).
Max de 86 en pré-dortoir sur un terrain de foot le 26/10 à Saint-germain-du-Teil (FLe) et de 65 dans un pâturage le 07/09 à Malbouzon (JLB). Migration prénuptiale du 25/02 au 14/03, postnuptiale du 16/09 au 15/11 avec max de 454 en 3 heures le 22/10 (total record de 1286).

CINCLE PLONGEUR *(Cinclus cinclus)* - **N séd, trans.** – *300 données*. Chants du 20/09/2016 au 09/03/2017 et reprise le 05/09. Nourrissages du 10/04 au 25/06 avec 8 petites nichées notées pour 12 jeunes (4x1, 4x2).

TROGLODYTE MIGNON *(Troglodytes troglodytes)* – **N séd.** – *673 données*. Chants du 23/01 au 08/12 avec un creux du 25/07 au 11/09 (1 seul chanteur noté). Envol à partir du 16/05 et nourrissages jusqu'au 28/06 avec 4 nichées détaillées pour 15 jeunes (1x2, 2x4, 1x5). Noté à toutes altitudes sur l'ensemble du département, hormis l'Aubrac ouvert.

ACCENTEUR MOUCHET *(Prunella modularis)* – **NMH** – *408 données*. Chants du 15/02 au 14/07 puis les 23/09 et 13/10. Envol après le 05/06 et 2 nichées détaillées pour 5 jeunes (1x2-1x3). Migration du 27/09 au 27/10 au Puech Debon.

Cincle plongeur
reproduction 2017

Troglodyte mignon
reproduction 2017

Troglodyte mignon
Le Moulinet, 22/11/17, R. Destre

Cincle plongeur
reproduction 2017

ACCENTEUR ALPIN *(Prunella collaris)* – **H loc.** – *46 données (48 en 2016) et 34 hiver 2016/2017 (61 hiver 2015/2016).* Du 09/10/16 au 22/04/17 puis à partir du 07/10. Max de 11 le 17/12 à Saint-Julien-du-Tournel (DBu).

Accenteur alpin répartition 2017

Rougegorge familier reproduction 2017

ROUGEGORGE FAMILIER (*Erithacus rubecula*) – **NMH** – *1154 données.* Chante toute l'année mais plus rarementmais surtout de février à juin et en octobre/novembre. Noté majoritairement sous 1300 m mais présent jusqu'à 1600 m. Nourrissages du 16/05 au 28/05 et 4 nichées détaillées pour 10 jeunes (2x2, 2x3). Toujours très peu de données de reproduction certaine...

Rossignol philomèle reproduction 2017

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*) – **NM ass. Comm.** – *365 données.* Du 16/04 au 21/08. Chants du 17/04 au 03/07. Il y a 20 données au-dessus de 1000 m en période nuptiale. Deux données de reproductions : 3 jeunes quémandant le 23/06 au Massegros (FLe) et 2 jeunes à Montrodat le 14/08 (RD).
En région du 20/03 à Valleraugue-30 (M. GARCIA) au 24/09 sur plusieurs secteurs.

GORGEBLEUE À MIROIR *(Luscinia svecica)* – **NM comm., H rare** – *4 données.* 1 type femelle le **30/09** à Usanges (RD) et 1 mâle à la station d'épuration de Banassac les 07 et **08/10** (FLe, EBa).

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) – **NM comm., H rare** – *1000 données.* Noté partout mais rare en hiver sur la moitié sud du département où il se cantonne aux vallées lors des coups de froid : 39 données en janvier/février et 50 en novembre/décembre. Arrivées à partir du 11/03 et départs massifs du 07/10 au 26/10 avec quelques beaux regroupements comme ces **+50** individus au Mont Aigoual le 26/10 (RD). Chants du 05/03 au 18/07 puis du 14/08 au 21/10 et 1 le 15/12. Nourrissages du 24/04 au 16/08 et 23 nichées détaillées pour 67 jeunes (9x2, 8x3, 5x4, 1x5).
Quelques individus notés en migration du 11/03 au 04/04 et du 23/09 au 12/11.

Rougequeue a front blanc reproduction 2017

Tarier des prés reproduction 2017

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC *(Phoenicurus phoenicurus)* – **NM ass. Comm.** – *279 données (191 en 2016).* Espèce en augmentation régulière depuis 2011, observée de plus en plus tardivement. Du 04/04 au **26/10** (FLe). Chants du 07/04 au 27/06 jusqu'à 1350 m. Nourrissages notés du 23/05 au 18/07 et 2 nichées de 3 poussins notées à Boudoux (MLC) avec premier envol le 11/06.

TARIER DES PRÉS (*Saxicola rubetra*) – **N loc., M** – *307 données (284 en 2016).* Du 14/04 au 20/10. Chants du 23/04 au 22/06. Nourrissages du 21/05 au **16/09**. 13 nichées notées pour 29 jeunes (2x1, 4x2, 5x3, 1x4) dont nourrissage de 4 poussins le 16/09 à Bagnols-les-Bains (DBu). Max de 15 le 03/08 à Saint-Laurent-de-Muret (PTh) et le 15/09 à Usanges (RD).

De gauche à droite et de haut en bas :
1 - Tarier des prés, Le Recoux, 05/05/18, F. Legendre
2 - Accenteur alpin, Florac, 09/11/17, E. Barthez
3 - Tarier pâtre juvénile, Fraissinet-de-Fourques, 26/06/17, A. Fleixas
4 - Accenteur alpin, Mont Aigoual, 31/10/17, X. Rufray
5 - Rougequeue noir, Mont Aigoual, 26/10/18, R. Destre
6 - Gorgebleue à miroir, Banassac, 08/10/18, F. Legendre
7 - Traquet motteux fem., Allenc, 13/05/17, F. Legendre
8 - Traquet motteux, Lachamp, 04/05/17, P. Honnorat
9 - Traquet motteux juvénile, Saint-Denis-en-Margeride, 26/07/17, L. Chevallier

TARIER PÂTRE *(Saxicola torquatus)* – **NM, H rare** – *506 données*. Surtout du 19/02 au 27/10 et observations hivernales peu fréquentes mais régulières. Retour des oiseaux durant la première décade de mars puis départ la dernière décade de septembre. Peu d'oiseaux au-delà de 1400 m. Chants du 20/02 au 27/06 puis 1 le 09/08. Nourrissages notés du 29/04 au 16/09, premier envol le 11/05 et 19 nichées détaillées pour 46 jeunes (11x2, 8x3). Un couple bien suivi conduit trois nichées.

Tarier pâtre
reproduction 2017

Traquet motteux
reproduction 2017

TRAQUET MOTTEUX *(Oenanthe oenanthe)* - **NM ass. Comm. Loc.** – *605 données (685 en 2016)*. Du 20/03 au 28/10. Chants du 12/04 au 12/06, nourrissages à partir du 10/06 et envols du 18/06 au 29/08. 9 nichées bien renseignées (c'est très peu !) pour au moins 24 jeunes à l'envol (4x2, 4x3, 1x4).

TRAQUET OREILLARD *(Oenanthe hispanica)* – **MN, très rare** – *5 données dont 3 négatives et 2 positives.* Uniquement sur le causse Méjean. Retour du mâle observé en 2015 à Nivoliers, revu seulement le 26/05 (L. CHEVALLIER). Un couple noté le 01/06 à Gally, causse Méjean (D. HOLTZ) sans suite notée.

Monticole de roche
Gatuzières, 01/06/17, D. Holtz

MONTICOLE DE ROCHE *(Monticola saxatilis)* – **N loc., M** – *42 données (30 données en 2016).* Du 19/04 au 24/09. Chants notés du **21/04** (FLe) au 16/05. En forte régression en Lozère, il fournit toujours quelques données nuptiales en dehors de son bation actuel qu'est le causse Méjean : Mont Lozère, Prévenchères, causse de Sauveterre mais aucune des Cévennes cette année. Il y a une seule donnée de reproduction certaine avec 2 jeunes le 20/08 à Hures-la-Parade (C. BALCON, S. MAUVIEUX, G. SIX).

MONTICOLE BLEU *(Monticola solitarius)* – **N loc, H rare** – *6 données.* Du 15/05 au 25/05 puis le 13/10.
Noté à l'unité dans les couronnes du causse Méjean : Frépestel les 15 et 16/05 (A-L. GEBOES, O. DURIEZ), Gally le 16/05 (A-L. GEBOES), Point Sublime le 24/05 (L. CHEVALLIER), Saint-Pierre-des-Tripiers le 25/05 (L. CHEVALLIER) et un mâle observé le 13/10 à Fraissinet-de-Fourques (JLB).

MERLE À PLASTRON *(Turdus torquatus)* – **N loc., M** – *22 données (47 en 2016).*
Sous-espèce indéterminée : 21 données du 15/03 au 26/04 puis du 23/09 au 26/10. Max d'une cinquantaine le 15/03 au col de Finiels (PLu/PNC). Chant noté le 16/07.
Migration postnuptiale notée au Puech Debon du 30/09 au 26/10.
Ssp torquatus : 13 données du 25/03 au 03/05 puis du 22/09 au 09/11.
Ssp alpestris (se reproduisant en Lozère) : 4 données des 22/04 au 14/10 dont une reproduction possible sur le truc de Fortunio ave cun couple le 16/07 (P. Duboc), plus noté là (faute d'observateurs indéniablement) depuis 1998 !

MERLE NOIR *(Turdus merula)* – **NMH comm.** – *1452 données.* Rare au-delà de 1300 m (37 données). On observe toujours une baisse du nombre d'observations du 10/07 au 10/10. Chants du 01/02 au 29/07 puis les 18/10 et 09/12. Nourrissages du 28/02 au 25/06 et 9 nichées détaillées pour 26 jeunes (4x2, 2x3, 3x4). Les mouvements migratoires, discrets, sont ressentis notamment lors des coups de froid qui poussent nombre d'oiseaux dans les vallées.

Merle noir
reproduction 2017

GRIVE LITORNE *(Turdus pilaris)* – **N loc., MH** – *329 données* . Notée migratrice jusqu'au 25/03 et à partir du 07/11. La (petite) vague de froid de mi-janvier fait disparaître les troupes de 100-300 oiseaux notées un peu partout. Sur la période 01/01-20/03 il y a 47 % d'oiseaux en plus pour 12 % de données en plus ce qui indique environ qu'il y eut 30-35 % d'hivernantes en plus en 2017 qu'en 2016.
19 communes sont concernées par des codes atlas de 1000 à 1500 m d'altitude entre le 23/03 et le 27/07 mais sans nichée notée.
L'hivernage 2017/2018 est peu fourni, 1378 individus pour 78 données sans aucune troupe excédant 100 oiseaux contre 10 154 oiseaux (156 données) en 2016, le froid de décembre ayant visiblement fait fuir les oiseaux contrairement à 2016 où décembre fut pluvieux et fixa de nombreuses troupes se nourrissant au sol des nombreux lombrics accessibles.

Grive litorne
reproduction 2017

GRIVE MUSICIENNE *(Turdus philomelos)* – **NMH ass. Comm.** – *476 données (274 en 2016).* Notée toute l'année mais rare (et très discrète) en hiver : 22 données en janvier et 11 en décembre. Chant du 15/02 au 03/08. Seulement 2 données de nidification certaine : 2 jeunes le 15/06 à Bagnols-les-Bains (DBu) et un poussin le 23/06 à Saint-Georges-de-Lévéjac (FLe). Migration postnuptiale notée du 23/09 au 15/11, max de 434 le 15/10 au Puech Debon.

GRIVE MAUVIS *(Turdus iliacus)* – **MH comm.** – *41 données.* Devient globalement de plus en plus rare. Jusqu'au 23/03 (max de 50 le 09/03-RD) et à partir du 04/10 (seulement 15 données du 04/10 au 31/12, max de 7).

GRIVE DRAINE *(Turdus viscivorus)* – **NMH ass. Comm.** – *720 données.* Chants sporadiques à partir du 19/11/2016 puis réguliers du 02/02 au 05/07 et à nouveau sporadiques à partir du 23/09. Une seule nichée certaine de 2 poussins nourris le 28/05 à Bagnols-les-Bains (DBu) mais nourrissages notés du 21/04 au 30/06. Pas de grandes troupes supérieures à 40 oiseaux cette année. Migration du 16/09 au 19/11 sans grosse journée détectée.

CISTICOLE DES JONCS *(Cisticola juncidis)* – **N rare., M** – *26 données* (38 en 2016). Du **23/04** au 05/10. 2016 connut un bel afflux d'oiseaux jusqu'au 16/12 laissant augurer un possible hivernage. C'était sans compter sur la vague de froid de janvier ! Des oiseaux semblent de passage en avril-mai à Chanteruéjols (Mende) ou à Prades (Sainte-Énimie), sans doute des migrateurs de retour au vu des dates inhabituellement précoces pour la Lozère. Le bastion (connu) de l'espèce en Lozère est à Ispagnac (jusqu'à 5 chanteurs en juin, info Parc national des Cévennes). On la note également en période de reproduction au Monastier (friche au bord de l'échangeur du viaduc de la Colagne avec nourrissages le 05/06 - FLe), aux Bories (Saint-Bonnet-de-Chirac), au Pompidou et à Usanges (nourrissages le 16/08 - FLe). Il y a visiblement quelques oiseaux en dispersion de fin d'été, phénomène classique dorénavant, comme au lac du Moulinet et à Charpal.

Cisticole des joncs
reproduction 2017

LOCUSTELLE TACHETÉE *(Locustella naevia)* – **N rare., M** – *4 données.* En migration : 1 chanteur le 28/04 et 1 ind. le **01/10** à Usanges (J-C GARLENC, FLe). 2 x 1 ind. le 12/05 dans des landes à genêts à Arzenc-de-Randon et La Panouse (JLB).

PHRAGMITE DES JONCS *(Acrocephalus schoenobaenus)* – **M, rare** – *1 donnée.* Un juvénile à Usanges le 16/08 (FLe), site et date classiques.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *(Acrocephalus scirpaceus)* – **N ?, M peu comm.** – *29 données.* Au printemps, chanteuses en migration le 05/05 à Ispagnac (C. BERNIER) et le 28/05 à Saint-Pierre-des-Tripiers puis du 31/08 au 26/10 dont 21 données sur le filtre à roseaux de la station d'épuration de Banassac avec max de 5 individus le 03/10.
En région : du 02/04 au 31/10.

Locustelle tachetée
Usanges, 01/10/17
F. Legendre

Phragmite des joncs
Usanges, 16/08/17
F. Legendre

Rousserolle effarvate
station d'épuration de Banassac, 16/10/17
F. Legendre

Hypolaïs polyglotte
reproduction 2017

HYPOLAÏS POLYGLOTTE *(Hippolais plolyglotta)* – **NM, peu comm.** – *119 données (92 en 2016).* Du 27/04 au 28/08. Chants du 01/05 au 05/07. 4 données de reproduction seulement avec nourrissages à partir du 24/05 et une nichée de 2 jeunes à l'envol le 06/07.

FAUVETTE À TÊTE NOIRE *(Sylvia atricapilla)* – **NM, H rare** – *893 données.* Rare jusqu'au 09/03 et après le 20/10 avec 4 à 14 données dans les mois d'hiver (2 à 9 en 2016) sans dépasser les 1000 m d'altitude (inf. à 700 m en 2016). Chants du 09/03 au 07/10, jusqu'à 1350 m. Nourrissages du 18/05 au 15/06 et 4 nichées détaillées pour 8 jeunes (4x2).

Fauvette à tête noire
reproduction 2017

Fauvette des jardins
reproduction 2017

FAUVETTE DES JARDINS *(Sylvia borin)* – **NM, ass. Comm.** – *108 données (71 en 2016).* Du 28/04 au 03/09. Chants du 05/05 au 19/07 puis un chant noté le **21/08** à Grèzes (MLC). Encore une année sans donnée de reproduction certaine.

FAUVETTE ORPHÉE *(Sylvia hortensis)* – **Estivant N loc.** – *74 données.* Du 28/04 au 20/08. Chants notés du 28/04 au 08/07 uniquement sur les grands causses hormis un chanteur le 13/05 à La Prade, Allenc (1150 m, migrateur en dépassement d'aire possible) et un chanteur à Chirac le 24/05 (FLe). 4 données de reproduction avec nourrissages à partir du 26/05 et 2 nichées de 2 jeunes à l'envol les 28/05 et 30/06.
En région : du 30/03 à Vendémian-34 (M. DUQUET) au 08/09.

Fauvette orphée
reproduction 2017

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) – **NM, comm.** – *427 données (404 en 2016).* Du 18/04 au 24/09. Chants du 20/04 au 15/07. Nourrissages à partir du 23/06 et envol après le 26/06 avec 4 nichées détaillées pour 13 jeunes (2x2, 1x3, 1x6).
En région : du 02/04 à Leucate-11 (M. VIALLET) au 28/09 à Canet-en-Roussillon-66 (M. TOUPIN).

FAUVETTE À LUNETTES (*Sylvia conspicillata*) – **NM, rare** – *12 données.* Notée du **29/04** au 09/07 uniquement sur le causse Méjean où **5 sites** sont occupés cette année, un record dû sans doute à une recherche accrue. D'autres sites sont indéniablement à (re)découvrir : 2 mâles chanteurs à Nivoliers du 29/04 au 05/07 dont un avec au moins 2 jeunes ce dernier jour (S. DUCHATEAU/PNC), un couple au carrefour de la grotte de Nabrigas le 17/05 (groupe CEPS), 1 chanteur le 26/05 à la Croix du Villaret (L. CHEVALLIER), 2 chanteurs le 12/06 à Peyregrosse (FLe) et encore 1 le 09/07 (B. RAYMOND) et enfin 1 le 08/07 près de Drigas (B. RAYMOND).

Fauvette pitchou
reproduction 2017

Fauvette passerinette
reproduction 2017

FAUVETTE PITCHOU *(Sylvia undata)* – **N séd. Loc. irrég.** – *46 données.* Notée toute l'année sur la moitié sud du département, rarement au-dessus de 1000 m sans dépasser 1300 m. 2 chanteurs le 22/02 sur le causse Méjean (A. VIRONDEAU) puis chants du 11/04 au 30/05. 3 données de reproduction certaine avec nourrissages le 13/07, 4 jeunes le 20/07 à Altier, 1226 m et 2 jeunes dépendants le 28/07 à Saint-Julien-du-Tournel (JLB).

FAUVETTE PASSERINETTE *(Sylvia cantillans)* – **N loc., M** – 96 *données.* Présence majoritairement sur les causses du 07/04 au 08/09. Chants du 11/04 au 28/06. Seulement 5 données de reproduction avec nourrissages du 19/05 au 26/06.

Fauvette orphée
Hyelzas, 20/07/17, B. Caradec

Fauvette grisette
Nasbinals, 11/08/17, G. Tolmos

Fauvette passerinette
Saint-Germain-de-Calberte, 20/04/17, A. Prampart

Fauvette a lunettes
Nivoliers, 29/04/17, F. Legendre

FAUVETTE MÉLANOCEPHALE (*Sylvia melanocephala*) – **N loc ? rare, M** – *4 données dont 3 positives.* Présence rare et localisée, dans les vallées cévenoles uniquement. au Collet-de-Dèze le 07/05 (A. MÉGY) et 2 occupant 2 sites distincts à Saint-Germain-de-Calberte le 19/10 (FLe).

POUILLOT À GRANDS SOURCILS (*Phylloscopus inornatus*) - **M exc.** – *9 données pour 3 individus.* Année record et la première avec plusieurs individus observés dans des saules ou des peupliers du 11/10 au 28/10. 1 le 11/10 au bord du Lot à Banassac, 1 le 14/10 2 km en aval du précédent dans la ripisylve "fouillis" de Pratnau, Banassac et 1 stationnant du 24 au 28/10 au moins dans un Saule pleureur à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

Pouillot a grands sourcils
Saint-Germain-du-Teil, 27/10/17, F. Legendre

POUILLOT DE BONELLI *(Phylloscopus bonelli)* – **NM ass. Comm.** – *290 données.* Du 09/04 au 18/08. Chants du 10/04 au 17/07 puis le 08/08. Toujours dans le quart sud-ouest du département hormis quelques rares observations comme ce chanteur dans une chênaie à 850 m le 25/06 à Albaret-Sainte-Marie, pointe nord de la Lozère (FLe) et 2-3 chanteurs le 23/05 sur le Mont Lozère (alt. 1100 m) (PLu/PNC) indiquant soit des individus passés inaperçus jusqu'alors soit une progression nordique et altitudinale de l'espèce qui est susceptible de s'installer dans des adrets bien exposés. Cette espèce fait partie de celles qui seront favorisées par le réchauffement climatique et qui est à rechercher et suivre sur la Margeride où elles pourraient bien s'installer petit à petit dans les années à venir. 4 données de reproduction avec nourrissages du 23/05 au 11/06 et jeunes volants le 20/06.

Pouillot de bonelli
reproduction 2017

Pouillot siffleur
Saint-Germain-du-Teil
25/05/17, F. Legendre

POUILLOT SIFFLEUR *(Phylloscopus sibilatrix)* – **N rare M rare.** – *7 données pour 5 individus.* 2 chanteurs à Saint-Germain-du-Teil (secteur classique) les 03 et 25/05 (FLe), 2 chanteurs sur deux territoires du 08/06 au 10/06 à **Ribennes** (nouveau secteur) en pineraies-bétulaies (JLB) puis 1 individu en migration observé à Ribennes le 24/08 (JLB).

POUILLOT VÉLOCE *(Phylloscopus collybita)* – **NM comm.** – *802 données (721 en 2016).* Noté du 22/02 au 04/12, rare jusqu'au 04/03 et après le 25/10. Chants du 05/03 au 24/10 avec pause estivale du 15/07 au 23/09 (3 données). Envols du 18/06 au 07/07 et 3 nichées détaillées pour 7 jeunes (2x2, 1x3). Passages massifs en mars et du 20/09 au 25/10.

- **Pouillot de Sibérie** (ssp. *tristis*) : 1 de passage (dans quel sens ?) le **29/01** à Booz après deux semaines froides (FLe) et 1 « type sibérien *tristis/fulvescens* » les 05/03 et 24/03 à Booz (FLe).

POUILLOT FITIS *(Phylloscopus trochilus)* – **N prob, M** – *63 données.* Du 21/03 au 06/05 puis du 08/08 au 23/09. Chants du **21/03** au 02/05. Max de 4 le 20/04 à Banassac (FLe).
En région, du 12/03 à Saint-Bauzille-de-Montmel-34 (M. PÉCHAUD) au 14/11 à Frontignan-34 (G. PICOTIN).

Pouillot fitis
reproduction 2017

Roitelet huppé
Les Hermaux, 05/10/17
J. Dalmau

ROITELET HUPPÉ *(Regulus regulus)* – **N séd., M** – *160 données.* Chants du **23/01** au 05/07 puis 1 le 21/11. Max d'une dizaine les 09/11 à Cassagnas (M. BELLION) et 19/11 à Chadenet (DBu). Nourrissage d'un poussin le 03/05 aux Salces (FLe) et 1 jeune juste volant le 14/07 à Bassurels (S. WROZA).

ROITELET TRIPLE-BANDEAU *(Regulus ignicapillus)* – **NM, H local** – *274 données (177 en 2016).* 3 données en janvier, retours mi-février, départs mi-octobre puis seulement 5 données en novembre et 5 en décembre sous 1100 m. Chants du 18/02 au 08/08. Noté chanteur jusqu'à 1380 m. Il semble progresser en altitude ces dernières années, à confirmer. Nourrissages du 18/05 au 02/06 et 2 nichées de 3 jeunes notées.
Quelques individus en migration postnuptiale du 23/09 au 23/10 au Puech Debon.

GOBEMOUCHE GRIS *(Muscicapa striata)* - **N loc., M** – *36 données (44 en 2016).* Du 06/05 au 23/09. Chants notés les 17 et 18/05 seulement. Nourrissages du 16/06 au 13/08 et 4 nichées détaillées pour 8 poussins (4x2), sous 900 m uniquement (gorges et vallées).

GOBEMOUCHE NOIR *(Ficedula hypoleuca)* – **N loc., M** – *176 données (164 en 2016).* Migrateurs du 20/04 au 11/05 puis 6 mentions denicheurs du 22/05 au 07/07 uniquement dans les Cévennes méditerranéennes en milieu collinéen (chataigneraie) sur les communes de Barre-des-Cévennes, Molezon et Vialas. Migration du 08/08 au 07/10 avec pic la dernière décade de septembre.
En région : du 29/03 à Argelès-sur-Mer-66 (B. BATAILLER) au 24/10 à Vauvert-30 (J-P. TROUILLAS).

Gobemouche gris
reproduction 2017

Gobemouche gris
Langogne, 02/09/17, F. Legendre

Gobemouche noir
Le Buisson, 12/09/17, R. Destre

MÉSANGE À LONGUE QUEUE *(Aegithalos caudatus)* – **N séd.** – *322 données (271 en 2016).* Max de 18 à Badaroux le 22/01 (GTo). 14 données au-delà de 1200 m (max 1642m). Nourrissages du 17/04 au 14/06 et envols du **04/05** au 17/07. 8 nichées détaillées pour 40 jeunes (1x3, 2x4, 2x5, 2x6, 1x7). Quelques individus en migration notés du 02 au 27/10 au Puech Debon.

Mésange nonnette
reproduction 2017

Mésange nonnette
Marvejols, 22/11/17, R. Destre

MÉSANGE NONNETTE *(Poecile palustris)* – **N séd.** – *358 données.* Chants du 07/01 au 13/05 puis les 29/06 et 17/12. Nourrissages du 29/04 au 10/05 et envols à partir du 09/05 mais une seule nichée notée, de 2 jeunes au moins. Présence en période de reproduction essentiellement dans les vallées jusqu'à 1200 m, rare au-delà.

MÉSANGE HUPPÉE *(Lophophanes cristatus)* – **N séd.** – *342 données.* Chants du 31/01 au 28/03, les 14 et 24/06 puis du 11 au **13/08**. Nourrissages à partir du 09/05 et envols à partir du 23/06. 4 nichées détaillées pour 9 jeunes (3x2, 1x3). Présence en période de reproduction de 400 à 1400 m.

Mésange huppée
Marvejols, 23/11/17, R. Destre

MÉSANGE NOIRE *(Periparus ater)* – **N séd.** – *779 données.* Présence partout en période de reproduction au-delà de 400 m, principalement de 800 à 1400 m. Chants du 01/01 au 16/07. Nourrissages du **20/04** au 08/06 et 4 nichées détaillées pour 13 jeunes (1x2, 1x3, 2x4).
Migration record au Puech Debon du 28/08 au 19/11 avec **520** oiseaux dont **175** en 3 heures le 22/10.

MÉSANGE BLEUE *(Cyanistes caeruleus)* – **N séd., MH** – *829 données.* Chants du 14/01 au 12/06 puis le 13/08. Nourrissages du 21/04 au 07/06 puis du 07/07 au 06/08 (secondes nichées probablement) et envols du 20/05 au 12/08. 15 nichées détaillées pour 51 jeunes (5x2, 5x3, 2x4, 2x5, 1x8) dont une de 8 jeunes à l'envol le 20/05 à Montrodat (JBr) !
Grosse migration au Puech Debon du **28/08** au **19/11** de **510** oiseaux pour 120 h de suivi (max de 76 en 3 h le 04/10) un cran derrière 2012 sans doute (416 oiseaux pour 58 h dont 149 le 21/10).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) – **N séd., MH** – *1042 données.* Chants du 01/01 au 18/06, 1 chanteur en septembre, 2 en octobre puis sporadiquement à partir du 05/12. Nourrissages du 20/04 au 07/07 et envols du 22/05 au 27/07. 17 nichées détaillées pour 51 jeunes (6x2, 7x3, 3x4, 1x6).
À l'instar des autres mésanges beau passage pour cette espèce considérée sédentaire de 83 oiseauxdu 20/09 au 19/11 au Puech Debon avec max de 16 en 1 heure 45 le 26/10.

SITTELLE TORCHEPOT *(Sitta europaea)* – **N séd.** – *472 données.* Chants du 16/01 au 02/04. Envols du 11/04 au 25/06 et 3 nichées détaillées pour 8 jeunes (1x2, 2x3). À noter deux reproductions sur le Mont Lozère à 1150 m et 1400 m dans des trous de Pics noirs maçonnés (PLu/PNC), première donnée de reproduction au dessus de 1300 m !

Sittelle torchepot
Montrodat, 15/03/17, P. Honnorat

Tichodrome échelette répartition 1905-2017

Tichodrome échelette répartition 2017

TICHODROME ÉCHELETTE *(Tichodroma muraria)* – **H loc.** – *56 données (56 hiver 2016-2017 pour 84 hiver 2015-2016).* Du 28/10/2016 au 26/03 puis à partir du 05/10 avec pics de passage dans la dernière décade de novembre et dernière de février. Noté sur 27 lieux-dits durant l'hiver 2016-2017 sous 1100 m sauf 1 le 05/10 sur le mur de l'observatoire du Mont Aigoual à 1565 m d'altitude (RD).

En région : du 06/10/2016 à Notre-Dame-de-la-Rouvière-30 (GTo) au 17/04 à Porté-Puymorens-66 (A. PUJOL), 1 le 25/05 à Counozouls-11 (M. VASLIN), 1 le 13/08 à Eyne puis à partir du 05/10 sur le Mont Aigoual (RD). 84 données hors Lozère hiver 2016-2017 pour 127 hiver 2015-2016.

Tichodrome échelette
Palhers, 04/01/17, F. Legendre

Grimpereau des bois
Les Hermaux, 05/10/17, J. Dalmau

Rémiz penduline
Banassac, 15/10/17, F. Legendre

GRIMPEREAU DES BOIS *(Certhia familiaris)* – **N, localisé** – *44 données.* Chants du 18/02 au 07/05 puis 1 le 21/11. Contacté de 700 m à 1400 m en période nuptiale mais peut descendre plus bas ne hiver.

Seule donnée de reproduction : 3 jeunes juste volants nourris le 20/05 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

GRIMPEREAU DES JARDINS *(Certhia brachydactyla)* – **N séd ass. Comm.** – *345 données (275 en 2015).* Jusqu'à 1300 m. Chants du 01/01 au 07/07 puis les 13/09 et 29/11. Jeunes à l'envol le 28/06 et nourrissage noté le 11/07 : 2 nichées détaillées pour 6 jeunes (2x3).

Grimpereau des bois
reproduction 2017

Grimpereau des jardins
reproduction 2017

RÉMIZ PENDULINE *(Remiz pendulinus)* – **M ; très rare** – *3 données.* 6ème et 7ème mentions lozériennes avec 2 individus le 13/10 et 1 différent les 15 et 16/10 dans les phragmites de la station d'épuration de Banassac (FLe).

LORIOT D'EUROPE *(Oriolus oriolus)* – **N loc., M rare** – 47 *données (20 en 2016).* Du 05/05 au 30/06 puis le 16/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Chants du 05/05 au 30/06.

Loriot d'Europe
reproduction 2017

Peu noté en migration cette année : 1 chanteur à Saint-Pierre-des-Tripiers le 17/05 (groupe CEPS) et 1 chanteur le 28/05 à Prinsuéjols (MMu). Reste cantonné aux alentours de Banassac jusqu'à 900 m où au moins 5 territoires sont notés.

En région : du 07/04 à Argelès-sur-Mer-66 au 24/09 à Joucou-11 (C. RIOLS).

Pie grièche écorcheur reproduction 2017

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR *(Lanius collurio)* – **Estivant N, ass. Comm.** – *478 données (564 en 2015, 606 en 2016).* Du 05/05 au 22/09. Niche principalement de 800 à 1200 m.

2017 apparaît comme une année de forte baisse par rapport à 2017. Il y a ainsi -22 % de données en région et -21 % en Lozère, excluant le seul biais observateur ou météorologique pour 2017. Sans doute faut-il y voir en partie une conséquence du printemps 2016 très arrosé et du faible nombre de secondes nichées enregistrées alors. Cette impression fut ressentie sur le terrain avec moins de couples nicheurs notés dans les secteurs bien suivis, ceux-ci n'étant par ailleurs occupés que tardivement avec une bonne quinzaine de jours de retard et une arrivée surtout début juin plutôt que mi-mai. En bref, il y a moins d'oiseaux qui sont revenus au printemps et ils sont revenus plus tard (10-15 jours *a priori*), les deux éléments pouvant être imputés partiellement au printemps frais et très humide de 2016, tendance qui se retrouve aussi bien en Lozère qu'à l'échelon du Languedoc-Roussillon.

Pie-grièche écorcheur St-Denis-en-Margeride, 26/07/17 L. Chevallier

Ce sont 31 nichées (complètes ou partielles) pour au moins de 67 jeunes qui sont notées du **10/06** au 15/09 (12x1 ; 10x2 ; 5x3 ; 2x4 ; 1x5 ; 1x7) dont une superbe comptant **7 jeunes** le 03/08 à Saint-Chély-d'Apcher (TAu) avec un maximum sans surprise de mi-juillet à début août. Il serait très intéressant que les observateurs fassent plus attention aux tailles réelles des nichées pour avoir des statistiques plus fiables et renseignent plus précisément leurs données en complétant bien l'onglet âge et éventuellement le commentaire.

En région du 29/04 à Logrian-Florian-30 (D. CHAMBAUD) au 24/09 à Canet-en-Roussillon-66 (Y. ALEMAN).

PIE-GRIÈCHE GRISE *(Lanius excubitor)* – **N loc., H** – *225 données.* Dont 222 données entre 900 et 1200 m. Sans surprise, il y a un creux d'observation d'avril à juillet, l'espèce devenant très discrète en période de reproduction. Elle semble bien reconquérir peu à peu ses anciens territoires après les hivers néfastes de 2008 à 2010 mais semble-t-il avec une légère contraction d'aire vers le nord du département. Chants du **02/03** au **01/07** et du 03/09 au 21/11. Sans recherche ciblée, 29 territoires sont trouvés dont 8 avec reproduction certaine pour 7 nichées (3 complètes et 4 partielles) produisant au moins 12 poussins (4x1, 2x2, 1x4) du 31/05 au 17/08. La Margeride étant très peu prospectée, on peut espérer qu'il y a au moins le double de territoires occupés en Lozère. À noter une hivernante dans le bocage du Massegros, pas vue là depuis 2012.

Pie-grièche grise 23/11/17, Rieutort-de-Randon R. Destre

Pie-grièche grise reproduction 2017

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE *(Lanius meridionalis)* – **N loc., H** – *121 données.* 24 territoires (16 sur le Méjean, 7 sur le Sauveterre et 1 au Massegros) notés avec reproduction probable sans recensement exhaustif dont 10 avec reproduction certaine (du 21/04 au 18/08) pour 4 nichées produisant au moins 5 poussins (3x1, 1x2) du 20/06 au 18/08.

Pie-grièche méridionale juvénile Drigas, 20/06/17, J. Lesourd

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE *(Lanius meridionalis)* – **N loc., H** – *3 données.* 1 le 05/05 à Malbouzon (RD), et, sur le Méjean, 1 1°ac le 26/08 (FLe) et 1 le 29/08 (P. CHAMAILLARD, S. COMBAUD).

GEAI DES CHÊNES *(Garrulus glandarius)* – **N séd, MH** – *820 données*. Rare au-dessus de 1300 m (12 données jusqu'à 1500 m). Malgré son omniprésence, il n'y a que 11 données de reproduction certaine du **03/05** au 07/08 de 7 nichées produisant au moins 15 jeunes (2x1, 2x2, 3x3). Petits groupes de 5-10 en septembre et quelques oiseaux en migration fin septembre.

PIE BAVARDE *(Pica pica)* – **N séd., H** – *603 données*. Dépasse peu 1200 m (17 données entre 1200 et 1300 m). Un peu de mieux dans le suivi des reproductions avec 23 mentions certaines (2 en 2016 !) : ponte vers le 23/03, 16 nids recensés mais seulement 4 nichées notées produisant 10 jeunes au moins (1x1, 3x3) du 19/05 au 27/06. De petits dortoirs hivernaux sont notés dont 12 le 02/01 sur le Sauveterre (EBa), 14 le 26/02 à Cubières (DBu) et 16 le 23/10 au Born (RD, JCG).

CASSENOIX MOUCHETÉ *(Nucifraga caryocatactes)* – **M, très rare** – *1 donnée*. 1 oiseau entendu par plusieurs personne connaissant bien l'espèce le 10/10 à Cubiérettes sur le Mont Lozère (MJa), faisant suite à l'audition d'un oiseau le 29/09 près des Badieux sur le Mont Lozère (JP Malafosse PnC). Il semblerait, qu'année après année, l'espèce apparaisse sur le Mont Lozère surtout à partir de juillet (données non saisies) : quelques couples locaux peuvent nous échapper ou alors il s'agit d'oiseaux en dispersion en provenance du Mont Mézenc, Haute-Loire, situé à quelques dizaines de kilomètres en visuel. À suivre…

Crave à bec rouge
causse Méjean, 11/03/17, G. Tolmos

Crave à bec rouge
reproduction 2017

CRAVE À BEC ROUGE *(Pyrrhocorax pyrrhocorax)* – **NH séd.** – *374 données*. Max de 150 ind. sur le Méjean le 16/08 (P. BOISSIER) se nourrissant sur la neige. Il y a 9 indices de reproduction certaine (aucune habituellement) du 10/04 au 28/06 dont 3 nichées à partir du 17/06 produisant 7 jeunes (2x2, 1x3). Une meilleure attention aux nourrissages et cavités est nécessaire pour mieux connaître cette espèce omniprésente sur les causses et gorges. Pas de donnée hors secteur déjà connus.

CHOUCAS DES TOURS *(Corvus monedula)* – **N séd., H** – *200 données (199 en 2016)*. Max de 200 ind. le 07/02 à Mende (JCG). Sept mentions de reproduction seulement du 23/04 au 15/07 mais une seule nichée de 2 poussins nourris le 11/06 à Sainte-Énimie (FLe).

Choucas des tours
reproduction 2017

Corneille noire
reproduction 2017

CORNEILLE NOIRE *(Corvus corone corone)* – **NH séd.** – *1181 données*. Seulement 13 données de 1300 à 1600 m. Il n'y a que 26 indices de reproduction certaine dont incubation à partir du **18/03** mais seulement 5 nichées pour au moins 10 poussins (1x1, 3x2, 1x3) du **10/05** au 15/07. Dortoir max de 80 à Cubières le 09/12 (DBu). Semble rare dans les vallées cévenoles sans doute trop boisées.

Grand corbeau
reproduction 2017

Grand corbeau
Brugers, 08/12/17, P. Thouvenot

GRAND CORBEAU *(Corvus corax)* – **NH séd.** – *712 données (571 en 2016)*. Max de 45 le 09/03 à Sainte-Lucie et de 58 le 20/06 à Grèzes (RD). Il n'y a que 10 données de reproduction certaine dont 4 nichées complètes produisant 13 jeunes (1x2, 1x3, 2x4) du 15/05 au 11/06.

ÉTOURNEAU UNICOLORE *(Sturnus unicolor)* – **NMH** – *1 donnée.* Au moins 8 ind. le 08/07 sur le Méjean dans un beau groupe de sansonnets (FLe). Il peut s'agir soit de locaux à la reproduction passée inaperçue (peu d'ornithologues s'intéressent aux étourneaux pas toujours faciles à bien voir…) ou d'oiseaux en dispersion postnuptiale comme cela est le cas chez d'autres espèces d'apparition estivale dans les arrières-pays.

ÉTOURNEAU SANSONNET *(Sturnus vulgaris)* – **NMH** – *351 données.* Aucune donnée des vallées cévenoles. En est-il vraiment absent ? Quelques dortoirs : 1000 le 02/03 à Langogne (JBo) ; sur l'Aubrac, 3000 le 05/07 et 5000 le 15/09 (RD). Bien qu'assez abondant, peu d'oiseaux sont notés en migration, du 17/09 au 15/11 au Puech Debon (total 991). Seulement 38 données se réfèrent à une reproduction certaine (nourrissages) dont 8 nichées complètes du 21/04 au **08/07** produisant 28 jeunes (6x3, 2x5).

Etourneau sansonnet
Nasbinals, 23/11/17, P. Thouvenot

Étourneau sansonnet
reproduction 2017

MOINEAU DOMESTIQUE *(Passer domesticus)* – **N séd.** – *613 données.* Ne dépasse pas 1300 m (3 données de 1200 à 1300 m). Toujours très peu de données des vallées cévenoles et un grand trou en Margeride centre. Il ne faut pas hésiter à saisir systématiquement tout moineau dans tout endroit. Quelques grandes « volées » qui se raréfient : 80 le 18/01 à Saint-Bonnet-de-Chirac (FLe) et 60 le 27/07 au Malzieu (L. CHEVALLIER), 50 en novembre à Booz (FLe). Nourrissages notés du 19/04 au 24/07 pour seulement 5 nichées complètes observées produisant 15 jeunes (5x3). Un décompte le plus précis possible des cavités occupées par secteur serait intéressant. Cette espèce connait une régression forte en France et il est nécessaire de mieux suivre nos populations qui se portent encore bien même si « l'impression » est au fléchissement.

Moineau domestique
reproduction 2017

MOINEAU FRIQUET *(Passer montanus)* – **N loc., H** – *12 données (25 en 2016).* Un des nicheurs les plus menacés de Lozère, en danger critique d'extinction : noté sur 3 communes cette année (6 en 2016) : Fontanes (Sinzelles), Mende (pont de Berlière, jardins coopératifs) et Rimeize (moulin de Chassignol). Max de 8 à Fontanes (JBo) et 9 à Mende (FLe). Population nicheuse estimée en Lozère : 5-20 couples.

MOINEAU SOULCIE *(Petronia petronia)* – **N loc., trans.** - *86 données (106 en 2016).* 5 données en janvier, 0 en février, 1 en décembre. Hivernage très localisé d'oiseaux isolés la plupart du temps à Sinzelles, Fontanes et les causses de Sauveterre et Méjean. Sans doute sous-détecté cependant en hiver. Semble continuer son installation sur la Margeride d'où provient la seule nichée observée avec 4 poussins nourris le 03/07 au moulin Neuf, Fau-de-Peyre (MiQ). Après une année 2016 sans rassemblements notables (signe de mauvaise reproduction probablement), max de 56 au Fraissinel, causse de Sauveterre le 14/09 (RD) et de 100 le 06/09 à Cavaladette, causse Méjean (EBa, FLe). Deux observations atypiques : 1 en migration le 27/10 au Puech Debon et 13 oiseaux sur le petit causse de Saint-Bonnet-de-Chirac le 24/11 : nouvelle zone d'hivernage ?

Moineau soulcie
reproduction 2017

Moineau domestique juvénile
Bagnols-les-Bains, 10/06/17, D. Bugaud

Moineau friquet
Mende, 16/05/17, F. Legendre

Moineau soulcie
causse Méjean, 26/08/17, F. Legendre

NIVEROLLE ALPINE *(Montifringilla nivalis)* – **H rare** – *2 données dont 1 positive.* 1 le 05/12 à Cénaret, Barjac (M. JEAN), pas revue ensuite.

PINSON DES ARBRES *(Fringilla coelebs)* – **NMH, comm.** - *1699 données.* Chant du **31/01** au **08/08**. Bien qu'omniprésent, il n'y a que 15 données de reproduction du 26/04 (construction / AFe) au 05/08 pour 5 nichées produisant au moins 7 poussins (3x1, 2x2) du 17/05 au 05/08. Migration du 29/01 au 26/03 (au moins) et du 16/09 au **03/12** pour un max de 10 000 le 22/10 en migration au Puech Debon.

Pinson du nord
Marvejols, 03/12/17, R. Destre

PINSON DU NORD *(Fringilla montifringilla)* – **MH** – *175 données.* Hivernage très restreint (16 données !) dans la continuité d'un passage postnuptial 2016 se distinguant par un probable record minimal de migrateurs. Max de 20 seulement le 05/02 (JLB). Dernier le 11/03. Retour à une situation plus normale au passage postnuptial 2017. Premier le 04/10, max de 1084 au moins en migration le 22/10 et de 718 le 11/11 au Puech Debon (total 3407) puis hivernage avec des troupes jusqu'à 100 oiseaux.

SERIN CINI *(Serinus serinus)* – **N comm., M** – *412 données (315 en 2016).* Sous 1100 m (2 données au-dessus, jusqu'à 1200 m). Du 09/03 au 30/10 puis un retardataire le 15/11 à Sainte-Énimie (EBa) et un hivernant potentiel à Pied-de-Borne le 04/12 (FLe). Quelques troupes de 20-30 oiseaux en seconde décade d'octobre. Chants du 09/03 au 31/07 et reprise du 04 au 28/10. Dix nichées sont recensées du 19/05 au 18/08 pour 25 jeunes (6x2, 3x3, 1x4).

Serin cini
reproduction 2017

VENTURON MONTAGNARD *(Serinus citrinella)* – **N loc., MH** – *71 données.* Max de 30 le 29/01 sur le Mont Lozère (PLu). Chants en avril et mai avec confirmation de le pérennité de l'installation (découverte en 2015) de l'espèce sur le causse Méjean (ALEPE/PNC) notamment aux alentours de La Parade. La seule nichée notée est de 2 juvéniles le 21/06 près du col de Finiels, Mont Lozère (FLe). L'espèce se fait discrète en postnuptial avec seulement 8 données de septembre à décembre.

VERDIER D'EUROPE *(Carduelis chloris)* - **NMH** - *291 données.* Pas noté nicheur au-delà de 1200 m. Max de 20 à Mende le 02/12 (P. DOUNIES). Quelques chants sporadiques en automne et hiver puis surtout du 11/03 au 06/07. Quatre nichées seulement sont observéesdu 30/05 au 28/08 pour 10 poussins (2x2, 2x3).

Verdier d'Europe
reproduction 2017

Verdier d'Europe
Ste-Enimie, 08/11/17
E. Barthez

CHARDONNERET ÉLÉGANT *(Carduelis carduelis)* – **NMH** – *633 données.* À noter un oiseau au plumage en partie leucique le 14/02 à Barre-des-Cévennes (MCh). Reproduction notée jusqu'à 1300 m. Chants du 07/01 au 26/07. Seulement 3 nichées notées pour 6 poussins (1x1, 1x2, 1x3) du 11/06 au 26/07. La vague de froid de janvier amène quelques troupes de 30 à 50 sur les mangeoires.

Chardonneret élégant leucique
Barre-des-Cévennes, 14/02/17, M. Chouillou

TARIN DES AULNES *(Carduelis spinus)* – **N loc.? MH** – *255 données.* Bel hivernage pour la Lozère avec un max de 100 ind. le 13/01 à Mende (N. BORSON) et d'autres belles troupes de 30 à 80 oiseaux sur l'ensemble du département. Il y a 5 données en juin-juillet, confirmant petit à petit l'installation de l'espèce sur le département en tant que nicheuse entre 900 et 1400 m. Il est ainsi trouvé sur le plateau du Roy (Laubert, Le Born, Rieutort-de-Randon et Arzenc-de-Randon) avec un nourrissage observé au fait d'un épicéa le 14/07 à Laubert (FLe). Noté également sur le Mont Lozère (Saint-Julien-du Tournel) et au nord à Albaret-Sainte-Marie. À suivre ! Migration postnuptiale du 24/09 au 03/12 pour un max de 153 le 22/10 au Puech Debon (total 920).

Tarin des aulnes
Marvejols, 17/12/17, R. Destre

Tarin des aulnes
reproduction 2017

Linotte mélodieuse
reproduction 2017

LINOTTE MÉLODIEUSE *(Carduelis cannabina)* – **NM comm., H rare** – *458 données (365 en 2015).* Dépasse peu 1300 m (8 données jusqu'à 1600 m). Hivernante rare (8 données en janvier et février, 16 en décembre). Max de 90 le 22/12 au Moulinet (PTh). Chants du **22/02** au 26/07. Il y a seulement 9 données de reproduction certaine du 15/05 au 20/08 dont deux nichées donnant 4 poussins (1x1,1x4) du 10/06 au 20/08.

SIZERIN CABARET *(Carduelis cabaret)* – **NM comm., H rare** – *9 données.* Du 08/11 au 22/12 pour un max de 10 ind. le 30/11 à Ribennes (JLB). Noté également à Cassagnas, Ispagnac et Saint-Germain-du-Teil dans le cadre d'un afflux en France. Les sous-espèces *cabaret* et *flammea* sont séparées mais sont d'identification délicate sur le terrain. Le flammé n'a pour l'instant pas fait l'objet d'une seule mention certifiée en Lozère.

BEC-CROISÉ DES SAPINS *(Loxia curvirostra)* – **NMH** – *335 données (228 en 2016).* Max de 50 le 01/01 au col de Finiels (JF. COURSIMAULT), le 01/09 au roc de Bouchibarbès (PLu), Mont Lozère et de 48 le 14/10 à Arzenc-de-Randon (JLB). Les chants sont notés toute l'année surtout en début d'hiver et il y a 15 nichées recensées produisant 22 poussins (9x1, 5x2, 1x3) du 22/01 (MLC) au 10/08 (JLB) entre 800 et 1400 m d'altitude.

Bec-croisé des sapins femelle
Cubières, 26/02/17, D. Bugaud

Bec-croisé des sapins
reproduction 2017

De gauche à droite et de haut en bas :

1 - Bouvreuil pivoine, Rimeize, 05/01/17, M. Quiot
2- Grosbec casse-noyaux, Marvejols, 02/12/17, R. Destre
3 - Chardonneret élégant, St-Laurent-de-Muret, 16/01/17, R. Destre
4 - Bruant des roseaux, lac des Salhiens (Nasbinals), 23/04/17, F. Legendre
5 - Bruant ortolan, Mont Lozère (St-Maurice-de-Ventalon), 21/07/17, J-D. Méric
6 - Linotte mélodieuse, Nasbinals, 11/08/17, G. Tolmos

Bouvreuil pivoine
reproduction 2017

BOUVREUIL PIVOINE *(Pyrrhula pyrrhula)* – **N séd., H** – *379 données.* Un très net mieux ressenti chez cette espèce et confirmé par les chiffres (moyenne de 250 données/an) de 500 à 1600 m. 6 nichées produisent 14 jeunes (1x1, 3x2, 1x3, 1x4) entre le 06/06 (MLC) et le 23/08 (FLe) entre 700 et 1100 m.

GROSBEC CASSE-NOYAUX *(Coccothraustes coccothraustes)* – **N rare, MH** – *228 données.* Quel contraste entre les deux hivernages : il n'y a que 9 données à l'unité ou par paires en janvier-février jusqu'au 26/02 seulement, sans aucune donnée en mars... puis 2 données de reproducteur possible à Grèzes le 14/06 (RD) et le 01/07 (MLC). Le passage démarre le 28/08 et atteint des sommets inédits dans nos bases (ainsi que partout en France) dès le 20/09 où il prend une ampleur nouvelle. Le total au Puech Debon est de **2331 oiseaux** (record précédent 1394 en 2013) dont 224 le 30/09 et 313 le 01/10 et encore 214 le 15/10. Ensuite il est noté sur presque toutes les mangeoires (1-12 oiseaux).

Grosbec casse-noyaux
Marvejols, 10/11/17, R. Destre

Grosbec casse-noyaux
phénologie 2017

Grosbec casse-noyaux
2017

BRUANT JAUNE *(Emberiza citrinella)* – **NMH, comm.** - *555 données.* Chants du 05/03 au **02/08**. Seulement 9 données de reproduction certaine du 18/05 au 09/08 avec un seul jeune observé le 06/06 au Massegros (FLe). Max de 86 ind. au moins le 19/10 aux Cheyrouses, causse de Sauveterre (FLe) et de 100 le 23/10 à Villeneuve, Vébron (M-A. LARBOT).

Bruant jaune
reproduction 2017

Bruant zizi
reproduction 2017

Bruant fou
reproduction 2017.

Bruant zizi
Antrenas, 18/12/17, P. Thouvenot

BRUANT ZIZI *(Emberiza cirlus)* – **NM, H rare** – *428 données (308 en 2016).* Semble s'installer en hivernage avec 36 données en janvier-février (10 en 2016) mais peut-être est-ce une attention accrue ? Chants du 29/01 au 19/07 puis reprise ponctuelle du 23/08 au 24/11 (29 données) jusqu'à 1000 m. Seulement 9 données de reproduction certaine du 01/05 au 17/08 pour 3 nichées produisant au moins 5 jeunes (1x1, 2x2). Max de 16 le 20/12 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).

BRUANT FOU *(Emberiza cia)* – **N séd., err.** – *130 données.* Noté jusqu'à 1600 m et enfin des mentions du centre Margeride un peu mieux prospecté cette année. Max de 10 le 06/01 à Saint-Julien-du-Tournel (GCh) et de 13 le 02/02 à Fau-de-Peyre (TAu). 36 indices de reproduction : chants du 09/04 au 31/05, nourrissages du 16/05 au 08/07 mais sans jeunes observés tant l'espèce est discrète !

BRUANT ORTOLAN *(Emberiza hortulana)* – **N loc., M** – *65 données (89 en 2016).* Du 21/04 au 21/08 seulement, l'espèce semblant être partie une bonne quinzaine de jours en avance à l'instar d'autres insectivores dont l'absence fut remarquée sur les causses fin août. Chants du 15/05 au 20/07. De nouveaux secteurs sont trouvés aux alentours d'Altier sur le versant sud du Mourre de la Gardille (JLB) - secteur très favorable malheureusement très peu prospecté - ainsi qu'un chanteur le 28/05 à Marvejols (RD). À suivre !

BRUANT DES ROSEAUX *(Emberiza schoeniclus)* – **N prob. loc., M** – *67 données.* Passage du 21**/02** au 25/03 sans max supérieur à 5 oiseaux, puis du 10/10 au 23/11 à l'unité ou par paire. Nicheur uniquement sur l'Aubrac avec 2-3 chanteurs au moins aux Salhiens et 1-3 à Usanges (Souveyrols non suivi). Des oiseaux fin août à Charpal laissent augurer une possible reproduction sur ce lac, site inédit pour le moment (RD).

Bruant proyer reproduction 2017

BRUANT PROYER *(Emberiza calandra)* – **N loc., M** – *169 données.* Du 16/04 au 02/09 pour les locaux sous 1000 m d'altitude et les 12 et 14/10 en migration. Chants du 29/04 au 26/07 pour au moins 124 chanteurs (des décomptes plus précis sur chaque point d'observation seraient bienvenus). Nourrissages du 24/05 au 08/07.

MERCI encore une fois à tous ceux et toutes celles qui se donnent la peine de transmettre leurs observations en espérant avoir pu retranscrire le plus complètement possible dans la présente synthèse le fruit de leurs efforts.

Texte achevé le 30/01/2018 - relecture le 26/02/2018

Validation des données *: Marie-Laure CRISTOL, Christine GONELLA, Rémi DESTRE, François LEGENDRE,*
le CHR-LR et le CHN le cas échéant
coordination *: François LEGENDRE*
Rédaction : *François LEGENDRE et Emmanuelle BARTHEZ*
Relecture : *Emmanuelle BARTHEZ , Rémi DESTRE et François LEGENDRE*
Mise en page *: Emmanuelle BARTHEZ*
Couverture *: Séverine MERLY*

Ont contribué, plus particulièrement, à cette synthèse *par leurs informations : Jean-Luc BIGORNE, Jocelyn FONDERFLICK (Parc national des Cévennes), Philippe LECUYER (LPO Grands Causses), Isabelle MALAFOSSE (Parc national des Cévennes), Jean-Pierre MALAFOSSE (Parc national des Cévennes), Jérôme MOLTO (Parc national des Cévennes), Hervé PICQ (Parc national des Cévennes), Christophe RIEUTORT (Fédération des chasseurs de Lozère).*

Bilan annuel 2017 de la migration au Puech Debon

Ce site est suivi depuis 2010 quand la disponibilité des observateurs le permet.

L'intérêt est un suivi en cœur de Massif Central le long de la vallée du Lot et un suivi du passage du Milan royal aux effectifs nettement plus importants que supposés initialement.

Circaète Jean-le-Blanc
Barjac, 04/09/17, D. Bonnet

Migration prénuptiale : 19 jours de présence du 29/01 au 26/03 pour 25 heures 50 minutes de comptage, concernant 5 666 oiseaux de 42 espèces. Peu de suivi, peu de passage, beaucoup de ciel bleu peu propice aux suivis.

En exergue :

- Milan noir : du 02 au 26/03. **570** oiseaux dont 155 le 13/03.
- Milan royal : du 29/01 au 26/03 : **132** oiseaux dont 49 le 29/01
- Cigogne blanche : **7** le 21/03
- Grue cendrée : **19** le 06/03
- Pinson des arbres : du 29/01 au 26/03 : **4 210** oiseaux dont 1 830 le 11/03

Migration postnuptiale : 60 jours de présence du 04/08 au 03/12 pour 120 heures de comptage concernant 56 196 oiseaux de 82 espèces.
Suivi plus régulier (1 à 4 jours/semaine) pendant 1 à 5 heures. Temps frais en septembre, beau et sec en octobre et novembre globalement (mais nombreux brouillards matinaux parfois tenaces).

En exergue : (en gras les records du site ou journaliers). À noter que certains passereaux comme les mésanges ne sont comptés que sur une bande de 200 m de large.

- Milan royal : du 24/08 au 06/12 : **1 281** oiseaux dont 256 dès le 22/09. Estimation du passage total : 4000-6000 oiseaux.
- Busard des roseaux : du 23/08 au 27/10 : **38** oiseaux dont 12 le 23/09
- Buse variable : du 10/09 au 03/12 : **876** oiseaux dont **387** le 03/12 (fuite hivernale)).
- Faucon crécerelle : du 10/09 au 15/11 : 160 oiseaux dont 86 en 45 minutes le 21/10.
- Pigeon ramier : du 24/09 au 03/12 : **4 190** oiseaux sans grosse journée
- Martinet à ventre blanc : du 27/08 au 21/09 : **256** oiseaux dont **128** le 10/09
- Alouette lulu : du 17/09 au 19/11 : **432** oiseaux dont 73 le 21/10
- Alouette des champs : du 22/09 au 19/11 : **1 190** oiseaux dont **602** le 27/10.
- Pipit des arbres : du 23/08 au 21/10 : **438** oiseaux dont **125** le 10/09
- Bergeronnette grise : du 16/09 au 19/11 : **1 286** oiseaux dont 231 le 21/10 et **454** le 22/10
- Mésange noire : du 28/08 au 19/11 : **520** oiseaux dont 102 le 21/10 et **175** le 22/10
- Mésange bleue : du 28/08 au 19/11 : **510** oiseaux dont **76** le 04/10
- Pinson du Nord : du 04/10 au 03/12 : **3 407** oiseaux (22 en 2016) dont 1084 le 22/10
- Tarin des aulnes : du 24/09 au 03/12 : **920** oiseaux (112 en 2016) dont 153 le 22/10
- Grosbec casse-noyaux : du 16/09 au 19/011 : **2 331** oiseaux (58 en 2016) dont 316 le 05/10

Espèces occasionnelles ou rarissimes :

- Aigle de Bonelli : première mention du site : 1 1ac le 10/09
- Faucon crécerellette : 3le 29/08 (en vol nord)
- Grand labbe : première mention du site et de Lozère : 1 le 23/09
- Pipit rousseline : 2 le 10/09
- Moineau soulcie : première mention sur le site : 1 le 27/10

Tableau général des espèces observées au passage postnuptial 2017 :

Grand Cormoran *(Phalacrocorax carbo)*	186
Cigogne noire *(Ciconia nigra)*	6
Bondrée apivore *(Pernis apivorus)*	154
Milan noir *(Milvus migrans)*	83
Milan royal *(Milvus milvus)*	1281
Circaète Jean-le-Blanc *(Circaetus gallicus)*	19
Busard des roseaux *(Circus aeruginosus)*	38
Busard cendré *(Circus pygargus)*	2
Épervier d'Europe *(Accipiter nisus)*	138
Buse variable *(Buteo buteo)*	876
Aigle botté *(Aquila pennata)*	3
Balbuzard pêcheur *(Pandion haliaetus)*	10
Faucon crécerelle *(Falco tinnunculus)*	160
Faucon émerillon *(Falco columbarius)*	4
Faucon hobereau *(Falco subbuteo)*	8
Grue cendrée *(Grus grus)*	4
Vanneau huppé *(Vanellus vanellus)*	5
Pigeon colombin *(Columba oenas)*	85
Pigeon ramier *(Columba palumbus)*	4190
Martinet noir *(Apus apus)*	116
Martinet à ventre blanc *(Apus melba)*	256
Alouette lulu *(Lullula arborea)*	432
Alouette des champs *(Alauda arvensis)*	1190
Hirondelle de rochers *(Ptyonoprogne rupestris)*	12
Hirondelle rustique *(Hirundo rustica)*	4572
Hirondelle de fenêtre *(Delichon urbicum)*	1576
Pipit des arbres *(Anthus trivialis)*	438
Pipit farlouse *(Anthus pratensis)*	625
Pipit spioncelle *(Anthus spinoletta)*	2
Bergeronnette printanière *(Motacilla flava)*	129
Bergeronnette des ruisseaux *(Motacilla cinerea)*	2
Bergeronnette grise *(Motacilla alba)*	1286
Accenteur mouchet *(Prunella modularis)*	49
Rougequeue noir *(Phoenicurus ochruros)*	7
Rougequeue à front blanc *(Phoenicurus*	4
Tarier des prés *(Saxicola rubetra)*	15
Traquet motteux *(Oenanthe oenanthe)*	7
Merle à plastron *(Turdus torquatus)*	5
Merle noir *(Turdus merula)*	22
Grive litorne *(Turdus pilaris)*	29
Grive musicienne *(Turdus philomelos)*	1210
Grive mauvis *(Turdus iliacus)*	32
Grive draine *(Turdus viscivorus)*	288
Pouillot véloce *(Phylloscopus collybita)*	19
Gobemouche noir *(Ficedula hypoleuca)*	24

Mésange noire *(Periparus ater)*	520
Mésange bleue *(Cyanistes caeruleus)*	510
Mésange charbonnière *(Parus major)*	83
Geai des chênes *(Garrulus glandarius)*	56
Choucas des tours *(Corvus monedula)*	35
Corneille noire *(Corvus corone)*	39
Grand Corbeau *(Corvus corax)*	39
Étourneau sansonnet *(Sturnus vulgaris)*	991
Pinson des arbres *(Fringilla coelebs)*	26634
Pinson du Nord *(Fringilla montifringilla)*	3407
Serin cini *(Serinus serinus)*	54
Verdier d'Europe *(Carduelis chloris)*	19
Chardonneret élégant *(Carduelis carduelis)*	227
Tarin des aulnes *(Carduelis spinus)*	920
Linotte mélodieuse *(Carduelis cannabina)*	414
Bec-croisé des sapins *(Loxia curvirostra)*	57
Grosbec casse-noyaux *(Coccothraustes*	2331
Bruant jaune *(Emberiza citrinella)*	33
Bruant zizi *(Emberiza cirlus)*	93
Bruant des roseaux *(Emberiza schoeniclus)*	16

Espèces occasionnelles :

Héron cendré *(Ardea cinerea)*	4
Cigogne blanche *(Ciconia ciconia)*	19
Vautour percnoptère *(Neophron percnopterus)*	1
Busard Saint-Martin *(Circus cyaneus)*	1
Aigle de Bonelli *(Aquila fasciata)*	1
Faucon crécerellette *(Falco naumanni)*	3
Faucon crécerellette ou crécerelle *(Falco nauma...)*	3
Grand Labbe *(Stercorarius skua)*	1
Goéland leucophée *(Larus michahellis)*	2
Hirondelle de rivage *(Riparia riparia)*	2
Pipit rousseline *(Anthus campestris)*	2
Hypolaïs polyglotte *(Hippolais polyglotta)*	1
Pouillot fitis *(Phylloscopus trochilus)*	2
Roitelet huppé *(Regulus regulus)*	1
Roitelet à triple bandeau *(Regulus ignicapilla)*	6
Mésange à longue queue *(Aegithalos caudatus)*	53
Mésange nonnette *(Poecile palustris)*	1
Pie bavarde *(Pica pica)*	3
Moineau domestique *(Passer domesticus)*	5
Moineau soulcie *(Petronia petronia)*	1
Venturon montagnard *(Serinus citrinella)*	2
Bruant fou *(Emberiza cia)*	2
Bruant proyer *(Emberiza calandra)*	3

Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2017

Espèce		
Cygne tuberculé	Max : 7 en juin 2015 à St Chély-D'Apcher (5 poussins) ; reproduction 2015 et 2016.	
Cygne de Bewick	Naussac : 5 le 19/11/89.	
Cygne chanteur	Naussac : 2 le 14/11/84. Ganivet : 1 le 18/04/2014.	
Oie cendrée **	Mig 23/09-22/12 et 16/02-16/05.1 ssp *rubirostris* le 11/10/92 à Naussac. Hiv. 4 ind 2014/2015 et 8 en 2016/2017 et repro 2015, 2016, **2017** (3, 5, 5 juv)	Max : 150 le 15/11/2010 à Mende.
Bernache nonnette	Naussac : 1 du 05/11 au 03/12/2000, sauvage probable.	
Bernache cravant	Naussac : 1 du 16 au 24/05/85, 1 du 26/04 au 06/05/02 (ssp *bernicla*) et 1 le 04/05/03.	
Tadorne de Belon	Du 24/07 au 22/05.	Max : 72 le 12/10/03 à Naussac.
Canard siffleur	Du 08/09 au 24/05.	Max : 119 le 10/12/02 à Naussac.
Sarcelle d'hiver**	Nidif. en 1983 à Naussac et 1983, 1984, 1985, 1993 à Charpal.	Max : 130 le 18/10/2005 à Naussac.
Canard colvert**	Accouplement à partir du 17/03. Max de 11 *pulli*. Juv. du 06/05 au 02/07	Max : 278 le 13/09/02 à Naussac.
Canard pilet	Du 17/09 au 10/04.	Max : 53 le 20/03/88 à Naussac.
Canard souchet	Du 13/06 au 08/05.	Max : 68 le 09/02/92 à Naussac.
Canard chipeau	Du 15/06 au 30/04.	Max : 137 le 14/11/99 à Naussac.
Sarcelle d'été**	Du 07/03 au 28/10, nidif. à Barrandon en 1986.	Max : 23 en 03/91 à Naussac.
Nette rousse	Du 03/09 au 27/05.	Max : 10 le 24/11/2016 à Naussac.
Fuligule milouin	Toute l'année, régulier du 28/08 au 28/03. Devenu rare depuis 2010	Max : 193 le 15/12/92 à Naussac.
Fuligule nyroca	Naussac : 1 le 11/09/83 et 1 le 03/11/03.	
Fuligule morillon	Surtout du 12/10 au 31/03, rare hors ces dates. Devenu rare depuis 2005	Max : 26 le 20/03/88 à Naussac.
Fuligule milouinan	Naussac : 6 le 01/01/85 puis 1 du 08/12/91 au 05/01/92, du 16/02 au 06/03/94, le 16/01/96 et 2 le 23/12/01.	
Eider à duvet	Du 01/09 au 14/04 (7 données).	Max : 3 le 01/09/88 à Barrandon.
Harelde boréale	1 immature le 21/10/2009 à Booz.	
Macreuse noire	Naussac : 1 le 28/11/96 et 1 le 14/11/99. Charpal: 3 le 05/11/2007.	
Macreuse brune	Naussac : 1 le 22/10/83, 3 le 12/12/84, 1 le 28/02/93, 1 du 16/12/00 au 23/12/01. Charpal : 3 le 11/11 puis 9 le 15/11, 2 le 18/11 et 1 le 08/12/01, 2 le 30/11/2016	
Garrot à œil d'or	Naussac : du 03/12 au 26/03 et le 02/05/09. 3 hivernages : 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004. **Le Malzieu, 3 le 08/03/2017**	Max de 2 ensemble.
Harle piette	Naussac : 1 fem du 04/01 au 23/02/85 et 1 fem le 15/01/2011.	
Harle huppé	Du 18/10 au 27/04.	Max : 9 le 24/11/2016 Naussac
Harle bièvre	Du 09/12 au 22/04 et 1 le 27/10/2016 à Charpal et **02/09/2017 à Naussac**	Max : 3 le 27/12/10 à Naussac.
Gélinotte des bois	Introduite entre 1991 et 1997, dernière observation en septembre 1998. Lâchers à automne 2017	
Tétras-lyre	Introduit entre 1975 et 1985, dernière observation en 1994.	
Grand Tétras**	Introduit entre 1978 et 1993, quelques lâchers depuis. Se maintient en forêts du Mont Lozère. 13 oiseaux en 2016.	
Perdrix rouge**	Chant du 31/01 au 07/10. Max : 24 le 28/09/04 à Marvejols ; 18 *pulli* le 08/07/2016 à St Sauveur de Ginestoux.	
Perdrix grise**	Souche sauvage sur le Mont Lozère ? lâchées ailleurs.	Max : 25 le 02/09/07 à Grandrieu.
Caille des blés**	Du 16/04 au 01/11. Chant du 16/04 au 18/08 jusqu'à 1100 m. 1 tuée à la chasse le 13/11/2010.	Max : 9 chanteurs le 16/06/92 à Chanet et 15 le 29/08/95 à Recoules-de-Fumas.
Faisan de colchide **	Lâchers de chasse. 2 repros : 9 *pulli* le 17/06/2016 Mont Lozère et **3 le 23/05/2017 à St Bonnet de Chirac.**	
Plongeon catmarin	11 de nov à janv,1 le 03/04/88 à Naussac, 1 le 02/05/2007 à Pied-de-Borne.	Max : 2 le 20/12/87 à Naussac.
Plongeon arctique	Du 09/11 au 04/05.	Max : 7 le 03/05/86 à Naussac.
Plongeon imbrin	À Naussac : 1 le 23/02/85 et 1 H1 le 12/01/2013. 2 le 17/01/2015 puis 1 jusqu'au 25/03/2015.	
Grèbe castagneux**	Chant du 04/03 au 18/07. Rares hivernants.	Max : 38 le 13/10/07 à Ganivet.
Grèbe huppé**	Nidif. Naussac depuis 1982 et Charpal 1992-2008, St Andéol 2015. Parades du 13/02 au 29/05.	Max : 134 le 03/09/2015 Naussac. Max : 13 Cples à Naussac en 1983.
Grèbe jougris	Naussac : 1 le 17/10/93 et le 03/05/2014 ; antérieurement 4 le 02/11/84 au Moulinet.	
Grèbe esclavon	Naussac : 1 le 27/01/97, du 12 au 16/11/99 et le 15/12/2016	
Grèbe à cou noir	Nidif à Naussac en 1982 et Charpal en 1983.	Max : 16 le 22/08/82 à Naussac. Aucune obs en février.
Océanite tempête	2 après la tempête du 26/12/99 (Mt Lozère), 5 après la tempête du 24/01/09 (Mt Lozère, Aubrac, Margeride).	
Grand cormoran	Migration et hivernage du 30/07 au 15/04, rare après. Estivant en 2016.	Max : 304 le 13/11/05 sur toute la Lozère.
Butor étoilé	16/05/90 à Usanges, 15/11/2000 au lac du Born, 25/09/2010 au Moulinet, 16/03/2012 à Marchastel, **25/10/17 Boissets**	
Blongios nain	Mende : 1 fem épuisée dans un platane le 31/03/82. Le Malzieu : 1 m le 17/05/08, 1 m à Booz le 20/05/2014.	
Bihoreau gris**	Du 22/03 au 10/11. Repro 2008 Booz (1 juv), prob 2016	Max 5 le 10/09/93 à Naussac et 18 total en 2015
Crabier chevelu	28/05/85 Naussac, 04/06/02 aux Vignes, 24/05/2012 Booz, mig 06/06 et 18/08/15 Aubrac, **23/05/17 Malzieu**	
Héron garde-bœufs	Du 02/03 au 30/06 et du 06/08 au 28/11.	Max 30 12-17/05/85 Sauveterre et 10/05/2015 Marvejols

Aigrette garzette*	Mig du 12/03 au 17/06 et du 19/07 au 31/12. Hivernage du 19/12/13 au 18/02/14.	Max 16 le 31/05/08 à Montbel. 32 en 2008. Repro 2011 à Booz
Grande aigrette	Toute l'année, surtout d'octobre à mars	Max : 15 le 01/04/04 à Naussac. 274 données en 2016.
Héron cendré**	A niché : Ispagnac, Florac, Naussac, Banassac, Aubrac.	Max : 38 à Naussac le 13/09/02 et Max de 28 nids en 2004.
Héron pourpré	Du 01/04 au 24/05 et du 30/07 au 07/10.	Max : 6 le 02/04/2011 à Booz.
Cigogne noire*	Du 04/02 au 25/10. Nidif possible en 2004.	Max : 16 le 06/08/98 au Pompidou, 57 en 2008 ; 21 le 20/03/12.
Cigogne blanche	Du 27/01 au 09/06 et du 13/07 au 01/12.	Max : **120 le 23/03/2017 à St EVF max annuel : 260 en 2017**
Spatule blanche	Naussac : 1 le 11/10/92.	
Flamant rose	1 dans l'été 1980 à Naussac, 1 en vol au Point Sublime le 01/06/98 et 6 à Naussac le 25/05/03.	
Bondrée apivore**	Du 16/04 au 05/10. Parades jusqu'au 25/08. Mig du 16/04 au 06/06 et du 02/08 au 05/10.	Max : 300 le 15/05/09 à Barre des C. ; 281 le 26/08/09 aux Salces. 2009: 556 pré., 686 post. = 1242 mig. 1088 en 2011 au Puech Debon.
Élanion blanc*	Nicheur en 1998, 2014, 2015, 2016. 1 le 12/04/2006 Sauveterre, 05/08/2011 Servières, 2012 : 30/05 Drigas, 25/09 Le Massegros + 2 obs février et novembre 2015, **39 données 2017 pour 1-2 oiseaux.**	
Milan noir**	Du 10/02 au **24/10**. Parades dès 19/03, envol dès 07/06. Mig du 10/02 au 20/05, 09/07 au **24/10**	Max : Puech Debon : 1628 pré, 2016, 806 le 27/03/16 total 2020 en 2016, **500 post, 10/08/2017 Champerboux, 1226 total**
Milan royal**	Acplt dès 09/03, envol juv dès du 25/06.	Migr. 13/01-24/05 et 24/08-17/12 ; Puech Debon ; 304 le 06/10/2012, **1281 postn 2017**
Pygargue à queue blanche	1 du 05/12/95 au 01/02/96, 1 le 30/12/01 et 1 le 15/11/03, secteur des gorges du Tarn et de la Jonte.	
Gypaète barbu	Réintroduction depuis 2012 de 2-3 individus/an alternativement dansgorges de la Jonte ou de la Dourbie (Aveyron)	
Percnoptère d'Egypte**	Du 09/03 au 08/09. Nicheur en 1997, 1998 et 2007. 3 c en 48/12 en 2007, 0 en 2009, 3 en 2012 pour 2 jeunes à l'envol.	
Vautour de Rüppell	**1 le 19/03/2017 en photo sur un charnier de Cassagnes, causse Méjean**	
Vautour fauve**	Disparu en 1945, réintroduit de 1981 à 1986, première repro 1982, 414 c et 309 jeunes en 2012 sur Lozère-Aveyron.	
Vautour moine**	Disparu en1906, réintroduit de 1992 à 2003, première repro 1996. **2017 : 20 couples Lozère, 6 Aveyron, 1 Hérault**	
Circaète Jean le Blanc**	Du 16/02 au 09/11, parades du 27/02 au 02/07, pontes du 27/03 au 16/05. Très mauvaises repro en 2010 et 2012.	Max : 27 le 28/08/05 aux Bessons en migration.
Busard des roseaux	Du 18/02 au 30/11. Max : 52 en 2 h 30 le 01/04/04 au Rozier et total de 111 en 2004.	
Busard Saint-Martin**	Nidif. jusqu'à 1460 m. Max : **23 le 08/10/17** dortoir à Malbouzon. Envols dès 17/06.	
Busard pâle	Méjean : 1 m le 03/04/04, 1 j le 07/09/08, 1 f le 04/05/10, 1 m le 05/04/06 à Lanuéjols, 1 f le 22/05/10 sur Sauveterre et 1 m le 30/09/2012 au Massegros, 1 juv le 02/09/14 sur Aubrac.	
Busard cendré**	Du 27/03 au 25/09. Nourrissage jusqu'au 24/08.	Max : 17 le 03/08/81 vers Charpal.
Autour des palombes**	Parades du 13/02 au 30/04. Tiré le 24/08/96 à St Etienne-du-Valdonnez. Mig du 02/03 au 07/04 et du 28/08 au 13/10.	
Épervier d'Europe**	Parades du 20/02 au 16/06. Envols juv du 26/06 au 31/08. Mig du 16/02 au 02/05 et du **04/08 au 03/12.**	Max : 20 mig le 21/10/2012 au Puech Debon ; total 101 en 2012.
Buse variable**	Parades du 18/01 au **28/05**. Mig du 20/01 au 18/04 et du 27/08 au **03/12**. Juv du 08/04 au **03/09**	Max : **en mig, 387 le 03/12/2017 et total 876 en 2017 au Puech Debon.** 36 le 30/12/14 au Recoux en hivernage.
Buse pattue	1 le 09/12/98 sur l'Aigoual vers Bassurels.	
Aigle criard	Gorges du Tarn en 1934 et 1954. Tonn (estonien balisé) : Vallée Française le 13/11/2008, Aubrac (12) le 05/04/2010 et Fontanes le 30/03/2012., Cévennes 21/10/2016, **Paulhac en Margeride du 2 au 03/12/2017** Hybride criard/pomarin : balisé en Lituanie au nid en 2015, passé 7-8/10/16 Aubrac, **St Andéol de C. 12/10/2017.**	
Aigle Impérial	Gorges de la Jonte, Saint Pierre des Tripiers le 23/11/2008, juvénile.	
Aigle royal**	Envol juv entre le 25/06 et le 10/08. 12 couples 2017	Tirs en 1992 et 1998.
Aigle botté**	Du 02/03 au **26/10**. Accouplement apd 25/04. Envol juv apd 10/07. Nidification certaine depuis 2004. 5-10 c 2017	
Aigle de Bonelli	16 données toute l'année mais surtout mars et juillet-septembre, majorité de 1 et 2ac.	
Balbuzard pêcheur	29/02-26/05 et 14/07-16/11, juin 2009.	Max : 58 en mig 2014, 8 en 1 j le 01/04/04, 7 ens le 25/03/08 au Malzieu.
Faucon crécerellette	Du 29/07 au 25/09.	Max 1700 le 24/08/2012 sur le Méjean.
Faucon crécerelle**	Accouplements du 08/03 au 30/05, envol 03/06-10/09. Max 7 juv en 2014. Mig du 11/03 au 01/05 et du 30/08 au 03/11.	Max : 114 sur le Méjean le 29/07/97... sans doute pas du crécerelle... **160 en mig 2017 Puech Debon**
Faucon kobez	Du 18/04 au 30/06 et 29/07 au 16/09 (19 données d'automne).	Max : 22 le 22/05/08 à La Parade, 104 en 2008.
Faucon émerillon	Du 10/09 au 09/05.	Max : 36 total en 2012 et 3 le 10/09/2007 à Chanet.
Faucon hobereau**	Du 04/04 au 22/10. Mig jusqu'au 14/05 et apd 17/08. Juv àpd 07/07 jus. 31/08.	Max : 4 le 24/08/2007.
Faucon lanier	1 le 26/05/95 à Marchastel (origine inconnue).	
Faucon d'Éléonore	Du 22/04 au 14/09 et 1 le 29/10/11 (50 données : 0-7 par an)	Max : 4 les 17/06/00, 23/07/94 et 09/08/88.

Faucon sacre	1 fem le 25/02/00 sur l'Aigoual (origine inconnue).	
Faucon pèlerin**	Parades du 11//02 au 22/03. accplt apd 15/02. Envol juv apd 15/05.	Tir en 1997. Max : 6 (dont 4 juv).
Râle d'eau**	Hivernage 1973 à Florac, 2012/2013 à Booz. Nidif cert. dep.1998 à Usanges. Max : 8 le 27/06/04 à Usanges. 5 c en 2012.	
Marouette poussin	1 fem. Le 24/03/2012 au Malzieu.	
Marouette ponctuée	9 d. Naussac : 14/01/94, 30/08 et 08/09/96, 08/08/99 et 1 chanteur le 27/06/04 ; 1 le 07/09/05 et du 27/08 au 07/10 au Moulinet (5 contacts d'un oiseau). 1 le 09/05/07 sur le Mont Lozère. Booz : 5-6/09/2016.	
Râle des genêts	1 cht à Recoules-de-F. le 20/09/97, La Fage-M. 01/06/01, Pont-Archat 11/07/01 puis 1 au Chastel-N.le 28/08/05. 2008 : 3 chts dont 1 du 11/06 au 22/07 à Mende ; 2012 : 9 chts du 29/05 au 12/07 ; 1 en 2013., **2 en 2017**	
Gallinule Poule d'eau**	Nid jusqu'à 1320 m à Bonnecombe, Aubrac. Juv apd , 09/05.	Max : 46 le 04/10/07 à Booz. 8 nichées en 2008.
Foulque macroule**	A niché à Naussac, Les Salhiens, Charpal. Nidif 2015 et 2017	Max : 1300 le 14/01/94 à Naussac.
Grue cendrée	Du 08/10 au 29/12 et du 28/01 au 10/04.	Max : 500 le 27/10/10 à Palhers et 727 en 2010.
Outarde canepetière**	Du 10/04 au 02/10. Chant du 02/05 au **08/08**. Dernière reproduction en 1995. **3 m imm 2017**	Max : 10 en 09.
Outarde barbue	Signalée fin XIXème siècle.	
Huitrier-pie	Naussac : 1 du 14 au 25/05/85 et le 20/05/2016	
Échasse blanche**	Du 25/03 au 06/08. Nidif à Naussac en 1982 et 1983.	Max : 15 le 05/06/06 au Moulinet et 21 en 2012.
Avocette élégante	Du 16/03 au 23/04 et du 23/07 au 25/11 (10 données).	Max : 12 le 21/03/02 à Naussac.
Oedicnème criard**	Du 13/03 au 15/10.	Max : 20 le 11/09/93 à Mas-de-Val.
Petit gravelot**	Du **15/03** au 09/10. 3-5 c.	Max : 40 les 25/09/01 et 20/08/02 à Naussac.
Grand gravelot	Du **01/03** au 22/11.	Max : 14 le 22/09/84 à Naussac.
Gravelot à collier int.	Naussac : 1 le 14/05/83.	
Pluvier guignard	Du 14/08 au 18/10, 1 le 11/03/09 et du **26/03** au 28/05.	Max : 55 le 04/09/10 au Fourcat et 337 en 2010.
Pluvier doré	Du **19/02** au 22/05 et du 15/09 au 18/12.	Max : 200 le 29/10/75 sur le Méjean.
Pluvier argenté	1 le 01/03/08. Du 06/05 au 30/05 et du 02/09 au 01/11.	Max : 7 le 06/05/03 à Naussac.
Vanneau huppé**	Parades apd du 03/03. Nidif. sur l'Aubrac et Margeride.	Max : 355 le 19/03/11 au Puech Debon (mig). 5-17 c.
Bécasseau maubèche	Du 28/03 au 26/05 et du 21/08 au 27/09 (8 données).	Dernière obs : 31/03/2016 aux Salhiens
Bécasseau sanderling	Du 29/04 au 22/05 et du 21/08 au 07/10 (10 données).	Dernière obs 19/05/2016 à Naussac
Bécasseau minute	Du 23/03 au 14/05 et du 10/07 au 05/11.	Max : 11 les 25/09/88 et 29/09/84 à Naussac.
Bécasseau de Temminck	Charpal : 1 le 12/06/91. 2 le 11/09/2014 et 1 le 15/09/2016 à Naussac.	
Bécasseau cocorli	1 le 19/05/84 puis du 09/08 au 07/10.	Max : 6 les 27 et 28/08/02 à Naussac.
Bécasseau variable	20/03-26/04 puis 31/07-21/11. Max : 15 le 02/10/88 à Naussac.	
Combattant varié	Du 05/03 au 13/05 et du 18/07 au 27/09.	Max : 21 le 14/04/11 à Usanges.
Bécassine sourde	Du 25/01 au 28/04 et du 11/09 au 24/11. Max 179 en 2016, 35 baguées 04/04/2012 Aubrac.	
Bécassine des marais**	Du 13/07 au 23/04 surtout. Parade apd 10/04; 1-4 c depuis 2010.	Max : 30 le 13/08/2012 à Usanges.
Bécassine double	Tuée à la chasse sans plus de précisions. 1 le 26/04/2015 et **23/04/2017** à Usanges	
Bécasse des bois**	Ponte apd 21/03, croûle 17/03-22/06	Max : 15 le 27/11/03 à Chanac, **103 contacts en 2017**
Barge à queue noire	Naussac : 1 les 06/07/82, 03/07/83, 03/04/88, à Charpal le 08/03/93, au Moulinet le 09/04/02, Le Malzieu 10/08/2015	
Barge rousse	1 le 13/09/87 et Max 11 du 08/09 au 22/09/91 à Naussac et 1 le 09/05/04 à Usanges.	
Courlis corlieu	Du 12/04 au 11/05 et du 06 au 31/07.	Max : 8 le 31/07/83.
Courlis cendré**	Du 20/02 au 24/12 ; 1 le 02/01/00 à Naussac. Parades 13/03-10/06. 15-20 c.	Max : 25 fin 08/05 vers Malbouzon.
Chevalier arlequin	Du 18/03 au 09/05 et du 31/07 au 16/11.	Max : 8 le 27/09/99 et 4 le 28/04/97.
Chevalier gambette	Du 22/02 au 10/10.	Max : 36 le 13/05/83 à Rieutort-de-Randon.
Chevalier stagnatile	1 le 11/09/2014 à Naussac.	
Chevalier aboyeur	Du 25/03 au 31/05 et du 06/07 au 21/11.	Max : 25 le 30/04/09 à Montbel.
Chevalier culblanc	Du 04/01 au 02/02/10 ; du 02/03 au 12/12.	Max : **15** le 20/03/107; hivernage depuis 2014/2015 à Booz.
Chevalier sylvain	Du 04/04 au 25/05 et du 29/06 au 12/10.	Max : 28 le 01/05/10 à Usanges.
Chevalier guignette**	Surtout du 15/03 au 15/10. Hivernage apd 2006/2007. Parades apd 12/04, envol apd 21/05.	Max : 27 le 28/04/2012 à Charpal.
Tournepierre à collier	17/08-24/09 : 6 d de Naussac, Charpal (2 le 22/08/06), 2 des Cévennes (27 et 31/08/08). Derniers : 24/09/16 à Naussac	
Labbe pomarin	1 se pose sur le Mont Lozère le 24/10/00.	
Labbe parasite	1 juv en migration le 04/09/2012 à Booz ; 1 en mig le 21/10/14 sur le Méjean.	
Grand labbe	**1 en migration le 23/09/2017 à St Germain du Teil**	
Mouette mélanocéphale	13 données : du **22/03** au 13/05 et du 02/07 au 23/11. Max 11 le 23/11/2008 à Naussac. Aussi Charpal, Booz, **Méjean.**	
Mouette pygmée	Du 16/04 au 24/05 et du 06/07 au 10/12.	Max : 12 le 26/04/02 à Naussac.
Mouette rieuse**	Nidif. en 1982 à Naussac (90 cples), tentatives en 83, 84 et 85 à Charpal.	Max : plus de 220 le 14/11/99 à Naussac.
Goéland d'Audoin	Naussac : 1 le 03/05/86.	
Goéland cendré	Du 22/11 au 14/03. 1 le 18/06/02 à Naussac possible.	

Goéland brun	Toute l'année sauf août. Repro 2013 à Naussac (1 juv)	Max : 7 le 12/04/03 à Naussac.
Goéland argenté	Depuis 2000 : 1 le 27/02/07 à Booz, 1 le 18/11/07 ; Charpal : 2 le 03/10/08, 4 le 14/12/10 , 1 le 06/02/13 Chastel-Nouvel	
Goéland leucophée**	Nidif. à Naussac depuis 1983. Max 72 couples 2016	Max : 400 à Langogne les 05 et 06/11/97
Goéland marin	Naussac : 1 à 3 oiseaux du 03 au 22/12/83, 1 le 26/01/09 (suite tempête Klaus)	
Mouette tridactyle	1 le 01/01/75 au Mt Aigoual, 8 du 05 au 08/02/84 à Florac ; 3 le 23/02/84 à Mende , 13/03/08 dans le Valdonnez, 9 du 25 au 28/01/2009.	
Sterne caugek	1 le 29/06/85 à Naussac, 2 les 03 et 04/05/86 à Naussac, 1 le 17/04/98 au Moulinet.	
Sterne pierregarin	11 données : du 26/04 au 04/10 à Naussac et le 17/10/83 à Villefort (10 données), **31/07/2017 Ribennes**	
Sterne naine	Naussac : 4 le 11/06/89 et 2 le 23/09/01.	
Guifette moustac	Du 11/04 au 01/07 et du 14/08 au 06/09.	Max : 30 le 20/04/83.
Guifette noire	Du 16/04 au 25/09, surtout mai et septembre.	Max : 143 le 06/05/03.
Pigeon biset	Souche sauvage à préciser : apd du 28/01 au 09/10. Surtout noté en mars.	Max : 5.
Pigeon colombin*	30/01-10/12 et 06/01/2015. Chant du 23/02 au 21/08.	Max : 97 le 14/04/2016 à Chanet, causse Méjean.
Pigeon ramier**	Chant du 15/01 au 05/10. Mig du 18/02 au 15/04 et du 10/09 au 27/11.	1442 le 19/03/11 au Puech, tot. **4190 en 2017.**
Tourterelle turque**	Chant tous les mois. Couve à partir 29/01.	Max : 82 le 01/12/11 au Recoux.
Tourterelle des bois*	Du 12/04 au 23/09. Chant du 19/04 au 05/07.	Max : 6 le 17/07/09 à St Bonnet de Chirac.
Coucou geai*	Du 08/04 au 08/09. Chant jusqu'au 26/05. 1 le 17/01/12. Nidif. Irrèg. depuis 1975.	Max : 3 juv sur les grands causses.
Coucou gris**	Du 12/03 au 28/09. Chant du 12/03 au 24/07.	Max : 17 le 16/05/05 aux Ayguières (Chanac).
Effraie des clochers**	Altitude max de 1180 m.	Max : 7 le 22/06/95 à Ste-Enimie (dont 5 *pulli*).
Petit duc scops**	Du 17/03 au 29/09. Chant du 22/03 au 09/09.	Max : 4 chanteurs ensemble et 25 en tout en 2006.
Grand-duc d'Europe**	Chant tous les mois. 20-30 c en 2013.	7 électrocutions de 1992 à 2000, piégé en 2004.
Chevêchette d'Europe	1 les 18 et 21/03/2016 sur l'Aigoual	
Chevêche d'Athéna**	Chant toute l'année. Envol juv du 29/05 au 26/08. Pas au-delà de 1250 m.	
Chouette hulotte**	Chant tous les mois. Juv apd 02/03. Nourrissage jusqu'au 04/09. Jusqu'à 1300 m, très rare au-delà.	
Hibou moyen-duc**	Chant du 11/01 au 30/05. Sortie du nid du 03/05 au 21/09. Dortoir de 66 le15/02/08 et 81 le 24/01/2015 au Massegros.	
Hibou des marais	Nidif. en 1976 à Charpal (4-5 cples) et 2014. Du **28/09** au 26/05.	Max 32 le 11/01/08 au Massegros, 53 hiver 2014/2015.
Nyctale de Tengmalm*	Chant du 01/01 au 05/07 et 20/09. Alt min 820 m. **78/83 territoires 2017, max nichée 7 poussins 2017**	
Engoulevent d'Europe**	Du 16/04 au 01/10. Chant du 16/04 au **06/09**. Jusqu'à 1450 m.	Max : 10 le 10/06/94 à Mas-Saint-Chély.
Martinet noir**	Du 30/03 au 10/10/99. Nidif. jusqu'à 1250 m et 14/09.	Max : plusieurs dizaines de milliers à Marvejols le 01/08/93.
Martinet à ventre blanc**	Du 14/03 au 01/10.	Tarn, Jonte, Balduc. Max : 120 le 21/09/09 au Rozier.
Martin pêcheur d'Europe*	Pas plus de 3 ensemble. Jeunes du 22/05 au 26/08. Max à 1238 m.	
Guêpier d'Europe	Du 13/04 au **22/09**. Rare du 28/05 au 14/08.	Max : 76 le 01/09/2016 Bonnecombe et tot. 266 en 2016
Rollier d'Europe	Du 06/05 au 26/09	Total **53 ind. en 2017**, 19 ens. 28/08/16 Vébron (dortoir)
Huppe fasciée**	Du 05/03 au 25/09, **1 le 14/11/17**. Chant 25/02/2016 puis du 27/03 au 19/07. Max : 8 le 29/06/14 ; **57 chanteurs en 2017**	
Torcol fourmilier**	1 du 17-30/01/2016 Montrodat. Du 05/03 au 24/09. Chant du 05/03 au 19/07. Envol juv jusqu'au 20/09. Max : 4	
Pic cendré (disparu)	1 chanteur le 22/06/1993 dans le bois des Oubrets, Meyrueis. Pas au-delà de 800 m.	
Pic vert**	Chant du 03/01 au 22/07. Tambour du 25/02 au 18/05.	Max 6 le 13/12/08 à Canilhac.
Pic noir **	Chant du 01/01 au 13/07, tambourinage jusqu'au 13/08 puis 10/09 au 10/12/2016. Loge jusqu'à 1400 m.	
Pic épeiche**	Tambour du **01/01** au 08/06 et du 03 au 19/10. Chant jusqu'au 20/06. Envol juv apd 19/05.	
Pic mar**	Lot aval depuis Chanac jusqu'à 1000 m (chênaie). Tambours du 01/03 au 26/05. Repro sûre depuis 2006. 10-20 c 2017	
Pic épeichette*	Chant du 16/01 au 03/09. Tambours surtout du 15/01 au 14/05 et 28/09-18/12	
Alouette calandre**	Du 12/06 au 27/08. Nidif 2005 à Chanet de 3-4 c. Max : 32 le 31/07/05. 1 c du 08/05 au 10/06/06 à Chanet., 2 à Chanet le 03/04/07, 8 à Champerboux le 08/09/07, 1 à Chanet les17/05/08 et 02/05/09, **1 à Combe Maury 30/08/2017**	
Alouette calandrelle**	Du 15/04 au 26/08. Chant du 27/04 au 29/07.	1 à Naussac le 04/05/86. Max : 6 le 26/05/80 à Hures.
Cochevis huppé (disparu)	Données sujettes à caution : aucune depuis 20 ans et des confusions régulières. Naussac : 11/06/83, 16/06/84. Les 24 et 30/07/89 à Saubert, le 23/09/97 au Villaret (Méjean), le 04/08/97 à Chanac.	
Alouette lulu**	Chant du 10/01-14/08 et 17/09-31/10. Juv apd 28/04.	Max : 34 ens. Le 24/10/03 les Vignes ; 281en 2014 Puech Debon.
Alouette des champs**	Chant du 04/02 au 12/08. Becquées du 06/05 au 29/08.	Max : 264 le 10/01/10 à Booz ; 787 migration Puech Debon en 2011.
Alouette haussecol	1 le 18/10/03 au sommet de Finiels.	
Hirondelle de rivage*	Du 17/03 au 17/10. Très rare juin-juillet. Repro prob en 2008 à Florac.	Max annuel: 77 en 2015 ; 30 le 24/08/15 Malzieu

Hirondelle de rocher**	Surtout du 20/02 au 15/10, rare en hiver, toute l'année en 2012.	Max : 700 le 05/09/03 au Rozier.
Hirondelle rustique**	Du 03/03 au 09/11. Mig jusqu'au 24/05 et à partir du 03/08. Envol du 04/06 au 17/09. Repro inf. à 1340 m.	Max : 15 000 le 30/09/2012 Banassac et 18368 21/09/14 Puech Debon.
Hirondelle rousseline	3 le 22/05/79 vers Meyrueis, 1 le 26/06/05 à Saint-Urcize (Cantal) limite Lozère.	
Hirondelle de fenêtre**	Du 14//02 au 31/10. Envol du 04/06 au **22/09**. Mig apd 20/08.	Max : 4000 le 28/09/93 à Chanac.
Pipit de Richard	2 le 26/09/2011 au Ségala, Fraissinet de Fourques.	
Pipit rousseline**	Du 11/04 au 15/10. Chant du 16/04 au 24/08. Parades dès le 23/04, becquée jus **12/08**. Max 40 le 22/08/11 Méjean.	
Pipit des arbres**	Du 08/03 au 22/10, chant du 08/04 au 03/08. Migration jusqu'au 25/04 et à partir du 17/08.	Puech Debon : max de 74 le 31/08/14 et 258 en 2011 .
Pipit farlouse**	Chant du 26/02 au 22/07. Nourrissage jus **24/08.**	Max : 394 le 05/04/14 au Puech Debon.
Pipit à gorge rousse	Du 03/04 au 18/05 et du 15/09 au 18/10 (43 données).	Max : 5 le 26/04/15 à Usanges et 53 le 17/04/16 Montbel
Pipit spioncelle**	Chant du **22/04** au 07/08.	Max : 69 le 14/04/11 sur Méjean.
Bergeronnette printanière**	Du 11/03 au 28/10. Mig jusqu'au 30/05 et apd 12/08. ssp *flava*, *flavissima*, *thunbergi*, *cinereocapilla*, *iberiae*.	Max : 110 le 22/08/11 à Usanges. 6-8 c flava x iberiae (= centratlantique) sur Aubrac.
Bergeronnette citrine	1 m chanteur du 03 au 07/07/2012 à Usanges, Aubrac.	
Bergeronnette des ruisseaux**	Chant du **21/02** au 04/07. Envol juv apd 17/04-07/08.	Max : 10 ensemble.
Bergeronnette grise** *Bergeronnette de Yarell*	Chant du 20/02 au 26/06. Mig du 01/02 au 05/04 et du 19/08 au 03/11. Envols du 05/06 au 20/09.	Max mig Puech D. **454 le 22/10/17, 1286 tot 2017** *6 données en mars/avril (dernière en 2010)*
Jaseur boréal	Total de 90 ind du 19/12/04 au 14/03/05.	Max : 34 le 13/02/05 à Rocles. 2 le 09/01/2009 à La Garde.
Cincle plongeur**	Chant du 17/09 au 10/05. Ponte à partir du 20/02 et envol juv du 05/02 au 26/07.	Max : 23 le 12/01/08 sur Truyère.
Troglodyte mignon**	Chant possible toute l'année. Envol juv du 16/04 au 21/08.	
Accenteur mouchet**	Chant possible toute l'année. Peu fréquent en hiver. Becquées 21/04-31/08.	Max 33 le 27/05/10 en 10 EPS à La Canourgue.
Accenteur alpin	Du 29/09 au 25/04. 1 chanteur le 10/05/08 à Serviès.	Max : 30 le 23/12/78 à La Malène.
Rougegorge familier**	Chant possible toute années. Poussins 23/03 - 27/08.	Max : 52 le 06/03/08 à Booz .
Rossignol philomèle**	Du 06/04 au 16/09. Chant du 08/04 au 13/07. Rare au-dessus 1050 m en repro, max à 1250 m en migration.	
Gorgebleue à miroir	Du 04/03 au 13/04 et du 22/08 au **08/10**. 17 mentions toutes de la ssp *cyanecula.*	
Rougequeue noir**	Chant du 27/01-21/12. Envol du 04/05-01/10. Max 6 juv.	Max **50+ Aigoual 26/10/2017**
Rougequeue à front blanc**	Du 20/03 au **26/10** et 1 le 04/11 (mort). Chant du 05/04 au 08/07. Nidif. jusqu'à 1260 m. Juv au nid un 30/08.	Max 10 le 05/09/13.
Tarier des prés**	10/04-21/10. Cht 17/04 -08/07. Envol juv du 30/05- 10/09. Nourrissage le **16/09/2017**. Mig jus 20/05 apd 13/08.	Max : 40 le 12/08/14 sur Aubrac.
Tarier pâtre**	Chant du 15/02 au 22/07. Envols du 27/04 au 21/09. Nourrissage jusqu'au 02/10. Jusqu'à 1541 m en repro.	
Traquet motteux**	Du 15/03 au 12/11. Chant du 06/04 au 04/07. Nourrissage du 20/05 au 25/08. ssp *leucorrhoa* prob Méjean: 14/09 au 08/10. Mig jus 19/05 et apd 15/08.	Max : 80 le 11/09/13 Sauveterre.
Traquet oreillard**	Du 10/04 au 26/09. Chant du 04/05 au 01/06. Nicheur encore en 2006 et 2013.	Max : 6 localement.
Traquet rieur	Signalé au XIX ème siècle.	
Monticole de roche**	Du 30/03 au 26/09. Chant du **21/04** au 18/07. Envol juv du 11/06 au 13/08.	Max : 8 localement.
Monticole bleu**	Chant du 22/03 au 09/06. Nourrissage du 23/04 au 27/07.	Max : 5 ensemble. 1-10 couples, 5 possibles en 2016.
Merle à plastron**	Du 05/03 au 01/12; 23/12/1987, 16/12/09, 3 d en 12/2014, 1 le 28/01/98 à Fraissinet-de-L. Chant du 07/04 au 10/06.	Max : 200 les 02 et 03/04/94 à Mas-d'Orcières (Mont Lozère).
Merle noir**	Chant du 07/01 au 23/09. Nourrissages du 25/02 au 05/08.	Max : 31 le 13/12/08 à St Germain du Teil.
Grive litorne**	Nidif depuis1984 du 26/04 au 10/07. Mig 19/09-13/04. Chant 12/05 au 24/06. Juv 14/06 au 07/07.	Max : 2700 le 12/12/04 à Bonnecombe.
Grive musicienne**	Chant du 10/01 au 31/07. Mig jus. 29/03 et apd 01/10.	Max :1600 le 05/03 en mig en 1 h à St Germain du Teil.
Grive mauvis	Du 08/10 au 11/04.	Max : 340 le 05/03 en mig à St Germain du Teil.
Grive draine**	Chant du 06/11 au 15/07. Nourrissage du 05/04 au 15/07.	Max : 204 le 21/03/04 à La Garde-Guérin en migration.
Bouscarle de Cetti*	Du 20/03 au 28/09 au Rozier jus. 2003, 13/07/85 à St Etienne VF, 1 le 04/10/01 à Pied-de-Borne, 02/11/2012 à Florac.	
Cisticole des joncs**	17/08/1975, 27/08/2008, 15/09/2009. Annuelle dep. 2014 : **23/04**-16/12. Repro apd 2014, 17 territoires en 2016	
Locustelle tachetée*	Du 09/04 au **01/10**. Chant du 12/04 au 29/07 et le 19/08.	Max 4 18/06/07 Finiels. 0 en 2012. Nid 18/07/2016 Bonnecombe
Phragmite des joncs	21 mentions; 17/04/16, 01/05/86, 18/07/13 puis du 07/08 au 04/10.	Max 2 le 12/09/10 à Usanges.

Rousserolle effarvatte	Du 27/04 au 27/10, 3 fois chants en juin jus 01/07.	Max 13 le 10/09/08 aux Salhiens.
Locustelle luscinioïde	Salhiens 22/09/2006 et Usanges 26/08/2013.	
Hypolaïs ictérine	1 le 27/04/2009 à Booz ; 04/05/2012 à St G de Lévéjac, 1 le 01/06/2015 à SGTeil	
Hypolaïs polyglotte**	Du 19/04 au 11/09. Chant du 19/04 au 16/07 jusqu'à 1250 m (adret)	Max : 8 chanteurs au Massegros le 02/06/10.
Fauvette à tête noire**	Chant du 05/01 au 07/11 jusqu'à 1450 m. Nour. du 28/04 au 20/08 .	Max : 10 ensemble.
Fauvette des jardins**	Du 10/04 au 27/09. Chant du 25/04 au 01/08 **et 21/08/17** surtout au-dessus 800 m.	
Fauvette babillarde	Récemment : 28/04/08 à Booz et du 24/08 au 24/09	
Fauvette orphée**	18/04-09/09 (et 23/09/16). Chant du 27/04 au 18/07 jusqu'à 1240 m (1460 m).	100-200 c estimés a minima.
Fauvette grisette**	Du 29/03 au 28/09. Chant du 02/04 au 01/08 jusqu'à 1600 m.	Nour. 31/05-29/08.
Fauvette à lunettes**	Lande à buis. Du **29/04** au 31/07 Chant du 29/04 au 05/07. Nidif. sûre Méjean 1982, 2007, 2015, 2016, **2017** probable tous les ans. Sur le Sauveterre à Caramonde : 7 chtrs le 10/05/07 et repro sûre. **5 sites sur le Méjean en 2017**	
Fauvette pitchou**	Chant du 01/03 au 30/07 et du 05/10 au 12/11. Notée jusqu'à 1230 m.	Max : 4 chanteurs le 01/04/02 aux Balmelles.
Fauvette passerinette**	Du 28/03 au 20/09. Chant du 08/04 au 12/07 jusqu'à 1140 m.	Max : 6 ensemble.
Fauvette mélanocéphale*	Du 25/03 au 30/10. Chant du 25/03 au 12/07 jusqu'à 500 m en Cévennes. Quelques mention sur Causses.	
Pouillot à grands sourcils	1 le 13/10/2012 à Booz, 1 le 21/10/2014 à SGTeil, **3 en octobre 2017 : les 11 et 14 Banassac, 24 au 28 St Germain du Teil**	
Pouillot de Bonelli**	Du 24/03 au 04/09. Chant du 24/03 au 20/08 jusqu'à 1380 m. Max de 20 chanteurs le 10/05/11 au Massegros.	
Pouillot siffleur**	Du 31/03 au 03/09. chants annuels à SGTeil en 05-06, 3 juv nourris 2007 les Hermaux, chanteurs Mont Lozère, Vébron, **Ribennes**, Mende selon années. Chênaie, hêtraie 9000-1300 m.	
Pouillot véloce** *Pouillot de Sibérie*	Surtout du 01/03 au 01/11, rare en hiver. Cht 29/02-29/10. *7 d : du **29/01** au 27/03 et 01/11/14.*	Max : n centaines le 21/03/98 sur le Tarn.
Pouillot fitis*	Du 19/03 au 30/09. Chant du 29/03 au 20/09. Nidif. à confirmer.	Max 22 le 10/09/10 à Booz.
Pouillot brun	1 le 11/10/16 à Booz, St-Germain-du-Teil.	
Roitelet huppé**	Chant du **23/01** au 21/07 et du 02/09 au 14/10. Nourrissage jusqu'au 29/08.	Max : 23 le 19/11/2015 à Cabrunas
Roitelet triple bandeau**	Chant du 11/02 au 09/07 puis 30/08 au 18/09 (max 1380 m).	Max :19 le 20/09/2013 Les Vignes
Gobemouche gris**	Du 22/04 au 28/09. Chant du 16/05 au 20/06. Envol juv du 22/06 au 23/08.	Max : 17 c dans Tarn en 2006.
Gobemouche noir**	Du 09/03 au 11/11 mais surtout du 18/04 au 26/09.	Max : 20 le 04/09/2013 La Canourgue.
Mésange longue queue**	Construction du nid apd 02/03 et envol **04/05**-02/08.	Max : 30 ensemble 01/1998 et 06/2012 1 ssp *caudatus* le 12/12/10 sur le Méjean.
Mésange nonnette**	Chant du 16/12 au 18/07 puis du 28/08 au 06/11.	Max : 8 le 21/01/13 Bagnols les Bains.
Mésange boréale	À confirmer : 1 le 20/03/93 St Bonnet-de-C, le 30/03/98 au Mt Aigoual,Vébron en 1985, 1 le 21/10/02 au col de la Banette, 1 le 19/04/05 Canilhac, 4 d Pont-Archat 18/02 au 23/03/06 et 30/12/06, 2 le 23/01/08 à Luc.	
Mésange huppée**	Chant du 09/12 au **13/08** et 04-31/10 de 600 m à 1550 m.	Max : 25 le 06/10/12 La Villedieu.
Mésange noire**	Chant toute l'année . Nourrissages du **20/04** au 25/08.	Max : **520 mig Puech D. 2017 et 175 le 22/10/2017**
Mésange bleue**	Chant du 09/12 au 11/10. Envol juv du 12/05 au 30/07. Max : 11 pulli à Marvejols le 30/05/10.	Max : Mig **28/08 au 19/11**. Puech Debon : Max **510 en 2017** et 149 le 21/10/12 .
Mésange charbonnière**	Chant toute année mais surtout 10/01-30/05. Poussins 13/04 au 27/08.	Max : 10 *pulli* le 09/05/00 à Pied-de-Borne. 34 mig 21/10/12 Puech Debon.
Sittelle torchepot**	Envol apd 12/05. Sous 1100 m mais 1 nid à 1400 m	Max : 6 ensemble.
Tichodrome échelette	Du 11/10 au 21/04. 1 le 14/06/98 à Rochefort (Florac) et le 20/06/07 à Ispagnac.	Max 3 le 29/10/06 et 13/11/10.
Grimpereau des bois**	Chant du 08/01 au 24/07 de 800 à 1440 m. 3 nourrissages notés du 10/05 au 12/07.	
Grimpereau des jardins**	Chant toute l'année. Nidif. du 17/03 au 21/07. Rare au-dessus de 1230 m.	
Rémiz penduline	7 d : 14/04/2011, 14/03/12 Malzieu et du 02/10 au 02/11, max de 8 le 02/10/15 lac du Born. Aussi Moulinet, Banassac	
Loriot d'Europe**	Du 16/04 au 16/09. Chant du 16/04 au 01/08. Repro vallée du Lot/Banassac et Tarn/Le Rozier.	
Pie-grièche écorcheur**	Du 21/04 au 03/10. Chant du 08/05 au 22/07 jusqu'à 1350 m. Envol juv du **10/06** au 03/09.	
Pie-grièche à poitr. rose	Dernière mention vers 1970. 1 le 19/07/2014 à Arzenc-de-Randon.	
Pie-grièche grise**	Max 5 juv. Chant **02/03-01/07** et 03/09-21/11. Nour. jusqu'au 23/08. 30-60 couples. Hivernage du 26/08 au 27/03. max 385 d en 2016	
Pie-grièche méridionale**	Chants pos. Toute l'année. Envol juv (max 5) 20/05-13/08. 30-60 couples.	
Pie-grièche à tête rousse*	Du 13/04 au 27/05 en mig sinon jusqu'au 24/08.	Max : 8 c St Chély-d'A 1977-1978. Nidif. j' 1994 prob.
Geai des chênes**	Chant du 20/04-24/06. Nour. 27/05-01/08	Max : 41 le 24/02/05 à St Germain-du-Teil.
Pie bavarde**	Envol 11/05-31/07.	Max : 46 le 03/01/10 à Booz en dortoir. Jus. 1300 m.

Cassenoix moucheté	Nidif 1977 Méjean. 08/82, 1987 (3 dont 1 *macro.* 30/05/87), 1999, 1 *macro.* 22/08/08 à Barre des C. Max 4 La Blatte 2012. 32 données 2005-**2017**	
Crave à bec rouge**	Parade à partir du 04/03. Envol juv à partir du 04/06.	Max : 310 le 25/07/04 à Frépestel (Méjean).
Chocard à bec jaune	1 le 07/04/2016 en migration aux Vignes	
Choucas des tours**	Max : 30 couples 2010 à Canilhac. Parade apd 19/02.	Max : 1200 le 10/11/89 en dortoir à Mende.
Corbeau freux	40 le 17/03/85 en dortoir à Mende et 7 le 22/02/2015 à St Germain du Teil	
Corneille noire**	Incub. apd **18/03**, envol juv **10/05**-19/07. 1200 m max.	Max : 800 en dortoir le 24/01/84 à Langogne.
Corneille mantelée	07/02 -11/04/94 Florac, 09/11/95 St Ch.-d'A, 16/10/98 Marvejols, 30/01/09 Langogne, 29/10/10 St Pierre des Tripiers.	
Grand corbeau**	Juv du 08/02 au 29/07. Max : 6 juv à envol.	Max : 400 à La Parade en 02/97.
Étourneau unicolore**	Méjean (12 mentions) : 1er le 18/07/2011, 5 d en 2015 dont repro à Nivoliers , max 9 le 29/06/2015 Sauveterre	
Étourneau sansonnet**	Nour 17/04-**08/07**, juv apd 11/05. Chant 07/01-29/05.	Max : 70 000 le 30/11/11 sur Aubrac.
Étourneau roselin	5 le 03/06/02 à St Laurent-de-Trèves, 1 le 04/06/02 à Drigas.	
Moineau domestique**	Nourrissages du 26/03 au 27/08. Pas au-delà de 1200 m	Max : 80
Moineau friquet**	Mende et Margeride, très localisé. Disparu Lanuéjols	Max : 50 le 25/02/05 à Rimeize.
Moineau soulcie**	Hivernage dep. 2013/2014. Nour. 01/06-13/07 jus 1230 m.	Max : 160 le 26/08/01 à Nivoliers.
Niverolle alpine	Du 30/10 au 03/04 ; hivernage en 1968,1978 et 1980.	Max : 50 le 01/12/72 sur le Méjean.
Pinson des arbres**	Chant du **31/01** au **08/08**. Nour. 22/04-08/08. Mig 27/01-05/05 et 27/08-**03/12**.	Max : 6000/h le 10/03/00 à Servières.
Pinson du Nord	Du 03/10 au 12/04. 1 le 29/04/01 à St R. de D. et 07/05/11 Bonnecombe.	Max : 500 000 le 09/02/05 Mt Lozère
Serin cini**	Du 10/02 au 27/11 ; 21-30/12. Chant du 23/02 au 07/08 et du 24/08 au 02/11. Envol du 09/05 au 03/09 jus. 1265 m.	Max : 200 le 17/10/03 au Rozier.
Venturon montagnard*	Chant du 12/01 au 10/07. Envol du 19/05 au 08/07.	Max : 98 le 14/11/99 à Servières.
Verdier d'Europe**	Chant pos. Toute année. Nour. du 22/04 au 16/08.	Max : 200 le 09/03/03 au Massegros.
Chardonneret élégant**	Chant du 04/01 au 16/08. Nour. du 25/04 au 23/09.	Max : 300 le 19/09/01 au Mazet (Lachamp).
Tarin des aulnes*	Hivernants du 12/09 au 21/05. Repro pos. Apd 2003, **cert 2017.**	Max : 400 le 02/04/00 Mende.
Linotte mélodieuse**	Chant du **22/02** au 31/07. Nour. du 24/05 au 27/08.	Max : 359 le 28/02/2014 sur le Méjean.
Sizerin cabaret	42 mentions du 22/10 au 08/04, max de 33 le 26/01/2014 à Naussac.	33 le 26/01/2014 Naussac, 11 d 2014.
Bec-croisé des sapins**	Chant du 02/10 au 06/08. Nour. 04/01-08/10. repro hiver 2014/15	Max : 300 le 31/08/00 à Charpal.
Roselin githagine	1 mâle le 30/05/2015 au Peyrou, Saint-Julien-du-Tournel, 1320 m	
Bouvreuil pivoine** *Bouvreuil trompettant*	Chant du 11/01 au 18/07. Nourrissages du 19/05 au 31/08. Du 24/11 au 11/12.	Max : 20 en 01/10 à Bagnols les Bains.
Grosbec casse-noyaux*	Repro rare. Surtout du 20/09 au 20/03. Max 100 le 04/02/13 et 23/01/15 Montrodat ; Puech Debon : **2331 en 2017** et 605 le 21/10/13.	
Bruant des neiges	12 données (5 en 2013) du 28/11 au 17/03 ; Mt Lozère : 7 données (4 en décembre) ; max 8 le 07/02/99 ; Naussac: 1 le 28/11/10 ; Méjean : 1 f 12/01/11 et 5-6/12/13.	
Bruant jaune**	Chant du 15/02 au **02/08**. Nour. du 16/04 au 01/09.	Max 200 le 16/12/97 Marvejols, 30/10/13 Mt Lozère.
Bruant zizi**	Chant du 18/01 au 06/12. Envol juv 30/04-28/09.	Max de 20
Bruant fou**	Chant du 15/02 au 23/07. Envol juv du 31/05 au 18/08.	Max : 20 le 27/03/84 à Mende et 21/09/08 col du Sapet.
Brunt ortolan**	Du 17/04 au 29/09 . Chant du 26/04 au 03/08. Ponte jusqu'au 15/07.	Max : 30 bagués le 04/09/97 au Buffre.
Bruant des roseaux**	Mig du 20/02 au 22/04 et du 20/09 au 14/11. Chant du 18/03 au 14/07. Hiv. Booz de 2006-07 à 2011-12.	Max : 80 ensemble le 11/03/05 à Marvejols.
Bruant mélanocéphale	Le Pompidou :1 m le 10/08/91,Champerboux : 1 m le 26/06/98, 1 fem le 10/05/02 ; Nivoliers 1 m chtr 22/06 au 26/06/02 avec 1 fem pos ; 1 m 20/07/2013.	
Bruant proyer**	Du 10/03 au 28/11. Chant du 11/04 au 26/07 jusqu'à 1230 m.	Max : 154 chanteurs 2015 ; 100-200 c.

Exotiques / échappés/féraux ou susceptibles de faire souche en France

Pélican frisé	1 le 16/07/2004 au Monastier
Faisan vénéré	1 en mars 2008 à Marvejols
Bernache du Canada	1 durant l'automne 1998 à Naussac
Canard mandarin	1 le 14/05/1990 Naussac, 1 fem adulte le 10/09/2003 à Booz, présence à Ste Cécile d'A. et Mende (depuis 2009)
Canard carolin	2 en vol le 16/03/2009 à Banassac
Vautour de Rüppel	1 le 06/06/2004 aux Vignes, 1 le 31/05/2005 à La Canourgue et 1 le 12/09/2009 sur le Méjean (échappés de volière)
Serin du Mozambique	1 du 10/12/2004 au 04/01/2005 à Pied-de-Borne (mangeoire)
Perruche ondulée	1 le 30/06/2000 au Mazet

Bilan de l'inventaire des oiseaux de Lozère au 31 décembre 2017

Attention : l'inventaire est susceptible d'être modifié avec effet rétroactif selon l'arrivée d'informations anciennes

• **316 espèces d'oiseaux recensées** : 308 sauvages et 8 échappées de captivité ou de populations férales.

• **159 espèces nicheuses certaines**** et possibles/probables*, au moins une fois depuis 50 ans (dernières : Cisticole des joncs et Elanion blanc en 2014, Faisan de Colchide en 2016.

• **28 nouvelles espèces depuis l'Atlas 2000** : Bernache nonnette, Labbe pomarin (2000), Avocette élégante (2001), Étourneau roselin (2002), Alouette haussecol (2003), Busard pâle (2004), Jaseur boréal, Bergeronnette de Yarell (ssp), Alouette calandre, Faucon crécerellette (2005), Locustelle luscinioïde (2006), Aigle Impérial (2007), Canard carolin, Hypolaïs ictérine, Harelde boréale (2009), Rémiz penduline, Étourneau unicolore, Pipit de Richard (2011), Marouette poussin, Gypaète barbu (réintroduction), Bergeronnette citrine, Labbe parasite (2012), Chevalier stagnatile (2014), Roselin githagine (2015), Chevêchette d'Europe, Chocard à bec jaune, Pouillot brun (2016), **Vautour de Rüppell, Grand labbe (2017)**

• Dernières nouvelles espèces notées : Chevêchette d'Europe 18/03/2016, Chocard à bec jaune 07/04/2016, Pouillot brun 11/10/2016, Vautour de Rüppell 19/03/2017, Grand labbe 23/09/2017

Max : 223 espèces en 2008, 224 en 2012, 225 en 2015, 227 en 2016, **231 en 2017**