



ASSOCIATION LOZERIENNE POUR L'ÉTUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Montée de Julhers 48000 BALSIEGES

Tél : 04 66 47 09 97

alepe@wanadoo.fr

SYNTHESE ORNITHOLOGIQUE
LOZERIENNE
2002



ALEPE

ASSOCIATION LOZERIENNE POUR L'ÉTUDE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Association loi 1901 déclarée le 20 novembre 1978 à la Sous-Préfecture de Florac

Agréée au titre de la protection de la nature et de l'environnement dans le cadre départemental (Arrêté n° 95-0665)

Agréée au titre de la jeunesse et de l'éducation populaire sous le numéro 48.00.129.

SIRET N° 38424346500042 - Code APE N° 913 E

SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE LOZÉRIENNE

ANNÉE 2002

*Compilation des données et rédaction achevées aux Vignes le 15 février 2004, par François LEGENDRE
Saisie des données, relecture et mise en forme achevées à Marvejols le 15 mars 2004, par Rémi DESTRE*

SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE LOZÉRIENNE 2002

Cette synthèse est une compilation de **6878 données** lozériennes « intra-muros » (contre 7343 en 2001) auxquelles s'ajoutent quelques 198 données provenant de localités proches, hors département. Ce sont au total **217 espèces** qui furent observées cette année.

Parmi les observations originales relevées cette année, citons une nouvelle espèce, l'**Étourneau Roselin** en juin, de nouvelles données d'**Avocette élégante**, de **Bruant mélanocéphale**, de **Bernache cravant**, d'**Outarde canepetière**, l'hivernage renouvelé pour une femelle de **Garrot à oeil d'or**, une fréquence accrue pour la **Grande aigrette**, le **Bihoreau gris** et la confirmation pour le **Coucou-geai** nicheur.

Citons au rang des nouvelles inquiétantes, le très peu de données pour le **Bruant ortolan**, le **Moineau friquet**, le **Traquet oreillard** et la **Huppe fasciée** et l'absence de données pour l'**Alouette calandrelle**.

Liste des observateurs ayant communiqué de manière directe ou indirecte leurs données : qu'ils soient tous chaleureusement remerciés de leurs précieuses contributions car sans données pas d'association et pas de protection.

Philippe Baffie, Philippe Baudoin, Guy Benoît, Jean-Louis Bibal, Norbert Borson, Jérôme Bouard (JBo), Dominique Bousquet (DBo), Jacky Brard, François Breton (FB), Grégory Chamming's, Jean-Claude Chazalmartin, Samuel Chazalmartin (SC), Christophe Cognier, Thierry Coulée (ThC), Stéphane Cournac (StC), Jean-Damien Courtial (JDC), Thomas Déana (TDè), Patrick Delmas (PaD), Jean Demolder, Rémy Désécures (RyD), Rémi Destre (RD), Stéphane Duchâteau, Nathalie Dufourcq, Alexandre Feltgen (AFè), Jocelyn Fonderflick (JF), Marc Förschler, Christian Fossierat, Michel Foulon, Grégory Garrel, Bruno Gilard (BrG), Bruno Grindel, Marinette Hugon, Gil Jacotot, Alain Jacquet (AJ), R. Juillard, Jürgen Kläger, Bertrand Lamothe, François Legendre (FL), Anne-Marie Lemonnier, Claude Lhuillier, Jean-Pierre Malafosse (JPM), Isabelle Malafosse (IM), François Marchalot (FrM), William Mathot, Philippe Miallot, Daniel Michau (DaM), Xavier Mortemard, Robin Mourgues (RM), Bertrand Piquès, Michel Quiot (MiQ), Muriel Pascal, Xavier Pédel (XP), Pascal Peuch (PP), Bruno Righetti (BR), Jean Séon.

Que tous trouvent dans cette synthèse l'expression des remerciements de l'ALEPE.

Abréviations utilisées :

Individu (ind.), juvénile (juv.), adulte (ad.), couple (cple)...
 Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique (err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.), transhumant (trans.).

La liste des oiseaux est traitée selon l'ordre systématique établi par la LPO (2003).

Toutes les espèces signalées jusqu'à ce jour (CR des années précédentes) sur le département sont mentionnées dans la liste même si aucune donnée n'apparaît pour l'année.

Les nouvelles espèces sont marquées d'un astérisque.

Les espèces qui ont été signalées de manière très exceptionnelle sont en caractère calligraphique plus petit.

Liste des espèces 2002

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*) – **HM, rare** - Aucune donnée.

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*) – **HM, rare** - 1 fiche. 1 adulte le 28/04 à Charpal par un fort vent du nord avec des conditions arctiques. Il était en parfait plumage nuptial (RD, ThC).

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*) – **H, exc.** - Naussac 1985.

GRÈBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*) – **NHM, loc.** - 40 fiches. Noté tous les mois sauf en février et mars. Max de 21 le 29/09 à Ganivet (RD), seul lieu où il est noté nicheur avec au moins deux couples.

GRÈBE HUPPÉ (*Podiceps cristatus*) - **NHM, loc.** - 104 fiches. Noté surtout à Naussac (avec au moins 4 couples nicheurs) et Charpal (également 4 couples nicheurs). Max de 16 à Naussac le 19/01 (ThC) lors du recensement Wetlands. Noté aussi au Moulinet le 18/10 (DBo) et à Ganivet le 29/09 (RD).

GRÈBE JOUGRIS (*Podiceps grisegena*) – **H, exc.** - Aucune donnée.

GRÈBE ESCLAVON (*Podiceps auritus*) – **H, exc.** - Aucune donnée

GRÈBE À COU NOIR (*Podiceps nigricollis*) – **N exc., MH rare** - 3 fiches. 1 ind. le 12/09 à Charpal (RD), 1 le 29/09 à Ganivet (RD) et 1 le 16/11 à Naussac (ThC).

PETREL TEMPÊTE (*Hydrobates pelagicus*) – **Acc** – Cévennes 1999.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*) – **HM, comm.** - 194 fiches. Ce nombre élevé de fiches s'explique par la « pression » mise sur l'espèce depuis l'autorisation de tirs de régulation (cf. CR 2001). Noté tous les mois de l'année mais avec un creux accentué entre juin et août, mois inclus (entre 1 et 8 ind. transitent sporadiquement sur Naussac). En hivernage, les maxima relevés : 60 sur le dortoir des Rochettes (Tarn) le 20/01 (RD), 29 sur Villefort le 1^{er} Février (AFé), 68 sur Naussac le 28/02 (ThC). Une bande de 48 ind. survole le Lot au niveau de Montjézieux le 20/01 (PP) et un vol de 82 ind. sur le Tarn au-dessus de Florac le 21/01 (JF). Le comptage de mi-janvier a révélé un effectif max. de 130 ind. sur l'ensemble du département auquel on peut ajouter une 40aine d'oiseaux réguliers à cette période-là sur le Tarn aux confins Lozère-Aveyron (oiseaux regagnant vraisemblablement le soir un dortoir aveyronnais) (JBo, ThC, RD, JF, AFé, AJ, FLe, XP). Au passage de printemps, un max. de 120 ind. stationnent entre les 17 et 24/03 sur Naussac (ThC) ; c'est durant ce même mois que sont signalés des vols de migration ailleurs sur le département : 13 le 21/03 sur Ste Lucie (MiQ), 26 le 22/03 sur Chastel-Nouvel (SC), 14 le 24/03 au Point Sublime (FLe) et 9 le même jour sur St Bonnet-de-Chirac (RD) et encore 8 le 26/03 au Mazet (Lachamp) (RD). Les retours à l'automne s'amorcent vers la mi-septembre : 14 le 13/09 à Naussac (ThC) et le passage de troupes en vols est noté : 38 le 11/10 au Rozier (FLe), 23 le 29/10 sur la montagne du Goulet (SC, RyD) et 15 le 30/10 à Chastanier (Margeride) (RM). À mi-novembre les maxima d'hivernants en stationnement sont observés : 65 à Villefort le 15/11 (AFé), 92 le 17/11 et 97 le 28/11 à Naussac (ThC), 44 posés sur le Tarn au Rozier le 19/11 (FLe), 21 à Booz le 20/11 (FLe) et 40 sur le même site le 22/12 (RD). Concernant l'impact du Cormoran sur la faune halieutique, 13 captures pour 134 plongeurs sont signalés sur Pied-de-Borne au cours de l'hiver 2001-2002 (AFé) et les 15 seuls contenus stomacaux réalisés sur les 50 ind. tirés au cours de l'hiver 2001-2002 ont mis en évidence 9 oiseaux avec Cyprinidés, 3 avec Salmonidés et 3 vides (info CSP au comité départemental). L'arrêté préfectoral autorisant la régulation pour l'hiver 2002-2003 ne paraîtra que le 8 janvier 2003 avec un quota de 70 oiseaux à tuer. Pour l'anecdote, sur Villefort, 2 ind. bagués sont présents en novembre-décembre dont le fameux « 2K3 », apparu le 27/12/2001, encore présent le 24/01/2002... et qui est de retour le 15/11 ! Une origine danoise de

ces oiseaux est vraisemblable mais reste à confirmer (AFe, RD).

BUTOR ÉTOILÉ (*Botaurus stellaris*) – **M, exc.** – Aucune donnée. À noter pour curiosité l'observation d'un ind. le 27/05 posé sur un toit de Millau (P. d'Andurain). Comme quoi, il faut s'attendre à tout !

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*) – **M, exc.** - Mende 1982.

BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*) – **M, rare** - 4 fiches. 1 ind. du 02/04 au 06/04 à Auxillac pêchant dans un petit ruisseau (PP), 2 ind. paradent le 21/05 à Ganivet (RD), au moins deux oiseaux sont entendus de nuit à Brion sur l'Aubrac le 30/06 (ThC, FLe), enfin 1 le 10/11 à Ganivet (PaD). Il est possible que cette espèce niche en Lozère mais son rythme de vie crépusculaire et nocturne la rend difficile à détecter.

CRABIER CHEVELU (*Ardeola ralloides*) – **Err.** - 1 fiche. Seconde donnée lozérienne avec 1 ind. très probablement de cette espèce le 04/06 aux Vignes, criant de nuit (FLe).

HÉRON GARDEBOEUFS (*Bubulcus ibis*) – **Err.** - 1 fiche. Seconde observation lozérienne avec un oiseau perché sur un châtaigner le 18/03 à St Julien-d'Arpaon (BR).

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*) – **M, err., peu comm.** - 8 fiches. 1 ind. du 08 au 12/04 à Booz (JDC), 1 le 09/04 à Naussac (ThC), 1 du 28/04 au 30/04 à Naussac (ThC), 1 le 01/05 à Pied de Borne (AFe), 1 le 25/05 à Booz (XP),

GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*) – **Err., rare** - 12 fiches ! 1 ind. le 18/08 à Booz (T. Deana) et au même endroit du 08/09 au 01/10 (JDC). Ensuite, 1 le 02/11 à Charpal (ThC), 1 du 02/11 au 20/11 sur l'Aubrac entre les Salhiens et la plaine des Plêches (JL. Bibal, FLe). Enfin, 1 du 06/12 au 22/12 au Moulinet (PaD). Il est vraisemblable que plusieurs de ces observations concernent le même individu ayant pris ses quartiers d'automne en Lozère !

HÉRON CENDRÉ (*Ardea cinerea*) – **N loc., MH. comm.** - 193 fiches. Noté un peu partout en toutes saisons. Max de 23 le 19/10 à Booz (RD) et de 38 le 13/09 à Naussac (ThC). Nicheur à Naussac avec 5 nids le 02/07 : reproduction amenée à terme pour la première année (ThC). Pas d'autres informations concernant la reproduction notamment sur la petite colonie de Florac.

HÉRON POURPRÉ (*Ardea purpurea*) – **M, rare** - 3 fiches. 1 ind ; le 09/05 aux Vignes (FLe) et un autre les 20 et 21/05 à Ganivet (RD).

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) – **M, rég.** - 11 fiches. 21 oiseaux au total. Notée du 20/03, 4 oiseaux à St Pierre-des-Tripiers (Bertrand Lamothe) et 2 au Chastel-Nouvel (FLe), au 24/04, 1 au Born (JPM). Puis du 22/08 à Prinsuéjols (1 oiseau, XP) au 10/09 au Goulet (1 oiseau, SC). En automne, également 3 le 25/08 à Châteauneuf-de-Randon (Eric Guyon). À signaler l'observation estivale d'un individu sur l'Aubrac vers le col de Trébatut-La Rode le 21/06 (FLe). Une nidification dans ce secteur tout à fait favorable n'est pas exclue et une prospection assidue pourrait nous révéler une bonne surprise !

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) – **M, rég.** - 8 fiches. 15 oiseaux au total. Notée dès le 03/02 à Mende (1 oiseau ; Anne-Marie Lemonnier), puis le 14/02 encore à Mende avec 3 individus (Norbert Borson) et le 16/02 au Massegros (comm. à RD) avec 5-6 oiseaux. Ensuite 1 le 13/03 au Mazet (RD), le 14/04 à St Pierre-des-Tripiers (JPM) 28/04 au Malzieu (RD/Loïc Soulier) et le 08/05 au Veygalier, cause Méjean (FLe). Le passage pré-nuptial s'est donc déroulé sur plus de 3 mois ! seule donnée automnale : 1 le 01/10 à St Alban-sur-Limagnole (Jean L'Ecluse).

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) – **Err, acc.** Naussac 1992

FLAMANT ROSE (*Phoenicopterus ruber*) – **Err, acc.** – Charpal 1980, gorges du Tarn 1998.

CYGNE TUBERCULÉ (*Cygnus olor*) – **Introduit, loc.** - 1 fiche. 1 oiseau le 13/01 à St Chély-d'Apcher (MiQ), certainement « local ».

CYGNE DE BEWICK (*Cygnus columbianus*) – **M, exc.** – Naussac 1989.

CYGNE CHANTEUR (*Cygnus cygnus*) – **Acc.** – Naussac 1984.

OIE CENDRÉE (*Anser anser*) – **M, rare** - 3 fiches. 5 ind. du 14/12 au 16/12 à Naussac (ThC) constituent une des rares observations lozériennes d'oiseaux posés et en stationnement.

BERNACHE NONNETTE (*Branta leucopsis*) – **Acc** – Naussac 2000.

BERNACHE DU CANADA (*Branta canadensis*) – **Acc.** – Naussac 1998.

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*) – **Err, acc.** – Naussac 1985. 7 fiches. Plusieurs observations concernant le même ind., de la sous-espèce *bernicla* (originale de Russie, Sibérie occidentale), ayant séjourné du 26/04 au 06/05 à Naussac (ThC et coll.) ; il s'agit de la seconde mention lozérienne, à 930 m d'altitude et bien loin de ses habitats maritimes habituels !

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) – **MH rég.** - 11 fiches. Total de 22 oiseaux. À Naussac : 6 le 30/01, 1 du 17/03 au 24/03, 1 le 03/05, 1 le 16/11 puis 2 le 17/11 (ThC) et 2 le 20/12 (RM). Ailleurs : 1 le 17/02 et 6 le 11/12 à Pied-de-Borne (AFé), 1 le 25/03 au Moulinet (PaD) et 2 le 15/10 à Charpal (XP).

CANARD MANDARIN (*Aix galericulata*) – **Acc.** – Naussac 1990.

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) – **MH rég.** - 21 fiches. Naussac : noté en janvier-février puis à partir de septembre. Max de 119 le 10/12 (nouveau record lozérien) (ThC). Charpal : 10 le 21/09 (RD), 1 le 15/10 (XP) et 1 le 17/11 (RD). Vu également au Moulinet avec 4 oiseaux le 18/02 (DBo) et au Malzieu le 14/12 avec 2 oiseaux (MiQ).

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*) – **MH rég.** - 14 fiches. Toutes de Naussac avec un max. de 11 le 16/11 (ThC) à l'exception d'un oiseau tué à la chasse le 11/11 à Rieutort-d'Aubrac (JL. Bibal comm. à FLe).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*) – **N loc., MH comm.** - 17 fiches. Max de 35 ind. le 18/10 à Naussac (ThC). À noter 1 oiseau avec 2 Nettes rousses sur le Tarn aux Vignes le 30/01 (FLe), 1 le 27/08 et 20/11 aux Salhiens (FLe), 1 à Booz le 06/11 (Xavier Mortemard) et à Charpal 9 puis 4 les 12/09 et 21/09 et 1 le 11/11 (RD).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*) – **N loc., MH comm.** - 109 fiches. De loin le canard le plus commun : noté un peu partout tous les mois. Max de 278 le 13/09 à Naussac (ThC). Noté nicheur aux Vignes, à Charpal (11 couples, RD) et Naussac. Probablement nicheur sur l'Aubrac, le Lot et la Margeride, cependant nous n'avons pas reçu d'informations à ce sujet.

CANARD PILET (*Anas acuta*) – **MH rég.** - 3 fiches. 1 mâle le 03/03 à Charpal (RD), 1 couple le 20/11 à Naussac (ThC) et 1 autre le 24/11 à Charpal (RM).

SARCELLE D'ÉTÉ (*Anas querquedula*) – **N exc., M rég.** - 3 fiches. 4 mâles et 2 femelles le 08/04 à Charpal (RD, DBo) et 2 mâle et 1 femelle le 09/04 au même endroit (DBo, PaD) puis 1 le 27/08 aux Salhiens (FLe).

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*) – **MH rég.** 17 fiches. Absent du 28/04 au 13/09. Observé le reste du temps au lac du Moulinet, sur Charpal, Naussac, Booz et Pied-de-Borne. Max de 23 le 21/11 à Naussac (RM).

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*) – **MH, peu comm.** - 17 fiches. Vue de novembre à mars. Un petit passage fut décelé fin janvier avec des observations simultanées sur 3 sites le 30/01 : 5 au Moulinet (DBo, PaD), 2 aux Vignes sur le Tarn (FLe) et 2 à Naussac (ThC). Le reste des données provient de Naussac avec 12 ind. le 31/01. Stationnement d'un mâle du 12/02 (au moins) au 21/03 à Naussac (ThC).

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*) – **MH rég.** - 27 fiches. Noté à Naussac et Charpal uniquement avec des max. respectifs de 43 le 17/11 (ThC) et de 9 le 11/11 (RD).

FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*) – **M exc.** - Naussac 1983.

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*) - **MH rég.** - 13 fiches. Peu noté cette année. Toutes de Naussac avec un max de 7 en novembre-décembre (ThC) sauf 2 ind. le 05/10 aux Vignes sur le Tarn (FLe).

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*) – **H exc.** - 1 fiche. 1 ind. le 19/01 à Naussac (ThC).

EIDER À DUVET (*Somateria molissima*) - **MH exc.** - Aucune donnée.

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*) – **MH très rare** - Aucune donnée.

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*) – **MH rare** - Aucune donnée.

GARROT À ŒIL D'OR (*Bucephala clangula*) – **MH rare** - 11 fiches. 2 jeunes jusqu'au 06/03 à Naussac (ThC) ayant hiverné sur place. Puis retour à partir du 01/12 d'une femelle (ThC).

HARLE PIETTE (*Mergus albellus*) – **H exc.** - Naussac 1985.

HARLE HUPPÉ (*Mergus serrator*) – **MH rare** - 3 fiches. Un mâle le 07/01 à Naussac (ThC) puis 1 les 20 et 21/11 au même endroit (RM, AFe).

HARLE BIÈVRE (*Merganser merganser*) – **H rare** - 1 fiche. 1 femelle le 17/11 à Charpal (RD).

BONDRÉE APIVORE (*Pernis apivorus*) – **NM, ass. comm.** - 63 fiches. Premières le 26/04 aux Vignes avec 4 oiseaux en migration (FLe) et dernière le 20/09 au Goulet (SC). Nicheur certain au Mazet (RD) et St Germain-du-Teil (JDC). Max. de 248 le 27/08 au Signal de Mailhebiau en 45 minutes dont un groupe 66 (FLe).

ÉLANION BLANC (*Elanus caeruleus*) – **N? Acc.** - 1 fiche. 1 oiseau probablement de cette espèce le 16/08 à Cubières (Jean Séon). cette observation n'a pu être confirmée.

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) – **NM, ass. comm.** - 158 fiches. Premier le 27/02 en migration à St Georges-de-Lévêjac constitue la donnée la plus précoce jamais notée en Lozère et la première pour février (FLe). Un autre sera vu le lendemain 28/02 au Chastel-Nouvel (SC). Dernier le 12/09 à Charpal (RD). Maxima de 176 dans la journée le 24/03 au Point Sublime, St Georges-de-Lévêjac (FLe, BrunoGrindel), de 39 le même jour au Truc du Midi, Marvejols (RD), de 65 le 31/07 aux Bessons (MiQ), de 72 le 02/08 à St Germain-du-Teil (JDC, Jacqueline Solignac). Des indices de nidification proviennent uniquement de la Margeride.

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) – **NM(H) ass. comm.** - 194 fiches. Premier retour noté le 21/01 à St Chély-d'Apcher (MiQ). Dernier migrateur pré-nuptial le 24/03 à St Georges-de-Lévêjac (FLe, BrunoGrindel). Dès le mois de février des comportements territoriaux sont notés avec notamment des recharges d'aires. Maxima de 10 à 15 oiseaux vus ensemble. Des indices de nidification proviennent uniquement de la Margeride.

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE (*Haliaeetus albicilla*) – **Acc.** - Gorges du Tarn 1995 et 2001.

GYPAÈTE BARBU (*Gypaetus barbatus*) – **Acc.** - Le Massegros 1995 ?

VAUTOUR PERCNOPTÈRE (*Neophron percnopterus*) – **Estivant N, loc.** - 7 fiches. Premier le 21/03 au Rozier (FLe). Derniers le 27/08 à La Cresse (Aveyron, proche du Rozier) avec 2 adultes et 1 jeune né sur place (SC).

VAUTOUR FAUVE (*Gyps fulvus*) – **N séd., loc.** - 27 fiches. Hors secteurs caussenards habituels : 4 ind. en vol le 15/03 à Lachamp (RD), 1 le 31/03 à Rouffiac (AJ) et 2 le 15/05 à Langlade (ThC). La colonie est toujours en légère expansion comptant, cette année, une centaine de couples, 98 pontes et 66 jeunes à l'envol (Rapaces de France, suppl. n°5).

VAUTOUR MOINE (*Aegypius monachus*) – **N séd., loc.** - 15 fiches. Pas d'observations hors secteurs caussenards habituels. 5 ind. ont été relâchés cette année et la colonie compte entre 26 ind. (min. constaté) et 53 oiseaux (max. théorique) ; 10 couples présents, 8 pontes... et 3 jeunes ont pris leur envol (Rapaces de France, suppl. n°5).

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC (*Circaetus gallicus*) – **NM, comm.** - 144 fiches. Premier le 04/03 à St Martin-de-Boubaux (FB, JPM). Dernier le 06/10 à Brenoux (SC). Le contrôle de 97 sites de reproduction (pour une population départementale comprise entre 120 et 190 couples) a montré un taux de présence de 80,4 % qui en fait la plus « faible » année ; 29 poussins bagués cette saison et 4 observations d'oiseaux bagués de retour au « pays » (Lozère et départements limitrophes) âgés de 3 ans (1), 4 ans (2) et 7 ans (1) (JPM).

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) - **M rég.** - 22 fiches. Observé de plus en plus fréquemment en migration semble-t-il. Au printemps, entre le 19/03 et le 10/05 (15 individus). En automne, entre le 16/08 et 22/09 (19 individus). Max de 3 dans les journées du 28/04 à Villeneuve, cause Méjean (FLe/sortie ALEPE), de 3 les 03/09 et 10/09 à Belvezet sur la montagne du Goulet (SC/JBo) et de 5 en deux minutes le 16/09 au Massegros (FLe).

BUSARD SAINT-MARTIN (*Circus cyaneus*) - **NMH** - 100 fiches. Noté tous les mois sur tout le département. Pas d'indices de nidification sur les causses.

BUSARD CENDRÉ (*Circus pygargus*) – **NM** - 37 fiches. Semble de moins en moins noté, mais vu sur tout le département. Signe de régression ? Premier le 05/04 à Ispagnac (JPM, IM), une des données les plus précoces pour la Lozère. Dernier le 17/09 au Goulet (SC).

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) – **N séd., M** - 16 fiches. Toujours très discret, mais vu sur tout le département et toujours à l'unité sauf 2 le 26/06 au Chastel-Nouvel (SC). À noter l'observation originale d'un juvénile mangeant des orthoptères au sol en sautillant comme une poule sur le causse nu vers le Mont Gargo le 09/09 (FLe).

ÉPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) – **N séd., M** - 93 fiches. RAS. À noter un individu volant parallèlement à une voiture sur 400 m à la vitesse de 58 km/h (FLe). Attaques relevées sur des Pinsons des arbres, des Bergeronnettes printanières, des Hirondelles de fenêtre, des Mésanges à longue queue et même sur un Chevalier culblanc.

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) – **N séd., MH comm.** - 285 fiches. Notée partout en toutes saisons. Max. de 11 ensemble le 26/01 au Massegros (JDC). Premières parades dès fin janvier mais générales en mars. Des ind. en migration active sont notées en février et septembre-octobre surtout.

(***BUSE FÉROCE** (*Buteo rufinus*) – **Acc.** - 1 fiche. 1 ind., peut-être de cette espèce, le 10/06 près de Drigas (Méjean) (FrM). Cette observation n'a pu être confirmée.)

BUSE PATTUE (*Buteo lagopus*) – **Acc.** – Aigoual 1998.

(**AIGLE CRIARD** (*Aquila clangula*) – **Err. ?** - Gorges du Tarn 1934, 1954.)

AIGLE ROYAL (*Aquila chrysaetos*) – **N séd., loc.** – 53 fiches. Pas d'observation ailleurs que dans les secteurs habituels de l'espèce. 7 couples sont formés cette année mais pas d'information sur le bilan de reproduction.

AIGLE BOTTÉ (*Hierraetus pennatus*) – **N?, M** - 2 fiches. 1 ind. probable le 06/04 à Albaret-le-Comtal (XP) et 1 autre le 06/05 au Truc de la Caille près du Chastel-Nouvel se rapportent vraisemblablement à des couples locaux.

AIGLE DE BONELLI (*Hieraaetus fasciatus*) – **Err.** - 1 fiche. 1 subad. est vu chassant dans les gorges du Tarn au Point Sublime le 24/03, en fin de journée, lors de la fête de la migration (FLe).

BALBUZARD PÊCHEUR (*Pandion haliaetus*) – **M rég.** - 31 fiches. De plus en plus souvent noté, toujours à l'unité sauf 2 les 28 et 29/08 et 05/09 à Naussac (ThC) avec un total de 33 ind.. Au passage pré-nuptial : du 15/03 au Mazet (RD) au 26/05 à Ispagnac (SC). Au passage post-nuptial, du 19/08 à Naussac (ThC) au 18/09 aux Vignes (FLe). Il est possible qu'entre les 19/08 et 13/09, à Naussac, les observations correspondent à un seul et même individu en stationnement (ThC).

FAUCON CRÉCERELLETTE (*Falco naumanni*) – **Err. Acc. ?** – Méjean 1997 ?

FAUCON CRÉCERELLE (*Falco tinnunculus*) - **NMH comm.** - 169 fiches. Noté en toute saison, partout sur le département. Semble fuir les hauteurs en cas de neige trop épaisse mais y revient rapidement. Max. de 20 le 27/08 sur le signal de Malhebiau sur l'Aubrac (FLe). C'est sur ce secteur ainsi que sur les causses qu'il semble être le plus abondant.

FAUCON KOBEZ (*Falco vespertinus*) – **M rég. au printemps** - 4 fiches pour 6 oiseaux. 1 femelle de second été le 08/05 à Barre-des-Cévennes (camp ALEPE), 1 mâle et deux femelles le 17/05 à Drigas (FrM), 1 mâle le 01/06 au Villaret, cause Méjean (FLe) et 1 mâle seconde année le 03/06 au Mas-St André, cause Méjean (JF).

FAUCON ÉMERILLON (*Falco columbarius*) - **MH rég.** - 9 fiches. Jusqu'au 29/04 au cirque de St Marcellin (gorges du Tarn) chassant des Hirondelles de rochers (FLe) puis à partir du 02/10 sur le Méjean (FLe). Également noté le 12/01 à Booz en chasse sur une Bergeronnette grise (RD), le 27/02 au Point Sublime (FLe) en chasse sur des pinsons et le 24/03 au même endroit en migration (FLe), le 07/03 à Palhers (DBo, PaD), le 14/04 à Charpal (RD), le 21/04 au Massegros (FLe) et le 20/11 à Nasbinals (FLe). Un tiers des données se situe en avril.

FAUCON HOBÉREAU (*Falco subbuteo*) - **NM** – 19 fiches. Premier très précoce le 04/04 sur le Méjean (Marc Forschler & Jürgen Klager) et dernier le 30/09 (RyD, SC). En période de nidification, noté sur le Causse de Sauveterre, aux Vignes, à Chanac, à Drigas et à Naussac.

FAUCON D'ÉLÉONORE (*Falco eleonora*) – **M, err.** – Aucune donnée.

FAUCON SACRE (*Falco cherrug*) – **Acc.** – Mont Aigoual 1999.

FAUCON LANIER (*Falco biarmicus*) – **Acc.** – Aubrac 1995 (origine sauvage douteuse).

FAUCON PÈLERIN (*Falco peregrinus*) – **N séd., MH** - 43 fiches. Envol de jeunes (3 ou 4) le 28/05 pour le couple de Barjac (XP). Pas noté en nord Lozère en dehors des gorges de la Truyère. Toujours pas de reproduction à Naussac où seul un immature est vu le 25/10 (ThC). Une seule observation hors secteurs usuels d'un oiseau le 29/10 sur la montagne du Goulet (RyD, SC).

GÉLINOTTE DES BOIS (*Bonasa bonasia*) – Réintroduite, rarissime, disparue ? – Aucune donnée.

TÉTRAS-LYRE (*Tetrao tetrix*) – Réintroduit, disparu. – Aucune donnée.

GRAND TÉTRAS (*Tetrao urogallus*) – Réintroduit, loc. – 2 données. 1 ind. à l'Est du Pont-de-Montvert le 12/04 (Marc Forschler & Jürgen Klager) et 1 femelle le 25/09 au col de la Caumette, Mont Aigoual, limite Gard-Lozère (FLe).

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) – **N séd.** - 26 fiches. Notée principalement sur les causses mais quelques données de la Margeride jusqu'à 1200 m d'altitude à Rieutord-de-Randon le 26/05 (RD) et au Chastel-Nouvel le 26/05 (SC). Les oiseaux sont le plus souvent notés par paire ; plus grosse compagnie vue : 8 ind. le 17/09 à Vébron (FLe).

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) – **N séd.** - 6 fiches. 2 à Malbouzon le 06/04 (RM), 2 le 20/05 à Naussac (ThC), 8 oiseaux (1 couple + au moins 6 juvéniles) le 06/08 à Marchastel (MiQ), rare preuve de nidification lozérienne et première sur l'Aubrac, 4 le 22/08 à Prinsuéjols (MiQ), 2 le 25/08 au sommet de Finiels (FLe/XP, BG) et 5 juvéniles le 28/11 à Rieutord-de-Randon (RD). Les oiseaux du Mont Lozère se rapportent à la sous-espèce de montagne. Qu'en est-il des oiseaux de l'Aubrac et de la Margeride ? Sont-ils issus de probables lâchers ou appartiennent-ils à la même sous-espèce que l'on ne trouve en France que dans les Pyrénées et en Lozère ?

CAILLE DES BLÉS (*Coturnix coturnix*) - **NM** – 19 fiches. Première le 09/05 à Chanet (Méjean) et dernière le 31/08 sur le Sauveterre (FLe). Peu notée cette année. Petite année ou inattention des observateurs ?

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) – **N loc, introduit** - 3 fiches (contre 35 en 2001 !). 1 le 26/03 et 27/03 au Cellier-du-Luc (Ardèche) et Génolhac (Gard) (ThC) et 1 mâle le 08/05 à Ispagnac (JBo).

RÂLE D'EAU (*Rallus aquaticus*) – **N loc?, M trans.** - 1 fiche. 2 ind. détectés au cri au lac des Salhiens le 27/08 (FLe). Cette espèce est peut-être plus fréquente qu'on ne le suppose, localement sur l'Aubrac... Plus d'attention dans les secteurs favorables pourrait se révéler très instructive sur le statut de cette espèce en Lozère.

RÂLE DES GENÊTS (*Crex crex*) – **N loc?, M rare** – Aucune donnée. Une prospection menée sur le secteur de l'Aubrac où il fut entendu l'année précédente ne donna rien (ThC, FLe). Cependant, il est possible qu'il soit encore présent localement.

MARQUETTE PONCTUÉE (*Porzana porzana*) – **M rare** – Aucune donnée.

MARQUETTE POUSSIN (*Porzana parva*) – **M très rare** - Aucune donnée.

MARQUETTE DE BAILLON (*Porzana pusilla*) – **M très rare** - Aucune donnée.

GALLINULE POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) – **N loc., M** - 9 fiches. Notée aux Vignes, à Ganivet, à Cultures, Mende et Booz sur le Lot, avec 8 oiseaux le 01/10 dont des juvéniles (RD).

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) – **N loc., MH** – 47 fiches. 1 le 15/10 à Charpal (RM) ayant un cou blanc, qui sera revue jusqu'au 01/12 au moins à Naussac et 1 le 27/11 à Barrandon (SC). Toutes les autres données proviennent de Naussac : max de 574 le 01/11 (ThC, XP). Seulement 3 ind. notés pour le comptage Wetlands de la mi-janvier (ThC). Nicheuse sur ce site avec 6 juv. et 3 poussins le 04/08 (DaM) pour un nombre de couple inconnu.

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*) – **M irrég.** - 4 fiches. Un vol est entendu le 15/02 au recoux (JP. Grigeul/RD), 1 vol d'une soixantaine le 17/02 à Marvejols (Hervé Alla), 50-60 le 19/02 au même endroit (JC. Chazalmartin) et deux vols de 30 environ le 24/02 à St Martin-de-Born (Claude Lhuillier).

OUTARDE CANEPETIÈRE (*Tetrax tetrax*) – **N disparue, M?** – 4 fiches. 2 femelles furent notées le 10/04 à Champerboux (William Mathot) sans suite. 1 mâle chanta à Chanet du 08/05 au 12/05 (Bertrand Piques, FLe) sans suite là non plus.

GRANDE OUTARDE (*Otis tarda*) – **Acc.** – Lozère XIX^e siècle.

HUÎTRIER PIE (*Haematopus ostralegus*) – **Acc.** – Naussac 1985.

ÉCHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*) – **NM exc.** - 3 fiches. 9 ind. le 08/04 à Charpal (RD, DBo), 2 à Barrandon le 17/04 (JPM) et 2 le 16/06 à Naussac (DaM).

AVOCETTE ÉLÉGANTE (*Recurvirostra avosetta*) – **M exc.** - 4 fiches. 5 ind. puis 12 les 20 et 21/03 à Naussac, 4 le 15/10 à Charpal (XP) et 2 le 01/11 à Naussac (XP, ThC). Rappelons que la seule donnée lozérienne jusqu'alors datait du 23/04/2001 à Ganivet (FLe).

OEDICNÈME CRIARD (*Burhinus oediconemus*) – **N loc., M** – 13 fiches. Premiers, 2 le 08/04 à Hures (Marc Forschler & Jürgen Klager) et derniers, 2 ind. le 19/09 à Drigas (FLe), cause Méjean. Noté également sur la cause de Sauveterre.

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*) – **N loc., M** – 13 fiches. Noté du 14/04 au 13/09, à Naussac (DaM et ThC). Max. d'une quarantaine le 20/08 sur ce site (RM), record lozérien. Nicheur probable à Naussac où il est observé toute la saison sans preuve toutefois et aux sablières d'Usanges où un oiseau alarme le 29/06 (ThC, FLe).

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*) – **M rare** – 2 fiches. Une dizaine le 20/08 à Naussac (RM), record lozérien, puis 1 le 25/08 au même endroit (DaM).

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrinus*) – **Acc.** – Naussac 1983.

PLUVIER GUIGNARD (*Charadrius morinellus*) – **M, assez comm. local.** - 27 fiches. 68 oiseaux signalés au total. Premières données lozériennes pour le passage de printemps avec 14 oiseaux le 28/04 au Mt Gargo (FLe, sortie ALEPE), plus gros groupe pré-nuptial observé en France depuis 1927, puis à nouveau 1 le 01/05 au Serre de Fourcat (FLe). À l'automne, noté du 17/08 au Mt Gargo avec 1 femelle (FLe) au 25/09 au même endroit avec 4 ind. (FLe). À noter : 3 oiseaux le 01/09 aux Valadous, en Ardèche près de la Lozère, nouveau site (ThC).

PLUVIER DORÉ (*Pluvialis apricaria*) – **M rare** - 1 fiche. 1 ind. le 16/11 à Chanet (FLe).

PLUVIER ARGENTÉ (*Pluvialis squatarola*) – **M rare** – Aucune donnée.

VANNEAU HUPPÉ (*Vanellus vanellus*) – **N loc., MH peu comm.** - 33 fiches. Toujours peu noté en Lozère mais deux observations originales : une bande de 200 ind. aux Bondons (record numérique pour la Lozère) le 25/02 (Muriel Pascal) et de 40 ind. à Ispagnac le 27/02, en migration, attaqués par un Faucon pèlerin (JPM, IMa). Nicheur aux sablières d'Usanges avec 1 juv. observé le 29/06 (ThC, FLe) et probablement autour de Naussac où l'espèce est notée tout le printemps et l'été (ThC).

BÉCASSEAU MAUBÈCHE (*Calidris canutus*) – **M très rare** - Aucune donnée.

BÉCASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) – **M exc.** – 1 fiche. Troisième donnée lozérienne d'un oiseau le 25/08 à Naussac (DaM). Cette espèce est rare à l'intérieur des terres.

BÉCASSEAU MINUTE (*Calidris minutus*) – **M rare** - 5 fiches. Petit passage fin août à Naussac uniquement : 7 ind. le 20/08 (RM), 1 le 25/08 (DaM), 1 juv le 27/08 (ThC) puis 4 et 5 les 28 et 30/08 (ThC).

BÉCASSEAU DE TEMMINCK (*Calidris temminckii*) – **M exc.** - Naussac 1991.

- BÉCASSEAU COCORLI** (*Calidris ferruginea*) – **M rare** - 3 fiches. 3 ind. le 25/08 (DaM) puis 6 les 27 et 28/08 à Naussac, nouveau record lozérien (ThC).
- BÉCASSEAU VARIABLE** (*Calidris alpina*) – **M rég.** - 5 fiches. 10 ind. le 21/03 à Naussac (ThC) puis fin août au même endroit : 10 le 20/08 (RM), 9 le 25/08 (DaM), 1 puis 2 les 28 et 30/08 (ThC).
- COMBATTANT VARIÉ** (*Philomachus pugnax*) – **M rég.** - 10 fiches. Max. à Charpal avec 10 oiseaux le 28/04 (RD, ThC) et 5 à Naussac le 19/05 (ThC). Vu aussi aux Bessons, 1 ind. le 31/07 (MiQ) et à Usanges, 1 ind. le 27/08 (FLe).
- BÉCASSINE SOURDE** (*Lymnocyptes minutus*) – **MH rare** - Aucune donnée.
- BÉCASSINE DES MARAIS** (*Gallinago gallinago*) – **N loc?, M comm., H rare** - 6 fiches. Cette espèce est complètement sous-détectée notamment sur l'Aubrac et la Margeride où elle est souvent tuée à la chasse. Notée au Moulinet, aux Bessons, à Naussac et à Nasbinals.
- BÉCASSINE DOUBLE** (*Gallinago media*) – **M exc.** - Aucune donnée.
- BÉCASSE DES BOIS** (*Scolopax rusticola*) – **N loc., MH** - 6 fiches. Cette espèce également est sous-détectée par les naturalistes mais pas par les chasseurs qui en tirent un assez grand nombre sur tous les massifs de Lozère. Notée en croûle au truc de la Caille, montagne de la Boulaine, le 11/06 (FLe). Également en vol crépusculaire concernant probablement des locales à St Denis-en-Margeride le 05/09 (JBo).
- BARGE À QUEUE NOIRE** (*Limosa limosa*) – **M exc.** - 1 fiche. Quatrième donnée lozérienne d'un oiseau le 09/04 au lac du Moulinet (DBo/PaD).
- BARGE ROUSSE** (*Limosa lapponica*) – **M exc.** - Naussac 1987, 1991.
- COURLIS CORLIEU** (*Numenius phaeopus*) – **Acc.** - Aucune donnée.
- COURLIS CENDRÉ** (*Numenius arquata*) – **N loc., M rare** - 13 fiches. 1 rare donnée hivernale d'un oiseau le 25/11 à Naussac (ThC). Sinon, observé seulement sur l'Aubrac où il est un nicheur peut-être en légère expansion. Les deux premiers sont vus le 24/03 à Malbouzon (MiQ). Des comportements territoriaux ou agressifs attestent de sa nidification quasi-certaine vers Malbouzon, Nasbinals, le lac du Born, les sablières d'Usanges et Brion. Population autour de 10-15 couples ? Un recensement exhaustif serait du plus grand intérêt.
- CHEVALIER ARLEQUIN** (*Tringa erythropus*) – **M rég.** - 1 fiche. 2 ind. le 25/08 à Naussac (DaM).
- CHEVALIER GAMBETTE** (*Tringa totanus*) – **M rég.** - 9 fiches. Noté à Naussac avec un max. de 4 ind. le 26/04 (ThC) et de 3 le 25/08 (DaM) et à Charpal avec un max. de 3 ind. le 28/04 (RD, ThC).
- CHEVALIER ABOYEUR** (*Tringa nebularia*) – **M rég.** - 6 fiches. 1 ind. le 14/04 à Naussac, 4 le 28/04 à Charpal (RD, ThC) puis à Naussac : 5 le 20/08 (RM), 1 le 25/08 (DaM), 7 le 23/08 (DaM) et 4 le 01/09 (ThC).
- CHEVALIER CULBLANC** (*Tringa ochropus*) – **M rég.** - 15 fiches. Noté en mars-avril : premier le 03/03 au Moulinet, dernier le 10/04 à Ganivet (DBo, PaD). En estivage, 1 le 29/06 à Usanges (FLe/ThC), 5 en migration aux Bessons le 31/07 (MiQ), 2 le 25/08 à Naussac (DaM) et 2 le 27/08 à Usanges (FLe).
- CHEVALIER SYLVAIN** (*Tringa glareola*) – **M rég.** - 7 fiches. 1 ind. les 01 et 09/04 à Ganivet (RD), puis à Naussac entre le 25/08 et 05/09 avec 1 à 2 oiseaux (DaM, ThC, RM).

CHEVALIER GUIGNETTE (*Actitis hypoleucos*) – **N loc., M rég. comm.** - 35 fiches. Noté du 06/04 à Albaret-le-Comtal (XP) au 05/09 à Naussac (ThC). Nicheur possible sur le Tarn aux Vignes, aux lacs du Moulinet et de Ganivet et vers Nasbinals où il y a là le meilleur indice avec un couple paradant le 28/04 (JDC).

LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarina*) – **Acc.** – Mont Lozère 1999.

TOURNEPIERRE À COLLIER (*Arenaria interpres*) – **M exc.** – Naussac 1984, 1989, 1993.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE (*Larus melanocephalus*) – **Acc.** – Naussac 1983.

MOUETTE PYGMÉE (*Larus minutus*) – **M peu comm.** - 6 fiches. 1 ind. le 25/04 (?) à Naussac (DaM, ThC) et 12 ensemble le lendemain, record lozérien, (ThC), 2 le 28/04 à Charpal (RD, ThC) puis à l'automne, 2 le 15/10 à Charpal (XP) et 2 le 01/11 à Naussac (ThC, XP) et 5 le 10/12 (ThC).

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) – **N irrég., MH rég.** - 26 fiches. Notée de février à décembre, sporadiquement à Naussac : max. de 52 le 20/03, de 39 le 09/04 et de 24 le 01/11 (ThC). Seule donnée extérieure à ce site : 1 ind. le 12/12 à Pied-de-Borne (AFé).

GOÉLAND D'AUDOUIN (*Larus audouinii*) – **Acc.** – Naussac 1986.

GOÉLAND CENDRÉ (*Larus canus*) – **H très rare** - 2 fiches. 1 ind. le 16/06 puis 2 le 08/12 à Naussac (DaM).

GOÉLAND BRUN (*Larus fuscus*) – **M err.** - 1 fiche. 1 ind. le 03/07 à Naussac (ThC).

GOÉLAND ARGENTÉ (*Larus argentatus*) – **M Err.** - Aucune donnée.

GOÉLAND LEUCOPHÉE (*Larus michaellis*) – **N loc., MH** - 127 fiches. Il y a une très nette augmentation des observations de cette espèce en Lozère (56 fiches en 2001). Noté régulièrement sur le Tarn entre Les Vignes et le Rozier (1 à 3 oiseaux), à Naussac où il niche avec 5 nids et 9 juv. produits (ThC) et à Charpal (1 à 5 oiseaux). Max. de 75 le 03/07 à Naussac (ThC). Observé également, à l'unité, à Booz sur le Lot le 23/01 (DBo), à Rimeize avec 2 ind. le 12/12 (MiQ), en migration le 17/09 au Goulet (SC), aux Bessons avec 1 ind. le 30/07 (MiQ), en migration au Chastel-Nouvel avec 8 oiseaux le 15/04 (SC) et à Luc le 24/03 avec 9 oiseaux (ThC). En fait, cette espèce est susceptible d'être rencontrée partout au cours de ses migrations et/ou pérégrinations et le sera certainement de plus en plus.

GOÉLAND MARIN (*Larus marinus*) – **Acc.** – Naussac 1983.

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) – **Acc.** – Aigoual 1975, Florac 1984.

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*) – **Err.** - Aucune donnée.

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*) – **M rare** - 1 fiche. 1 ind. le 03/05 à Charpal (RD).

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*) – **Exc.** - Aucune donnée.

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybridus*) – **M peu comm.** - 1 fiche. 4 ind. le 26/04 à Naussac (ThC).

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) – **M rég.** - 8 fiches. Première le 01/05 aux Vignes (FLe). À Charpal, 1 le 15/05 (FLe). Le reste des observations provient de Naussac : 1 le 03/05 (ThC), 8 le 16/06 (DaM), 4 le 20/08 (RM) puis 1 juvénile du 28/08 au 01/09 (ThC).

PIGEON BISET (*Columba livia*) – **N? très rare en milieu rupestre naturel** - 3 fiches. 3 ind. le 28/01 à Pied-de-Borne (AFé), 2 le 20/03 en migration au Chastel-Nouvel (FLe) et 1 le 14/05 au Massegras (FLe)

tous apparement sauvages.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) – **NM, peu comm.** - 13 fiches. Noté sur les causses avec des indices de nidification, mais également chanteur le 08/04 à Lanuéjols (JPM, IMa). Un couple nicheur probable aussi le 02/06 à Lachamp (RD). Pour le reste, les données concernent quelques individus isolés en migration.

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) – **NM, ass. comm.** - 105 fiches. Premier chant le 24/02 au Mazet (RD) et premier migrateur le 28/02 au Chastel-Nouvel (SC). Max. de 79 en migration en trois groupes le 20/03 sur ce même site (FLe). En automne, max. de 45 le 21/10 sur le Ventalon (Jean Demolder). Pas d'indice de reproduction communiqué.

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) – **N séd.** - 17 fiches. Max. de 28 le 14/12 à Lanuéjols (FLe). Cette espèce est très peu notée bien que commune, voire abondante, dans presque toutes les villes et villages !

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) – **N? loc., M peu comm.** - 7 fiches. Première le 06/05 à Palhers (StC) et dernière le 02/09 au Massegros (FLe). Nicheuse probable au Massegros, à Lachamp et à Hures. Cette espèce doit facilement passer inaperçue. Il serait intéressant d'y prêter plus d'attention en période de nidification notamment.

COUCOU-GEAI (*Clamator glandarius*) – **Estivant N loc.** - 4 fiches. 1 ind. le 08/04 à Hures (Marc Forschler & Jürgen Klager), 1 le 12/06 sur le Méjean au-dessus de Florac (Jbo, SC, JF) se nourrissant de chenilles, 1 juv le 24/06 à la carrière de Drigas (FrM) et 1 le 10/07 au même endroit (SC) ; le juv. observé est très certainement né sur le causse Méjean.

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) - **NM comm.** - 73 fiches. Premiers le 21/03 à Nivoliers migrant (Bertrand Lamothe) et dernier contact le 21/06 au Mazet (RD). Aucune donnée postérieure ! Premier chanteur le 01/04 à Villefort (XP). Seulement 2 phases rousses sont notées, mais il est vrai que la couleur est rarement spécifiée.

EFFRAIE DES CLOCHERS (*Tyto alba*) – **N séd., peu comm.** - 6 fiches (contre 15 en 2001). 1 ind. le 08/01 au col de Trébatut (record altitudinal ?) (JDC), 1 le 15/02 et 29/03 au Massegros (SC), 1 le 19/02 à Marvejols (DBo), 1 le 30/04 au Domal (Laval-du-Tarn) (FLe) et 1 le 23/05 à Lachamp (SC). Qu'en est-il réellement de la nidification de cette espèce ?

PETIT-DUC SCOPS (*Otus scops*) - **NM** - 13 fiches. Premier trouvé mort le 24/03 à Cros-Garnon sur le Méjean et 2 derniers le 17/09 (nouvelle date record) à Caussignac sur le Méjean dont un se cogne dans la voiture du naturaliste qui ne roulait pourtant pas vite, ayant manqué d'en cogner un 200 mètres plus tôt, (FLe) ! Hors causse, il est noté à St Julien-d'Arpaon le 27/04 (JPM), le 06/05 à Chanac (JBo) et un possible vers le 15/06 à St Alban-sur-Limagnole (JBo).

GRAND-DUC D'EUROPE (*Bubo bubo*) – **N séd.** - 14 fiches. Noté à St Léger-de-Peyre, Marvejols, Palhers, St Bonnet-de-Chirac, Ste Enemie, Barre-des-Cévennes où 1 ind. est trouvé électrocuté le 11/03 (JP. Baudoin/XP), Lanuéjols, St Bauzile et Brenoux. Pas de donnée de reproduction.

CHEVÊCHE D'ATHÉNA (*Athene noctua*) – **N séd. peu comm.** - 25 fiches. Notée à Marvejols, Prinsuéjols (jusqu'à 1260 m), Hures, Marchastel, Malbouzon, Vébron, le Chastel-Nouvel et Brenoux. La population aubracoise semble assez dynamique car bien qu'il y ait peu de rapports d'observations de ce secteur, toutes espèces confondues, les Chevêches sont bien notées. En revanche, les données caussenardes se font de plus en plus rares.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) – **N séd., comm.** - 29 fiches. Premier chant le 26/01 à Chanac (XP).

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) – **NMH** - 13 fiches. Noté nicheur à Cros-Garnon, St Jean-La Fouillouse, Rimeize avec 3 juv. le 09/06 (MiQ), Mende avec 3 juv. le 11/06 (FLe), Naussac (2 couples) (ThC, JBo) et Grandrieu (restes d'1 juv. mort le 11/07) (JBo).

HIBOU DES MARAIS (*Asio flammeus*) – **N exc., M rare** - 2 fiches. 1 ind. le 21/02 aux Ayguières (causse de Sauveterre) (XP) et 1 le 26/05 à Chanet (FrM).

CHOUETTE DE TENGMALM (*Aegolius funereus*) – **N séd loc.** - 6 fiches. 1 chanteur le 27/02 au Finiels (Ch. Nappée), les autres données sont du Cheylard-l'Évêque où un oiseau chante du 28/02 au 22/03 au mois (ThC).

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) – **NM, ass. comm.** - 21 fiches seulement. Premier le 25/04 à Pied-de-Borne (AFe), les 2 derniers le 19/09 à Rouveret sur le Méjean (FLe) constitue une nouvelle date record. Dernier chant le 09/07 à Florac (RyD).

MARTINET NOIR (*Apus apus*) – **NM, comm.** - 71 fiches. Premier le 21/04 à Chanac (XP) et arrivage massif les 25 et 26/04 dans toute la Lozère quasiment. Dernier le 07/09 à Marvejols (RD). Max. de 2000-3000 au Mont Aigoual le 26/06 (FLe). En outre, en juin et juillet des oiseaux sont observés par centaines montant du sud le matin et redescendant du nord le soir pour se nourrir. Ce phénomène concerne aussi bien des oiseaux de Mende allant se nourrir sur la Margeride que des oiseaux des Cévennes ou des plaines montant sur les causses ou plus loin (FLe).

MARTINET ALPIN (*Apus melba*) - **N loc., M** - 19 fiches. Premier le 15/03 au Rozier, date la plus précoce notée à ce jour (FLe) et 8 derniers le 17/09 aux Vignes (FLe). Observé principalement dans les gorges du Tarn et de la Jonte. Mais vu également à Langogne avec 6 ind. et 12 ind. en migration les 20 et 21/08 (RM, ThC), 1 le 23/08 au Goulet en migration (FLe). Max. de 33 le 23/05 au Rozier (FLe).

MARTIN PÊCHEUR (*Alcedo atthis*) – **N, trans.** - 19 fiches. Vu sur le Lot, Le Tarn, certains gardons cévenols, la Rimeize, au Malzieu, aux Bessons, à Chambon-le Château, où il est rarissime, et à Ganivet. Aucune observation de l'Allier et de Naussac !

GUÊPIER D'EUROPE (*Merops apiaster*) - **M rare** - 3 fiches. 5 ind. le 06/05 à Ispagnac (Paula et Hermann Hubes), 3 le 13/05 à St Pierre-des-Tripiers (R. Juillard) et une 20aine au Pic Cassini le 07/09 (AFe).

ROLLIER D'EUROPE (*Coracias garrulus*) – **M très rare** - 1 fiche. 1 ind. le 03/09 à Prévenchères (Grégory Garrel). Il est dorénavant d'occurrence annuelle.

HUPPE FASCIÉE (*Upupa epops*) – **NM, peu comm.** - 34 fiches. Première le 12/03 à Varazoux (JPM, IMa). Dernière notée le 13/06 à St Georges-de-Lévejac (FLe). Qu'en est-il de l'été ? Max. de 7 contacts le 13/05 aux Ayguières vers Chanac (XP) et de 3 le 02/06 à Sauveterre (RD). Elle semble vraiment en régression, de moins en moins de contacts sont établis et seulement notée sur les causses ou les gorges.

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*) – **NM, peu comm.** - 20 fiches. Premier contact le 04/04 au Pont-de-Montvert (Marc Forschler & Jürgen Klager) et dernier le 07/07 à Rocles en Margeride (RM). Dernier chant le 03/07.

PIC CENDRÉ (*Picus canus*) – **Acc.** - Meyrueis 1993.

PIC VERT (*Picus viridis*) – **N séd.** - 87 fiches. Espèce commune et omniprésente. Une donnée de reproduction : tambourinage le 04/04 à Ste Hélène d'un mâle qui attire la femelle (RM) !

PIC NOIR (*Dryocopus martius*) - **N séd.** - 36 fiches. Une loge est trouvée à Aumont-Aubrac à 1100 m (MiQ). Noté partout avec une certaine prédominance pour la Margeride.

PIC ÉPEICHE (*Dendrocopos major*) - **N séd.** - 43 fiches. Premier tambour à Pratnau près de Banassac le 04/01 (RD) et dernier le 01/04 à Ganivet (RD). Omniprésent.

PIC MAR (*Dendrocopos medius*) - **N? très rare** - Aucune donnée.

PIC ÉPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) - **N séd. peu comm.** - 8 fiches. Noté à Ste Hélène, Lachamp, Marvejols et Laval-Atger. Tambourinements notés dans un noyer au Mazet du 18/03 au 14/05 (RD). Probablement sous-défecté.

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*) - **N loc. rare** - Aucune donnée.

COCHEVIS HUPPÉ (*Galerida cristata*) - **Exc.** - Aucune donnée.

ALOUETTE LULU (*Lulula arborea*) - **NM, H rare** - 50 fiches. Première au Mazet le 28/01 (RD) et premier chant le 10/02 au même endroit (RD). En hivernage probable : 9 le 24/12 sur le Poujoulet au-dessus de Marvejols (RD).

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) - **NM, H rare** - 69 fiches. Premier chant le 26/02 au Bougès (ThC) et dernier le 06/07 à La Parade (RyD). En migration : plus de 50 le 24/03 au Point Sublime (FLe) et 114 en 2 h 15 le 06/11 au Goulet (FLe).

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) - **M rare** - 2 fiches. 3 ou 4 ind. le 09/04 à Ganivet (RD) et 3 le 23/08 en migration au sommet de Finiels (FLe).

HIRONDELLE DE ROCHERS (*Hirundo rupestris*) - **NM** - 61 fiches. 2 premières le 01/02 à Mende (RD) et dernière le 22/10 au Rozier (FLe). À noter la présence hivernale, à 20 km de la Lozère à Millau, de 5 à 10 oiseaux le 04/01 (RD). Max de plus de 100 le 10/10 au Rozier (FLe).

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) - **NM, comm.** - 125 fiches. Première le 10/03 à Pied-de-Borne (AFe) et dernières le 24/10 sur le Goulet (SC), nouvelle date record. Notée encore en migration pré-nuptiale le 15/05 au Chastel-Nouvel avec 20 oiseaux par heure pendant 4 heures (FLe). Dernière nichée avec envol des 3 jeunes le 17/09 au Tensonnieu (RD/JPG). Max. de plus de 500 le 01/10 à Booz (RD).

HIRONDELLE ROUSSELINÉ (*Hirundo daurica*) - **Exc.** - Meyrueis 1979.

HIRONDELLE DE FENÊTRE (*Delichon urbica*) - **NM, comm.** - 72 fiches. Les 2 premières dès le 14/03 à Balsièges (RyD) et les 4 dernières le 24/10 au Goulet (SC), nouvelle date record pour l'automne. Rarement notée en grands groupes sauf plusieurs de 150 environ aux Vignes et au Rozier en septembre, notamment par reliefs « bouchés » et temps pluvieux ; on peut penser que ce sont là des migrants bloqués temporairement (FLe).

PIPIT ROUSSELINÉ (*Anthus campestris*) - **NM, comm. loc.** - 28 fiches. Premier le 24/04 à Chanet (FLe) et dernier le 02/10 au Mont Gargo (FLe), cause Méjean. Nourrissage observé le encore 13/08 au Buffre (Méjean) (RD, StD).

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) - **NM, comm.** - 28 fiches. Peu noté alors qu'omniprésent. Premier le 31/03 au Mazet (RD) et dernier le 20/10 au Goulet (SC, ThC). Premier chant le 20/04 au Mazet (RD) et dernier chant le 13/06 au Chastel-Nouvel (SC).

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) - **NM, H rare** - 43 fiches. Non noté en janvier et février ce qui est étonnant. Premier le 03/03 à Ganivet (RD). Noté nicheur sur l'Aubrac, la Margeride et la cause de Sauveterre. Max. de 50-60 le 15/03 au-dessus de Marvejols (RD).

PIPIT À GORGE ROUSSE (*Anthus cervinus*) – **M rare - 1 fiche.** 1 ind. le 16/05 à Drigas au bord de la route (R. Juillard). Cette espèce est probablement d'occurrence annuelle mais sous-détectée. Une bonne connaissance de son cri apporterait certainement plus de données chaque année.

PIPIT SPIONCELLE (*Anthus spinoletta*) – **N loc., MH peu comm.** - 7 fiches seulement. Qu'en est-il des oiseaux nicheurs du Mont Lozère et de l'Aubrac ? Noté à Ganivet au passage avec un max. de 20 le 1^{er} avril (RD) ainsi qu'à Naussac et sur le Méjean.

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*) - **N loc., M peu comm.** - 19 fiches. Les 3 premières le 26/03 au Moulinet (DBo, PaD), les 9 dernières le 24/09 à Gatuzières dans un labour (FLe). Max. de 70-80 à Gally (Méjean) derrière un tracteur le 09/09 (FLe). Nicheuse au lac des Salhiens où un oiseau avec une becquée est noté le 29/06 (ThC, FLe). La sous-espèce *thunbergi* est notée une fois avec certitude le 24/04 au Mont Gargo (FLe) et la sous-espèce *flavissima* est supposée le 14/04 à Naussac avec 2 ind. (ThC, DaM). Au passage, l'espèce fréquente les bords des plans d'eau, les labours et les troupeaux.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) – **N séd., trans.** - 29 fiches. Sous-notée car omniprésente. Des nourrissages sont notés en juin dans divers secteurs du département.

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) – **NM comm., H rare** - 73 fiches. Notée en hiver, dès le 12/01, au plan d'eau de Booz, au Mazet (à 1000 m), au Rozier et à Chambon-le-Château. Une arrivée notable de migratrices est décelée dès fin février, s'accroissant dans les premiers jours de mars. Un second mouvement, postnuptial, est nettement perceptible en octobre. Max. de 80-100 le 10/03 à Lachamp (RD) se nourrissant sur un labour.

CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) - **N séd, trans.** - 61 fiches. Noté sur tous les cours d'eau. Certainement le chanteur le plus précoce puisqu'il commence à chanter en novembre voire fin octobre. Parade notée le 13/12 aux Vignes (FLe). Des juvéniles volants sont observés dès le 27/04 au Rozier et aux Vignes (FLe).

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) – **N séd.** - 76 fiches. Premier chant le 01/02 au Mazet (RD). Chanteur également en hiver quand un redoux se fait sentir : ainsi le 23/12 à Pont-Archat (MiQ) et 3 le 25/12 à Brenoux (SC).

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) – **NMH** - 68 fiches. Premier chanteur précoce le 15/01 au Rozier (FLe). Il faut attendre ensuite le 01/03 pour en avoir un second au Mazet (RD). C'est à partir du début de ce mois que les chanteurs se « déchainent ». Après une période estivale plus discrète, il chante de nouveau à l'automne, jusqu'au 28/11 à Charpal (RD). Puis comme il se tait... les données deviennent rarissimes !

ACCENTEUR ALPIN (*Prunella collaris*) - **H loc.** - 24 données. Noté quasi-exclusivement dans les gorges des Tarn et Jonte. En dehors de ce secteur caussenard : 2 à Palhers le 07/03 (DBo), 1 en migration active le 06/11 au sommet de Finiels (FLe) et 6 le 02/12 au-dessus de Villefort (JBo). Sinon, noté jusqu'au 23/03 aux Vignes (FLe) et à partir du 04/11 au même endroit (FLe). Max. de 10 le 06/02 au Point Sublime (FLe). À noter l'observation d'un à deux oiseaux se nourrissant au pied d'une mangeoire aux Vignes, seulement en cas de neige sur les causses et les pentes des gorges (FLe).

ROUGEGORGE (*Erithacus rubecula*) - **NMH** - 79 fiches. Premier chant le 23/02 à Chanac (XP), puis chanteur en toute saison avec une prédominance de mars à juin.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE (*Luscinia megarhynchos*) – **NM ass. comm.** - 54 fiches. Premier, détecté au chant, le 16/04 à Marvejols (RD) et dernier le 16/08 à Nivoliers sur le Méjean (StD). À noter un chanteur la nuit du 06/05 à près de 1000 m d'altitude au Mazet alors qu'il gèle franchement (-2°C sous abri) (RD) et un nid « prédaté » par 2 Pies le 18/06 à Sauveterre (FLe).

GORGEBLEUE À MIROIR (*Luscinia svecica*) – **M très rare** – Aucune donnée.

ROUGEQUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) – **NM comm., H rare** - 87 fiches. Noté tous les mois avec quelques hivernants sporadiques à Marvejols, Les Vignes, Laval-Atger et Pied-de-Borne. Nette arrivée décelée partout vers le 13 mars. Départ important des derniers vers le 15/10. À noter, 1 couple avec 3 juvéniles encore nourris le 16/09 au Truc de Fortunio à 1550 m (MiQ).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) – **NM ass. comm.** - 19 fiches. Premier le 09/04 au Monastier (Deana) et dernier le 01/09 à Meyrueis (BGr). Quelques chanteurs uniquement notés au Mazet, aux Laubies et à La Canourgue.

TARIER DES PRÉS (*Saxicola rubetra*) – **N loc., M** - 33 fiches. Du 17/04 à Banassac (JDC) au 05/10 à Sauveterre (FLe) et aux Bessons (MiQ), à 1000 m dans les deux cas. Noté nicheur à Naussac, Nasbinals, Usanges, Grandrieu et Ginestoux.

TARIER PÂTRE (*Saxicola torquata*) – **NM, H rare** - 63 fiches. Noté à partir du 26/02 à Chanet (Méjean) (JPM, IMA). En novembre, il fut noté près des Vignes sur le Méjean (FLe) et même le 24/12 sur le Poujoulet (800 m d'altitude) près de Marvejols (RD) ; les données hivernales restent cependant sporadiques.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) - **NM ass. comm. loc.** - 60 fiches. Noté du 04/04 sur le Méjean (Marc Forschler & Jürgen Klager) au 26/10 aux Bessons (MiQ), date très tardive. Il semblerait que ce ne fut pas une très bonne année pour cette espèce avec peu d'oiseaux notés par rapport aux années précédentes, notamment sur les causses. Ou s'agit-il d'un signe d'une régression ?...

(**TRAQUET RIEUR** (*Oenanthe leucura*) – **Disparu** – Signalé au milieu du XX^e siècle en Lozère.)

TRAQUET OREILLARD (*Oenanthe hispanica*) – **Estivant N loc.** - 2 fiches. 1 couple nourrissant fut observé le 12/07 aux Lacs sur le Sauveterre (JF) puis 1 mâle à La Parade, au Montal le 12/08 (StD). Derniers « feux » lozériens pour cette espèce devenue rarissime ?

MONTICOLE DE ROCHE (*Monticola saxatilis*) – **N loc., M** - 21 fiches. Du 21/04 sur le Méjean (Gil Jacotot & Ch. Fosserat) au 24/08 au sommet de Finiels (FLe). Pas une seule donnée du Sauveterre !

MONTICOLE BLEU (*Monticola solitarius*) – **N loc., trans.** - 4 fiches. 1 ind. le 01/04 au Rocher de l'Aiguille aux Vignes, 1 autre le 01/07 et 05/07 à St Pierre-des-Tripiers et 1 le 12/07 au Rozier (SC).

MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*) – **N loc., M** - 11 fiches. Du 07/03 aux Laubies (Mt Lozère) (JPM) au 10/10 à Sainte Eulalie (Margeride) (JBo). Max. de 10 le 04/04 au Mas de la Barque sur le Mont Lozère (Marc Forschler & Jürgen Klager) et de 8 le 24/04 à Villeneuve (Méjean) (FLe). Pas de données de reproduction ou même de chanteurs.

MERLE NOIR (*Turdus merula*) – **NMH comm.** - 101 fiches. Premier chant le 24/02 à Marvejols et, premier indice de reproduction, une femelle couvant le 3 avril (DBo). À noter un albinos partiel (sauf tête et rectrices) le 16/02 à Chirac (StC) et 2 autres avec la tête blanche : le 08/05 à St Laurent-de-Trêves (XP) et le 13/12 à St Bonnet-de-Chirac (XP).

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) – **N loc., MH** - 34 fiches. Notée en hivernage jusqu'au 08/03 au Chastel-Nouvel (SC) puis à partir du 10/10 à Ste Eulalie (JBo). Max. de 200-300 le 01/12 à Usanges (RD). Pour la reproduction : 1 oiseau nourrissait le 06/06 à Serverette et 2 ind. le 29/06 à Usanges (ThC, FLe). Puis 19 furent notés le 28/08 à Marchastel, dont plusieurs jeunes : la population aubracoise compte au moins 2 à 5 couples !

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) – **NMH ass. comm.** - 37 fiches. Premier chant le 31/01 à Ste Hélène (RM), bien précocé. Il faudra attendre début mars avant qu'elles ne se mettent toutes à chanter.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) - **H** - 17 fiches. Jusqu'au 11/03 au Chastel-Nouvel (SC) et à partir du 16/11 à Mas-de-Val sur le Méjean (FLe). Max. de 18 le 28/02 à Langogne (ThC).

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) - **NMH ass. comm.** - 77 fiches. Omniprésente. La plus commune des grives. Premier chanteur le 30/01 à Ste Hélène (RM). Max. de 62 le 21/12 aux Vignes (FLe).

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) - **N loc. très rare, irrég.** - Aucune donnée.

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) - **Acc.** - Causse Méjean 1975.

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*) - **N loc., M** - 4 fiches. 2 chanteurs à Naussac du 26/04 au 20/05 (ThC) et 1 le 29/06 à Usanges (ThC, FLe).

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) - **M très rare** - Aucune donnée.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) - **N?, M peu comm.** - 3 fiches. 1 chanteur le 13/05 à St Pierre-des-Tripiers (R. Juillard), 1 le 15/05 à Charpal (FLe) et 1 le même jour à la lavogne de Hures, sur le Méjean (R. Juillard). Il s'agit probablement de migrants.

HYPOLAÏS POLYGLOTTE (*Hippolais polyglotta*) - **NM, peu comm.** - 6 fiches. Noté à partir du 15/05, à Hures (R. Juillard), à Blajoux, au Chastel-Nouvel, au Rozier et à Ginestoux et jusqu'au 21/07. Probablement sous-décelé malgré son chant peu discret.

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) - **N séd. loc. irrég.** - 1 fiche. Un seul contact cette année mais de 4 chanteurs aux Balmelles (Pied-de-Borne) le 01/04 (XP).

FAUVETTE À LUNETTES (*Sylvia conspicillata*) - **N exc.** - Causse de Sauveterre 1982, 1989.

FAUVETTE PASSERINETTE (*Sylvia cantillans*) - **N loc., M** - 6 fiches seulement. Cette espèce est très présente dans les gorges mais peu rapportée sans doute à cause de sa discrétion. Notée à partir du 11/05 à Quézac puis à Chanac, à Ste Enimie et à St Laurent-de-Trèves.

FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE (*Sylvia melanocephala*) - **N séd. exc.** - Aucune donnée !

FAUVETTE ORPHÉE (*Sylvia hortensis*) - **Estivant N loc.** - 6 fiches. Notée sur les causses uniquement, à partir du 29/05 à Boisset (Ste Enimie) (XP) puis au-dessus de Florac et à Nivoliers (Méjean).

FAUVETTE BABILLARDE (*Sylvia curruca*) - **M, très rare** - Aucune donnée.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) - **NM, comm.** - 50 fiches. Du 25/04 à St Étienne-du-Valdonnez (JPM) au 31/08 au serre de l'Aspic, causse de Sauveterre (FLe). Notée partout jusqu'à 1260 m au lac du Born (Nasbinals) le 20/07 (JDC).

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) - **NM, ass. comm.** - 11 fiches. Notée au chant uniquement : du 23/04 au 19/06 au Mazet (RD). Notée également à Charpal (1352 m), à Barre des Cévennes, à Sauveterre et à Chanac (RD, XP).

FAUVETTE A TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) - **NM, H rare** - 59 fiches. À partir du 02/03 au Mazet (RD) et jusqu'au 18/12 à Marvejols (RD) mais les contacts à partir d'octobre deviennent sporadiques.

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) - **NM ass. comm.** - 19 fiches. Du 06/04 au Truel (Jonte) (Marc Forschler & Jürgen Klager) au 19/07 au Masegros (JDC). Noté seulement sur les causses et avancées calcaires sur la Margeride jusqu'au Mazet (secteur NE de Marvejols) et en période de chant !

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) – **N rare, M** – Aucune donnée !

POUILLOT VÉLOCE (*Phylloscopus collybita*) – **NM comm.** - 94 fiches. Du 27/02 au-dessus de Marvejols au 23/10 à Marvejols (RD). Très présent de mars à septembre.

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) – **N?, M** - 10 fiches. Du 04/04 à Mende (JPM, IMA) au 31/08 vers Sauveterre (FLe) mais avec un creux en juin et juillet. Noté également à Rimeize, Ribennes, Le Rozier, Les Vignes, Pied-de-Borne, Ste Hélène, Balsièges et Hures. On peut considérer que, cette année encore, les contacts signalés ne concernent que des migrateurs.

ROITELET HUPPÉ (*Regulus regulus*) – **N séd., M** - 43 fiches. Signalé en toutes saisons et partout présent. Premier chant le 09/03 à Langogne (ThC) et dernier le 26/06 au Chastel-Nouvel (SC, FLe). Pas de données de reproduction.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*) – **NM, H très rare** - 25 fiches. Un contact hivernal, en troupe mixte avec des Roitelets huppés, le 16/01 au Monastier-Pin Moriès (Deana) mais arrivée notable à partir du 03/03, Ste Énimie (RyD) ; régulier ensuite jusqu'à mi-septembre et un dernier contact le 27/11 à Barrandon (SC). Pas de données de reproduction.

GOBEMOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) - **N loc., M** - 6 fiches seulement. Du 28/05 aux Vignes (FLe) au 18/09 à Montrodat (ThC). Noté nicheur aux Vignes et probablement au Mazet (1 le 16/06) (RD) et en migration au Goulet le 23/08 (SC).

GOBEMOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) – **N loc., M** - 9 fiches. Du 02/05 à Balsièges (SC) au 01/09 à Meyrueis (BGr). Pas d'indices de reproduction mais seulement en migration jusqu'au 06/05 et à partir du 15/08.

MÉSANGE À LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*) – **N séd.** - 30 fiches. Une donnée de reproduction : 1 adulte nourrit un juvénile juste sorti du nid le 19/05 à Marvejols (RD).

MÉSANGE NONNETTE (*Parus palustris*) – **N séd.** - 21 fiches. Omniprésente et peu notée. Une donnée de reproduction : un couple au nichoir au Mazet de mi-mai à mi-juin (RD).

MÉSANGE BORÉALE (*Parus montanus*) – **H très rare** - 1 fiche. 2-3 oiseaux bien identifiés au cri furent observés le 21/10 au col de la Banette vers St Frézal-de-Ventalon (Jean Demolder). Cette espèce est très rare en Lozère et/ou peut-être sous-détectée.

MÉSANGE HUPPÉE (*Parus cristatus*) – **N séd.** - 41 fiches. Signalée en toutes saisons. Premier et dernier chants : 09/04 à Ribennes (RD) et 02/07 à Naussac (ThC). Pas de données de reproduction.

MÉSANGE NOIRE (*Parus ater*) – **N séd.** - 53 fiches. Signalée en toutes saisons. Premier chant le 15/02 au Mazet (RD) et dernier le 12/06 au Chastel-Nouvel (SC). 1 couple nourrit un juvénile au sol le 15/05 à Florac (JBo).

MÉSANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) – **N séd., MH** - 61 fiches. Signalée en toutes saisons. Premier et dernier chants : le 25/01 au Mazet (RD) et le 07/06 au Chastel-Nouvel (SC). Pas de données de reproduction.

MÉSANGE CHARBONNIÈRE (*Parus major*) – **N séd., MH** - 81 fiches. Signalée en toutes saisons. Premier et dernier chants : le 10/01 au Rozier (FLe) et le 07/06 au Chastel-Nouvel (SC).

SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) – **N séd.** - 43 fiches. Signalée en toutes saisons. Premier et dernier chants : 25/02 et 21/04 au Mazet (RD). Pas de données de reproduction.

TICHODROME ÉCHELETTE (*Tichodroma muraria*) – **H loc.** - 10 fiches. Surtout noté dans les gorges

du Tarn aux Vignes ! Jusqu'au 01/04 (JBo) et à partir du 11/12 (FLe). Une seule donnée à Ste Énimie du 04/03 (M. Foulon). Cette espèce est assez fréquente sur les falaises en hiver. À noter l'observation d'un mâle chantant et paradant (frétillement des ailes) devant une femelle au cirque des Baumes (Les Vignes) le 09/01 (FLe). Sans suite !...

GRIMPEREAU DES BOIS (*Certhia familiaris*) – **N séd. loc.** - 1 fiche. Un oiseau en avril à Bahours (JPM, IMa).

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) – **N séd ass. comm.** - 19 fiches. Signalé en toutes saisons. Premier chant le 23/02 et dernier le 09/06 à Chanac (XP).

LORIOT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) – **N loc.?, M rare** - 1 fiche. 1 ind. le 01/07 au Rozier (FLe) chante dans des peupliers en ripisylve ; Il pourrait s'agir d'un oiseau nicheur localement.

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR (*Lanius collurio*) – **Estivant N, ass. comm.** - 58 fiches. Du 07/05 à Arzenc-de-Randon (ThC) au 09/09 au Veygalier (Méjean) (FLe). Nombreux nourrissages notés de mi-juillet jusqu'à mi-août.

PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*) – **N loc., H** - 34 fiches. Notée tous les mois. Sur les causses, seulement à partir du 18/09 (FLe). Une donnée de reproduction aux Bessons (Margeride) : 3 juv le 31/07 nourris par les adultes. Ils le seront encore le 12/08 avec des micro-mammifères (MiQ).

PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (*Lanius meridionalis*) – **N loc., H** - 10 fiches. Notée exclusivement sur le causse Méjean : retours « en nombre » à partir du 01/04 à Chanet (Marc Forschler & Jürgen Klager). Dernière le 16/08 à Nivoliers (StD). Puis une observation hivernale : 1 ind. le 18/12 à Chanet (FLe) à 100 m d'une pie-grièche grise.

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (*Lanius senator*) – **N loc.?, M rare** - 3 fiches. 1 ind. le 01/05 aux Salces (RyD), 1 le 01/05 à Châteauneuf-de-Randon (RM) et 1 le 31/07 à Hures (Méjean) (SC) : la reproduction sur le Méjean a déjà été fortement suspectée ces dernières années.

GEAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*) – **N séd, H** - 40 fiches. Signalé toute l'année et omniprésent mais ne nécessitant pas à notre sens son classement en « nuisible » comme ce fut le cas (pour la première fois) pour l'année 2002-2003. Pas de donnée de reproduction.

PIE BAVARDE (*Pica pica*) – **N séd., H** - 52 fiches. Toute l'année et omniprésente. Un dortoir de 22 oiseaux le 12/01 à Booz (RD). Le 19/04 un nid était occupé à Naussac (ThC).

CRAVE A BEC ROUGE (*Pyrhocorax pyrrhocorax*) – **NH séd.** - 30 fiches. En dehors des causses de Sauveterre et Méjean, 1 couple a niché dans la falaise du truc de St Bonnet-de-Chirac (RD). Des troupes de 50 à 100 oiseaux sont régulièrement notées sur le Méjean dans son quart SW principalement.

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) – **N séd., H** - 18 fiches. Max. de 80 le 12/08 sur le Méjean (StD). Une colonie d'une trentaine d'oiseaux niche au cirque des Baumes, en falaise, gorges du Tarn (FLe).

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) – **H très rare** - Aucune donnée.

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*) – **NH séd.** - 102 fiches. Max. de 100-150 rassemblées le 15/12 à Recoules-de-Fumas (RD). Construction de nid notée le 24/02 à Aumont (MiQ) et une couveuse le 06/04 à Chambon-le-Château (JBo).

GRAND CORBEAU (*Corvus corax*) – **NH séd.** - 109 fiches. Max. de 40 ensemble le 21/03 à Ste Lucie (MiQ) et de plus de 30 le 06/11... à la décharge de Mende (FLe). Quatre jeunes volants sont notés le 28/05 à Barjac (XP) et 3 poussins non-volants sont notés le 17/04 à Naussac (ThC). Observé partout en toute saison.

ÉTOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) - **NMH** - 33 fiches. Bandes n'excédant pas une centaine d'oiseaux, tout au long de l'année ! Aucun dortoir conséquent signalé. Nidifications notées en mai et juin dans des frênes notamment.

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) - **N séd.** - 30 fiches. Peu noté. Max. de 30 le 16/11 à Hures (FLe). Noté partout mais jamais en grande quantité. Nidification notée en avril dans un nid d'hirondelle de fenêtre.

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) - **N loc., H** - 1 fiche. 1 ind. le 17/10 à Langogne (ThC). Cette espèce aurait-elle disparu de Lozère ?

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*) - **N loc., trans.** - 19 fiches. Noté cette année uniquement sur le Méjean, aucune donnée du Sauveterre ou de la Margeride. Des oiseaux doivent passer inaperçus : à titre d'information, il est nicheur dans les Hautes-Alpes jusqu'à au moins 1500 m. Chant noté en mai et nourrissages en juillet. Derniers le 16/11 à Drigas et Nivoliers avec 4 et 8 oiseaux (FLe).

NIVEROLLE ALPINE (*Montifringilla nivalis*) - **H rare** - 1 fiche. Une probable entendue le 06/11 au sommet de Finiels (FLe). En migration ?

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) - **NMH, comm.** - 143 fiches. Premier chanteur le 25/02 au Mazet (RD) puis chanteurs cantonnés réguliers à partir de mi-mars. Migration pré-nuptiale notée dès le 27/01 au Mazet avec plus de 200 oiseaux (RD). C'est aussi à partir de la mi-mars que la migration bat son plein souvent en petits groupes tout au long de la journée dont le cumul peut dépasser les 1000 oiseaux comme au Point Sublime le 24/03 (FLe). Mais il est probable que ce soit des dizaines de milliers d'oiseaux qui traversent le département certaines journées. À noter un couple original nichant sous le toit de la mairie de Florac le 12/07 (RyD). Dernier chanteur le 12/07 au Rozier (SC) mais reprise à l'automne, le 23/10 à Marvejols (RD). La migration est notée à partir du 20/10 mais de façon moins spectaculaire et plus diffuse qu'au printemps.

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) - **MH** - 12 fiches. Jusqu'au 24/03 à Mas-St Chély avec 3 oiseaux (RM) et à partir du 27/10 au Goulet (SC), arrivant quand les Pinsons des arbres passent. Max. de plus de 200 le 13/12 à Aumont (MiQ).

SERIN CINI (*Serinus serinus*) - **N comm., M** - 45 fiches. Premier le 14/03 à Marvejols (RD) et les 10 derniers le 23/09 aux Vignes (FLe). Nourrissage de 2 juv noté le 09/06 à Rimeize (MiQ).

VENTURON MONTAGNARD (*Serinus citrinella*) - **N loc., MH** - 17 fiches. Bizarrement une seule donnée provient des sites de nidification. Toutes les autres sont du Méjean où l'espèce est notée en hivernage, jusqu'au 10/04 à Hures avec 20-30 oiseaux (Marc Förschler & Jürgen Kläger). Une donnée étonnante d'un oiseau chanteur du 13 au 15/05 à St Pierre-des-Tripiers (R. Juillard). Également une bande de 25 avec des Pinsons des arbres le 24/12 au-dessus de Marvejols (RD).

VERDIER D'EUROPE (*Carduelis chloris*) - **NMH** - 23 fiches seulement ! Premier chanteur le 17/03 à Marvejols (RD). Un couple nicheur est noté le 06/06 à Grandrieu (JBo). Max. de 50 ensemble le 28/11 à Rieutord-de-Randon (RD).

CHARDONNERET ÉLÉGANT (*Carduelis carduelis*) - **NMH** - 45 fiches. Premier chant le 21/03 à Naussac (ThC). Un couple avec au moins 4 jeunes est noté le 28/07 à Rimeize (MiQ). Pas de maximum notable.

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) - **N loc.? MH** - 32 fiches. Noté jusqu'au 17/04 à Cultures avec 10 oiseaux (Deana) et à partir du 07/10 aux Vignes avec plus de 40 oiseaux (FLe). Max. de 200 le 28/11 à Ganivet (RD) et de 200-300 le 10/12 à Pied-de-Borne (AFé).

LINOTTE MÉLODIEUSE (*Carduelis cannabina*) – **NM comm., H rare** - 42 fiches. Non notée jusqu'en avril et à partir de novembre ?! Max de 150-200 chassées par un épervier d'Europe le 01/09 sur le Méjean (BGr). Nidification relevée avec 1 et 4 jeunes les 11 et 20/07 à Grandrieu (JBo) et à Nasbinals (JDC).

SIZERIN FLAMMÉ (*Carduelis flammea*) – **HM très rare** - Aucune donnée.

BEC-CROISÉ DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) - **NMH** - 58 fiches. Premier chant le 13/01 sur le Bougès (ThC) à 1150 m. Sur les causses en hivernage, jusqu'au 10/04 sur le Méjean avec une vingtaine d'oiseaux (Marc Förschler & Jürgen Kläger), puis à partir du 25/09 au col de Perjuret (FLe). Nicheur sur tous les massifs : Margeride, Mt Lozère, Aigoual. Max.de 50 le 18/11 à St Jean-la-Fouillouse (JBo). En déplacements a été notés un peu partout.

***ÉTOURNEAU ROSELIN** (*Sturnus roseus*) – **Acc.** - 1 fiche. Première mention lozérienne : 5 mâles ad. le 03/06, dans un cerisier, au Mazel (St Laurent-de-Trèves) (JBo, JF). Cette observation s'inscrit dans la vague d'oiseaux ayant déferlé sur l'Europe occidentale autour de cette période, puisqu'il est signalé en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suède... et en France, jusqu'en Aquitaine (Pointe de Grave) le 31/05.

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) – **N séd., H** - 37 fiches. Premier chant le 08/04 au Mazet (RD). Omniprésent mais quasiment toujours noté par 1 à 3 à l'exception d'une troupe de 9 ind. le 26/02 au Bougès (ThC).

GROSBEC CASSE-NOYAUX (*Coccothraustes coccothraustes*) – **N?, MH** - 20 fiches. Noté jusqu'au 15/05 avec un oiseau bague à la lavogne de Hures (R. Juillard), date très tardive pour cette espèce disparaissant d'habitude au plus tard fin mars. Retours à partir du 19/10 à Pierrefiche (Margeride) (RM) avec 3 ind. Max. de 18 le 06/11 au Goulet en migration en une seule troupe (FLe).

BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*) – **H exc.** – Aucune donnée. Hivernant potentiel au mont Lozère.

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) – **NMH, comm.** - 82 fiches. Premier chant le 12/03 à Mas-St Chély (XP). Max. de 50, rassemblés sur une lavogne, le 24/03 au même endroit (RM). Dernier chanteur le 03/07 à La Parade (FLe). Max. hivernal de 60 ind. le 21/12 à Perjuret (FLe).

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirlus*) – **NM, H rare** - 60 fiches. Premier chanteur le 27/02 sur le Poujoulet, Marvejols (RD). Dernier chanteur le 16/10 à Marvejols (RD). Le plus souvent, noté seul ou par paire. Max. de 6 ind. le 19/02 à la Bourgarie (Les Vignes) avec des Bruants jaunes (FLe).

BRUANT FOU (*Emberiza cia*) – **N séd. trans.** - 29 fiches. Oiseau très discret, sans doute pas noté à la hauteur de sa présence ! Premier chant le 01/04 aux Balmelles (XP). Deux données de reproduction le 12/06 à Chabrits d'un mâle nourrissant 2 jeunes (FLe) et le 13/06 à St Chély-d'Apcher avec 1 jeune à l'envol (MiQ). Max. ind. ensemble le 29/12 à Marvejols (RD).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) – **N loc., M** - 11 fiches seulement. Premier le 08/04 à Hures (Marc Förschler & Jürgen Kläger). Dernier le 25/08 au Deïdou, cause Méjean (FLe). Cette espèce est peu notée.


BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) – **N prob. loc., M** - 11 fiches. Noté en migration : par exemple, 3 mâles et 4 femelles le 03/03 à Ganivet (RD). Nidification possible à Malbouzon et à Barre-des-Cévennes, quasi-certaine à Usanges où un couple est présent le 29/06 (ThC, FLe) et certaine dans la zone de prairies humides sous le col de Bonnacombe (Aubrac), mâle avec une becquée le 29/06 (FLe).

BRUANT MÉLANOCÉPHALE (*Emberiza melanocephala*) – **Acc.** - 3 fiches. Une femelle est d'abord vue le 10/05 à Champerboux (cause de Sauveterre) à 200 m de l'endroit où un mâle fut déjà noté le 26/06/1998 (FLe). Une prospection ultérieure ne donnera rien de plus. Ensuite c'est un mâle chanteur qui sera noté du 22/06 (remarquons la concordance des dates) au 26/06, au moins, à Nivoliers. Ce mâle avait un

comportement territorial et houspillait les autres bruants. Une femelle probable a même été vue. Une nidification locale n'est pas à exclure. Rappelons que cette espèce niche depuis peu dans les Alpes-Maritimes dans des milieux similaires à ceux rencontrés sur le Méjean en maints endroits. Il se pourrait, dans la dynamique d'expansion vers l'ouest observée chez cette espèce, que le Bruant mélanocéphale vienne à nicher (de manière régulière ?) sur les causses, si ce n'est déjà fait. Des prospections en juin dans les milieux favorables (vallons buissonneux avec haies) pourraient se révéler très intéressantes.

BRUANT PROYER (*Miliaria calandra*) – **N loc., M - 9 fiches.** Noté du 15/03 sur le Poujoulet (Marvejols), avec 6 oiseaux en migration (RD), au 03/07 à Drigas, chanteur (FLe). Hors causses, 1 chanteur à Escudière sur l'Aubrac le 16/06 (FLe).

Répartition mensuelle des données :



Quelques informations et remarques complémentaires :

À la lecture de cette synthèse, des carences ou des distorsions se font jour : en gros, toutes les fauvettes sont sous-détectées (exemple pour la pitchou ou la passerinette) et plus globalement tous les oiseaux chanteurs peu faciles à voir. Une meilleure connaissance des cris et chants est un atout pour l'observateur et pourrait changer le statut de certaines espèces. Les mois de mars et avril, même s'ils sont intrinsèquement plus « riches », en cumulant 40% des données paraissent sur-représentés. De même certains secteurs sont cette année encore complètement délaissés : c'est le cas du mont Lozère et des monts de La Margeride (aucune donnée de Pipit spioncelle, Merle à plastron ou de Venturon en saison de reproduction !), mais aussi de l'Aubrac (quasiment aucune donnée de canard ou de bécassine !) ou des vallées cévenoles (aucune donnée de Fauvette mélanocéphale et seulement une de pitchou !). Il est de plus surprenant de constater que toutes les espèces crépusculaires, ou qui ont un maximum d'activité à l'aube, sont ignorées : ainsi seulement 21 fiches pour l'Engoulevent et 13 pour le Petit-duc.

Heureusement, les rapaces diurnes eurent la faveur des observateurs en 2002 puisque 21 espèces s'arrogent 25 % des données... L'enquête rapace a sa part de responsabilité (même si beaucoup de données ne nous sont pas parvenues) !

Constatons enfin que la part des observations provenant de naturalistes de passage ne cesse de croître dans notre banque de données, révélant ainsi que l'ALEPE et son travail commencent à rayonner.

Il n'y a plus qu'à espérer que les années qui vont suivre seront riches de découvertes ou de redécouvertes et que les lacunes de notre fichier se combleront au moins partiellement.

Compilation des données et rédaction achevées aux Vignes le 15 février 2004, par François LEGENDRE
Saisie des données, relecture et mise en forme achevées à Marvejols le 15 mars 2004, par Rémi DESTRE