

# Synthèse ornithologique lozérienne 2016



**Association Lozérienne pour l'Étude  
et la Protection de l'Environnement**



ALEPE

Montée de Julhers  
48000 BALSIEGES

Tél.: 04 66 47 09 97


Email: [contact@alepe48.fr](mailto:contact@alepe48.fr)

Association membre de  
l'Union régionale Meridionalis



# Synthèse 2016 des observations ornithologiques en Lozère

Cette synthèse est une compilation de **46 205** données (43 224 en 2015, 38 866 en 2014) provenant de la base de saisie en ligne FAUNE-LR. Au total **236 espèces (record annuel)** sont citées cette année (226 en 2015, 224 en 2012, 219 en 2014).



Histogramme des données toutes espèces 2011-2016

*Une donnée est une ligne rentrée par un/une observateur/trice.*

- un Tarier pâtre mâle vu un jour sur un site = 1 ligne
- un mâle et une femelle saisis un jour sur un site = 2 lignes
- ces deux mêmes oiseaux saisis par deux observateurs = 4 lignes et autant de fois qu'il y a d'observateurs ou d'individus différenciés

*Le tri de ces « doublons » étant très fastidieux, il n'est pas fait. Cependant cela ne change rien aux statistiques en terme de phénologie, de répartition et du total d'oiseaux car on peut distinguer la donnée du nombre d'individus selon la requête faite sur Faune-LR.*

## Analyse globale des données 2016


Les données pour l'année 2016 ne se répartissent pas également dans le temps et dans l'espace, ce qui est classique.

Les observations, nombreuses aux mangeoires habituellement, sont déficitaires cette fin d'année. C'est pourquoi décembre enregistre le minimum annuel (2297 données) suivi de novembre sans doute pour les mêmes raisons (2339). Février (2681) arrive en troisième avec 400 données de moins que janvier (3029) sans doute en lien avec une forte pluviométrie. Mars (4806) et avril (4816) sont au coude à coude ce qui traduit un déficit de données pour avril probablement pour la même raison que février. C'est mai qui culmine (6303) pour l'année puis les données décroissent jusqu'en août (3006) et remontent un peu jusqu'en octobre (3592) grâce aux suivis migratoires principalement.

Les espèces les moins notées sont sans surprise les nocturnes (hormis Chevêche et Hulotte) et les espèces forestières. A titre d'exemple, l'Engoulevent est présent presque partout en Lozère et finalement peu noté. Que dire du Hibou-Moyen-Duc ou du Grimpereau des bois ou du Pic mar ?

D'un point de vue spatial, sans surprise encore une fois, ce sont les vallées cévenoles et le grand est lozérien qui ont le plus de lacunes mais nettement moins marquées que les années précédentes même si les cévenoles sautent encore aux yeux tout comme les franges du nord lozérien, le centre est de la Margeride et les centres boisés des grands causses. Sans surprise, les vallées du Lot et Colagne, le lac de Naussac, le causse Méjean et les gorges et dans une moindre mesure le Mont Lozère et le causse de Sauveterre sont les mieux renseignés.

Le nombre d'espèces avec code atlas enregistrées par maille va de 1 (aucune maille à zéro espèce ce qui est déjà une lacune de moins) à 94 (Saint-Germain-du-Teil/Aubrac), 88 (Marvejols/lac



nombre d'espèces par maille avec code atlas (2016)

du Moulinet), 87 (Sainte-Enimie/causse de Sauveterre) et 87 également (Meyrueis/gorges de la Jonte et causse Méjean).

Le quinté de tête des communes les plus renseignées en 2016 est : Saint-Germain-du-Teil (4344 données pour 149 espèces/sous-espèces et 22849 données pour 222 espèces/sous-espèces au total), Hures-la-Parade (2796-137/9794-187), Sainte-Enimie (1599-119/8507-176), Marvejols (1313-96/9264-147) et Meyrueis (1130-130/3832-164).

Sept communes dépassent les 1000 données cette année avec Grèzes et le Pont-de-Montvert (64 en tout) et 11 enregistrent plus de 100 espèces/sous-espèces (Saint-Germain-du-Teil, Hures-la-Parade, Meyrueis, Sainte-Enimie, Naussac, Le Buisson, Langogne, Les Salces, Ispagnac, Chanac, Mende).

Seulement 3 communes n'enregistrent aucune donnée (Saint-Juéry, Saint-Michel-de-Dèze, Saint-Julien-des-Points) même si 84 en cumulent moins de 100 (25 en cumulent moins de 100 depuis l'ouverture de la base dont seulement 16 pour Julianges, 19 pour Saint-Michel-de-Dèze et 20 pour Saint-André-de-Capcèze, 23 pour Saint-Juéry et 33 pour Saint-Andéol-de-Clerguemort soit 3 communes des Cévennes en queue de peloton).


D'un point de vue altitudinal, la Lozère a une altitude moyenne aux alentours de 1020 m avec un maximum d'habitants (et donc d'observateurs) dans les vallées Colagne, Lot et Tarn (entre 400 et 800 m). C'est en toute logique que 90 % des observations se font entre 600 et 1200 m, les basses vallées cévenoles et les plus hautes altitudes (hauteurs) étant délaissées la plupart du temps.

En bref, des efforts sont à faire :


- dans les Cévennes et plus largement pour les communes et mailles sous-prospectées avec moins de 60-70 espèces nicheuses, moyenne des communes bien prospectées en Lozère en absence de plan d'eau.
- aux basses altitudes (encore et toujours les Cévennes) et les hauteurs au-dessus de 1200 m.
- en zones forestières et loin des routes (la marche est bonne pour la santé).
- en automne, hiver et coeur de l'été.
- la nuit ! (c'est beau la Voie Lactée).

Il y a encore à découvrir !

Bonnes observations 2017 !



*répartition des données 2016*



*phénologie des données 2016*

## Aperçu climatique 2016

Après une année 2015 chaude et sèche, 2016 commence sous des trombes d'eau pour un printemps **le plus humide en France depuis 50 ans** au moins jusqu'à début juin... suivi de trois mois très secs de juillet à septembre inclus avec **vague de chaleur inédite début septembre**. Automne doux, normalement humide et décembre très sec (battant les records de 2015), minimales froides dans les vallées (20-25 jours de gel) et doux en montagne par inversion de température avec un enneigement nul sur tous massifs.

Le printemps 2016 semble avoir eu des conséquences fâcheuses sur la reproduction d'un grand nombre d'oiseaux et sur la production de graines avec déficit de rongeurs entraînant de faibles nichées et déficit d'oiseaux granivores en automne dont l'absence est remarquée aux mangeoires y compris lors de la vague de froid de janvier 2017. La chaleur de septembre permet d'enregistrer quelques dates records ou tardives chez nombre d'insectivores.

L'automne doux encore une fois permet aux pipits, alouettes, tariers pâtres et pouillots de trainer en saison tout comme les inondations de novembre et la forte production des sorbiers favorise de grandes troupes de grives en Margeride.

## Remerciements

Ce sont **261** observateurs réguliers et occasionnels qui ont alimenté la base cette année pour la Lozère (relevé Meridionalis/ M. BOURGEOIS). Nous les remercions collectivement très chaleureusement.

La simultanéité temporelle et/ou géographique de nombre d'observations rend la citation de chaque observateur/trice ingérable pour une rédaction compréhensible et une lecture agréable. Seule l'information synthétique est désormais retenue notamment pour les dates de premiers ou derniers.

Seule une observation citée complètement (espèce, lieu, date, nombre) l'est avec son observateur/trice. Quand une observation concerne plusieurs observateurs, ceux-ci sont cités dans l'ordre alphabétique.

Merci de votre compréhension... mais restez assurés que chaque observation saisie fait avancer le schmillblick de la connaissance et trouve ainsi toute sa place dans cette synthèse.

Les observateurs réguliers dont le nom est abrégé se retrouveront ci-dessous :

Thomas AUCOUTURIER (TAu), Emmanuelle BARTHEZ (EBa), Jean BELHACHE (JBe), Robin BESANÇON (RBe), Jean-Luc BIGORNE (JLB), Patricia BONNEFILLE (PBo), Jérôme BOUARD (JBo), Jacky BRARD (JBr), André BROCARD (ABr), Dominique BUGAUD (DBu), Grégory CHAMMING'S (GCh), Samuel CHAZALMARTIN (SCh), Marc CHOUILLOU (MCh), Stéphane CURNAC (StC), Florian CHRISTOPHE (FCh), Marie-Laure CRISTOL (MLC), Régis DESCAMPS (RDe), Rémi DESTRE (RD), Philippe FELDMANN (PFe), Alexandre FELTGEN (AFe), Jocelyn FONDERFLICK (JF), Christine GONELLA (CGo), Philippe LECUYER (PhL), François LEGENDRE (FLe), François LOVATY (FLo), Philippe LUCAS (PLu), Isabelle et Jean-Pierre MALAFOSSE (IM, JPM), Martine MULLER (MMu), Michel QUIOT (MiQ), Guilhem SUSONG (GSu), Philippe THOUVENOT (PTh), Gérard TORREILLES (GTo).

Que tous trouvent dans cette synthèse l'expression des remerciements chaleureux de l'ALEPE et de MERIDIONALIS, gestionnaire de la base de données [www.faune-lr.org](http://www.faune-lr.org) dont sont issues les données cartes et histogrammes. Que ceux que nous aurions oubliés ou dont nous aurions écorché le nom nous en excusent et nous le fassent savoir (gentiment !).

### Abréviations parfois utilisées :

Individu (ind.), juvénile (juv.), ac (année civile), adulte (ad), im (immature), f (femelle)...

Pour les statuts phénologiques : nicheur (N), migrateur (M), hivernant (H), sédentaire (séd.), erratique (err.), accidentel (acc.), exceptionnel (exc.), localisé (loc.), assez (ass.), commun (comm.), régulier (rég.), irrégulier (irrég.), transhumant (trans.).

La liste des oiseaux est traitée selon l'ordre systématique en vigueur en 2012.

**Les nouvelles espèces sont marquées d'un astérisque.**

### Précisions utiles sur quelques noms de lieux :

- Aubrac : haut plateau basaltique et granitique couvrant le nord-ouest de la Lozère, s'étendant également sur les départements de l'Aveyron et du Cantal.
- Booz : petit plan d'eau sur le Lot, commune de Saint-Germain-du-Teil, 530 m d'altitude.
- Cévennes : nom de la bordure sud-est du Massif-Central, principalement schisteuse et aux nettes affinités supra-méditerranéennes même si ses points culminants (Aigoual et Mont Lozère) sont clairement montagnards.
- Charpal : lac de barrage sis à 1325 m d'altitude sur la Margeride et s'étendant sur plusieurs communes.
- Ganivet : petit lac de barrage à 1050 m sur la Margeride sur la commune de Ribennes.
- Saint-Andéol, Le Born, les Salhiens, Souveyrols, Usanges : zones humides de l'Aubrac entre 1150 et 1250 m d'altitude. Les quatre premiers sont des lacs glaciaires.
- Malzieu (Le) : village de Lozère en Margeride nord doté d'une ancienne sablière (La Chazette/871 m) ayant un bel effet oasis.
- Margeride : haut plateau granitique entre 1000 et 1551 m couvrant la moitié nord de la Lozère.
- Méjean : nom du grand causse central, haut plateau calcaire entre 800 et 1248 m d'altitude.
- Mont Aigoual : sommet des Cévennes (1565 m) s'étendant sur le Gard et la Lozère.
- Mont Gargo, Vébron : point culminant du causse Méjean à 1248 m d'altitude sur la commune de Vébron.
- Moulinet (Le) : petit lac de barrage à 1077 m d'altitude sur la commune du Buisson près de l'A75.
- Naussac : lac de barrage sis à 945 m d'altitude vers Langogne et s'étendant sur plusieurs communes.
- Puech Debon : point d'observation des migrations pré et postnuptiales sur la commune de Saint-Germain-du-Teil. Ce site domine la vallée du Lot sur la bordure sud-est de l'Aubrac.
- Point Sublime : point de vue sur les gorges du Tarn situé sur la commune de Saint-Georges-de-Lévéjac.
- Serre de Fourcat, Vébron : sommet proche du Mont Gargo sur le causse Méjean et situé sur la commune de Vébron.
- Signal de Mailhebiau : point culminant de l'Aubrac à 1471 (1469 sur IGN 25000°) m s'étendant sur plusieurs communes.
- Sommet de Finiels : point culminant du Mont Lozère et du département à 1699 m s'étendant sur plusieurs communes.
- Truc de Fortunio : point culminant de la Margeride avec le Signal de Randon à 1551 m d'altitude.

## **Faits marquants en 2016**

Excellente année avec 4 nouvelles espèces pour le département et un nombre record d'espèces cette année.

- Premières mentions de la Chevêchette d'Europe, de la Glaréole à collier, du Chocard à bec jaune et du Pouillot brun portant à **308** espèces sauvages l'inventaire des oiseaux de Lozère
- Un Aigle criard x pomarin en transit
- Nouvel hivernage et second cas de reproduction de l'Oie cendrée (après 2015)
- Seconde mention de l'Huitrier pie
- Troisième mention de la Macreuse brune, du Grèbe esclavon et du Bécasseau de Temminck
- Afflux record de la Cisticole des joncs
- Première reproduction au XXIème siècle de l'Effraie des clochers
- Groupe record de Rolliers d'Europe
- Nombre d'espèces enregistrant de nouvelles rares mentions...  
... et moult records de dates, de chants, de nombres, de migration d'espèces en expansion, d'espèces en régression, d'espèces dont le statut est incertain...



- Buse variable  
Cultures, 19/12/16, D. Bonnet

- Bruant jaune  
Saint Bazile, 03/07/16, P. Chamaillard

- Milan royal  
28/04/16, Marvejols, R. Destre

- Pluvier guignard  
serre de Fourcat, 19/08/16, D. Roux

- Aigrettes garzettes  
Booz, 09/05/16, F. Legendre

- Bondrée apivore  
sommet de Finiels, 04/09/16, P. Feldmann



Philippe Feldmann © 2016

# Liste commentée des espèces 2016


**CYGNE TUBERCULÉ** (*Cygnus olor*) - **MH, rare** - 14 données. 1 nichée à Saint-Chély-d'Apcher (3 juvéniles), 1 oiseau de passage à Booz en janvier et 1 oiseau stationnant au Malzieu à paritr du 04/03.

**OIE CENDRÉE** (*Anser anser*) - **M rare** - 22 données. Naussac : suite à l'hivernage du 15/11/2014 au 25/03/2015 et à la première reproduction sauvage en Lozère (voire en Languedoc-Roussillon) avec 3 oisons le 22/05/2015, 3 oies reviennent sur le site le 20/03 sans avoir été vues de l'hiver. Le 09/05 il y a 3 oisons de 15 jours visibles et le 20/05 ils seront 5 avec un envol au plus tard le 05/07. Vues jusqu'au 08/07 elles disparaissent pour l'été avant retour de 3 oiseaux le 29/11 puis de 8 en décembre qui entament un **nouvel hivernage** (JBo, MLC, RD, FLe).

Egalement 15 le 24/03 en migration à Saint-Chély-d'Apcher (TAu) et 2 au lac du Moulinet le 29/11 (PTh).

**TADORNE DE BELON** (*Tadorna tadorna*) - **MH rég.** - 18 données. Surtout à Naussac du 03/04 au 09/12 sans données en juillet et août pour un beau max de 20 le 24/11 à Naussac (FLe). Egalement 2 à Ganivet le 28/11 (JLB) et 9 à Saint-Andéol le 30/11 (PTh).

**CANARD SIFFLEUR** (*Anas penelope*) - **MH rég.** - 43 données (14 en 2015). Max de 51 en hivernage à Naussac et jusqu'au 06/04 (L. FEDON). Retour le 24/09 pour un max de 74 à Naussac le 27/12 (PTh). Noté cette année sur les principaux plans d'eau du département.



Canards siffleurs  
Naussac, 21/10/16  
P. Thouvenot

**SARCELLE D'HIVER** (*Anas crecca*) - **N loc., MH comm.** - 101 données. Jusqu'au 09/05 avec un petit max de 37 à Naussac le 22/02 (FLe) puis à partir du 15/09 pour un max de 40 au lac du Born le 26/11 (PTh). 3 oiseaux (2 mâles) sont vus en mai et juin sur un marais de l'Aubrac sans qu'une tentative de reproduction ne soit constatée.

**CANARD COLVERT** (*Anas platyrhynchos*) - **N loc, MH comm.** - 389 données. Max de 262 le 04/12 à Naussac (FLe). Côté reproduction : un nid de 10 oeufs sur Usanges le 12/04 (L. FEDON) et 16 couvées complètes recensées de 4 à 11 pullis entre le 01/05 et le 28/08 pour un total de 111 poussins ce qui est un minimum, un petit site comme Booz accueillant au moins 5 nichées.



Canard pilet  
Naussac, 24/09/16  
P. Thouvenot

**CANARD PILET** (*Anas acuta*) - **MH rég.** - 25 données.

Année faste pour cette espèce en Lozère : 1 mâle hivernant (comme l'hiver précédent) au lac du Moulinet jusqu'au 21/02, le lac n'ayant pas gelé de l'hiver bien que sis à 1100 m d'altitude ! Passage noté jusqu'au 27/03 avec un beau max de 16 ce jour à Naussac (E. ROGEAU). Un oiseau est noté tardivement le 03/05 à Usanges (L. FEDON). Retour à partir du 24/09 pour un max de 16 également à Naussac le 03/11 (MLC, FLe).

**CANARD SOUCHET** (*Anas clypeata*) - **MH rég.** - 18 données. Pas d'hivernage et passages du 14/03 au 10/04 avec un max de 25 ce jour à Naussac (JBo) puis du 06/10 au 30/11 sans max notable.

**CANARD CHIPEAU** (*Anas strepera*) - **MH rég.** - 15 données du 27/10 au 29/12 pour un max de 17 le 24/11 à Naussac (FLe). Noté également à Ribennes (1) et au Moulinet (4).

**SARCELLE D'ÉTÉ** (*Anas querquedula*) - **M, rég** - 2 données. (25 en 2015 !). 1 mâle le 11/03 sur l'Aubrac (RD) et 1 mâle le 09/05 à Naussac (MLC, FLe). Très petite année !

**NETTE ROUSSE** (*Netta rufina*) - **M, rég** - 3 données de Naussac : 7 le 22/02, 1 le 09/05 et 10 le 24/11 (FLe).

**FULIGULE MILOUIN** (*Aythya ferina*) - **MH rég.** - 11 données. Du 29/03 au 09/05 et du 15/09 au 24/11 pour un max de 15 le 24/11 à Naussac (FLe). Noté également au Malzieu et Charpal.

**FULIGULE MORILLON** (*Aythya fuligula*) - **MH rég** - 0 donnée. devenu très rare en Lozère...

**MACREUSE BRUNE** (*Melanitta fusca*) - **M, très rare.** 1 donnée. 2 le 30/11 à Charpal (JLB), pas notée en Lozère depuis 2001 !

**HARLE BIÈVRE** (*Mergus merganser*) - **H, rare.** 1 donnée. 1 le 27/10 à Charpal (RD), précoce (ancienne date record un 09/12).


**HARLE HUPPÉ** (*Mergus serrator*) - **M, rare.** 3 données. A Naussac uniquement : 1 le 18/10 (JBo), 9 le 24/11 (FLe) et 2 le 26/11 (JLB).

**GRAND TÉTRAS** (*Tetrao urogallus*) - **N loc, introduit** - 3 données. La femelle habituelle de Finiels, Mont Lozère est notée le 19/05 (A. DESNOS), un mâle au roc de l'Eglise, Lanuéjols le 07/09 (B. NABHOLZ) et enfin un oiseau à Arzenc-de-Randon le 04/11 (FSa).


**PERDRIX ROUGE** (*Alectoris rufa*) - **N séd.** - 156 données. 8 nichées bien renseignées du 08/07 au 23/09 pour 51 poussins dont une superbe nichée de **18 poussins** de 1-2 jours le 08/07 à Saint-Sauveur-de-Ginestoux (P. MORO) !

**PERDRIX GRISE** (*Perdix perdix*) - **N séd.** - 2 données. 1 le 06/03 au Born (J. MOLINIER) et 1 le 13/07 au Pont-de-Montvert (A. FLEIXAS).

**CAILLE DES BLÉS** (*Coturnix coturnix*) - **NM** - 196 données (140 en 2015) : du 11/05, plutôt tardive cette année au 08/09 puis une observation tardive le 02/10 sur le Méjean (J. WAHL). Chant jusqu'au 11/08. Fait rare, 2 nichées sont notées les 14 et 15/08 d'au moins 2 et 4 poussins à Bagnols-les-Bains (DBu) et à Saint-Bauzile (P. CHAMAILLARD). Pas notée au-delà de 1300 m.



Perdrix rouge  
reproduction 2016



Caille des blés  
reproduction 2016

**FAISAN DE COLCHIDE** (*Phasianus colchicus*) - **N loc, introduit** - 23 données. Lâchers de « chasse » avec une **première preuve de reproduction en Lozère** : 1 femelle et 9 poussins le 17/06 sur le Mont Lozère (PLu). Certains lâchers furent a priori faits au printemps (d'après le comportement peu naturel d'oiseaux observés alors), peut-être ces oiseaux en sont-ils issus ?

**PLONGEON ARCTIQUE** (*Gavia arctica*) - **HM, très rare** - 5 données. Un immature stationne du 13 au 24/11 à Charpal (GTo et alli.).

**GRÈBE CASTAGNEUX** (*Tachybaptus ruficollis*) - **NHM, loc.** - 39 données. Petite année : hivernage noté en janvier/février à l'unité sur la Truyère au Malzieu et sur le Lot à Banassac ainsi qu'à Naussac, Prévencières et Langogne (sur l'Allier) en décembre. Aucune donnée du 02/02 au 14/07 !!! Seule mention de reproduction bien pauvre : 1 juv est nourri le 31/08 à Booz. Max (migrateurs) de 21 le 25/09 sur ce plan d'eau (FLe).

**GRÈBE ESCLAVON** (*Podiceps auritus*) - **M, très rare** - 1 donnée. Troisième donnée départementale avec un oiseau le 15/12 à Naussac, 17 ans après la dernière donnée du 12 au 16/11/1999 sur ce même lac.



Grèbe à cou noir  
Naussac, 18/09/16,  
F. Legendre

**GRÈBE A COU NOIR** (*Podiceps nigricollis*) - **M, rare** - 7 données. 2 1ac le 18/09 et le 24/11 à Naussac (FLe et alli.)

**GRÈBE HUPPÉ** (*Podiceps cristatus*) - **NHM, loc.** - 115 données. Max de 26 en janvier à Naussac, valeur faible. Retour de locaux sur le lac de Saint-Andéol le 15/03 puis reproduction réussie (fait rare sur ce site) avec un poussin mi-juillet qui part mi-octobre. Migrateurs jusqu'au 13/04. 6 couples au moins paradent et construisent à Naussac sans aucune preuve de reproduction réussie comme tous les ans ! Max de 81 sur ce site le 29/12 (RD).



Grèbe huppé  
Saint-Andéol, 20/03/16,  
B. Grindel

**GRAND CORMORAN** (*Phalacrocorax carbo*) - **HM, comm.** - 218 données. 94 hivernants mi-janvier sur le département dont 37 à Naussac et 48 à Villefort. Passage reprenant en février et s'achevant le 29/04 sans vol supérieur à 66 oiseaux. **Fait nouveau en Lozère : l'estivage de 4-6 oiseaux sur Naussac**, tous immatures, aucune reproduction n'étant donc constatée. Cela indique plus une bonne santé des populations piscicoles qu'une augmentation de la population de cormorans en France qui est stable voire en léger déclin. Premiers retours fin juillet, max de 132 le 15/09 à Naussac et passage plus conséquent en octobre (max 77 en migration) puis une cinquantaine d'hivernants s'installent.



Grand cormoran  
Le Malzieu, 23/12/16,  
M. Quiot

**BIHOREAU GRIS** (*Nycticorax nycticorax*) - **MN, rare** - 7 données. 2 le 27/03 à Saint-Bonnet-de-Montauroux (JBo) puis noté à Ribennes (JLB) et Booz où un adulte est observé le 20/06 (FLe) et 1 jeune, potentiellement né localement le 16/08 (SCh).


**HÉRON GARDEBOEUF** (*Bubulcus ibis*) - **Err.** - 5 données. Du 27/03 au 27/05 pour un max de 8 le 27/03 aux Bondons (M. PASCAL).

**AIGRETTE GARZETTE** (*Egretta garzetta*) - **M, peu comm.** - 26 données. 21 données du 21/03 au 30/05 pour un max de 5 le 10/05 à Booz (FLe), site où les oiseaux paradent et où une ponte est peut-être déposée mais sans succès, les oiseaux abandonnant le site en juin. Ensuite 3 données d'oiseaux seuls du 15/09 au 31/12. Notées sur tous plans d'eaux.


### GRANDE AIGRETTE

(*Casmerodius albus*) - **Err., peu commune** - 274 données (146 en 2015) !!! Le nombre de données augmente toujours et a triplé en 4 ans, en cause un hivernage croissant (hivers doux) et une augmentation des observateurs.

La comptabilité des oiseaux est impossible en l'absence de comptages coordonnés mais on peut estimer à 10-20 le nombre d'oiseaux hivernant en Lozère. Régulière jusque fin avril puis départ très visible en mai et retours en octobre après un petit estivage : 1 oiseau sur l'Aubrac, 1 à Naussac. Généralement vues à l'unité ou par paire, un petit dortoir sur l'Aubrac regroupe 9 oiseaux le 10/12 (RD). L'absence générale de l'espèce sur Naussac tout comme du Héron cendré est anormale et indique clairement des tirs illégaux.



Grande aigrette, phénologie 2016




Grande aigrette, répartition 2016



Héron cendré (1ère année civile)  
Les Salelles, 18/10/16  
D. Bonnet

**HÉRON CENDRÉ** (*Ardea cinerea*) - **N loc., MH. Comm.** - 503 données. 1 seule colonie active sur les 3 habituelles : celle de Florac était inoccupée cette année et non relocalisée (dérangement ?), celle de Chirac était inoccupée et reste les 2 nids de Langogne avec au moins deux poussins fin juin (RD). Max de 21 en septembre à Booz lors de la vidange du plan d'eau qui piège de nombreux poissons dans les myriophylles.

**HÉRON POURPRÉ** (*Ardea purpurea*) - **M, rég, rare** - 1 donnée. Très petite année ! 1 le 13/04 à Booz (FLe).



Cigogne noire  
répartition 2016

**CIGOGNE NOIRE** (*Ciconia nigra*) - **M, rég.** - 20 données pour 31 oiseaux : 14 données pour 22 oiseaux du 01/03 au 05/06 (dont 7 pour mars) pour un max de 6 le 02/03 à Fontans (DBi) puis 6 données pour 9 oiseaux du 19/08 au 26/09.

**CIGOGNE BLANCHE** (*Ciconia ciconia*) - **M, rég.** - 11 données pour 13 oiseaux. 3 données du 03 au 13/04 pour 53 oiseaux dont 51 le 03/04 au Chastel-Nouvel (IM, JPM) puis 8 données du 11/08 au 08/09 pour 76 oiseaux dont 52 le 19/08 se posant au Buisson (G. CONSTANT) mais 48 repartent le lendemain : 1 stationne un jour de plus, 2 s'électrocutent et une (baguee poussin à Helgoland, Allemagne le 15/06/2016) est blessée par une vache, emmenée au centre de soins de Millau (info C. GIRAL/ONCFS) d'où elle sera relâchée le 07/09 (info JC. Austruy -CRSFSC).

**BONDRÉE APIVORE** (*Pernis apivorus*) - **NM, ass Comm.** - 137 données.

Du 16/04 au 02/10. Peu noté en migration cette année pour un max de 91 le 25/08 au sommet de l'Aigoual juste au-dessus des badauds indifférents à la beauté du spectacle (FLe).

Parades claquées du 15/05 au 07/07 et 1 seule reproduction certaine au milieu de ce printemps arrosé peu favorable à l'espèce : 1 jeune quémante le 13/08 à Saint-Germain-du-Teil (FLe), site habituel de reproduction.

**ÉLANION BLANC** (*Elanus caeruleus*) - **NM, rare** - 26 données. Le couple reproducteur présent en 2015 au Masegros n'est pas revenu cette année. Une série d'observations concerne le secteur des Cheyrouses sur le causse de Sauveterre où personne n'est passé en mai-juin : 1 oiseau est découvert le 11/07

(M. DOUADY, R. JARDIN) puis un jeune le 12/07... et la présence d'un couple qui parade et s'accouple est notée jusqu'au 16/09 sans qu'une reproduction soit observée. Le jeune est sans doute issu de ce couple (la coïncidence serait grande) avec un envol estimé fin juin pour une arrivée des adultes mi-mars. Cela fait donc la troisième année consécutive que la reproduction de l'espèce est avérée sur le département (très très probable en 2014 et 2016).




Bondrée apivore  
St-Maurice-de-Ventalon  
28/08/16, A. Fleixas

**MILAN NOIR** (*Milvus migrans*) - **NM, ass. Comm.** - 478 données (536 en 2015). Du 04/03 au 25/09. Beau passage pré-nuptial d'au moins **2020 oiseaux** sur le département et record au Puech Debon avec **1628** oiseaux en 30 heures (suivi faible) dont 1165 en 2 jours : 359 en 2h le 26/03 et **806** en 4 h le 27/03 (FLe).

Parades diverses du 24/03 au 28/06. Sept nichées repérées (jusqu'à 1220 m sur l'Aubrac) dont 2 avec chacune 2 jeunes à l'envol. Omniprésent dans l'ouest

du département, ses comportements ne sont pas assez suivis et nombre de nichées nous échappent sans doute. Le passage post-nuptial passe plus inaperçu et ne fournit que 359 oiseaux en migration pour un max de 78 à Grèzes le 06/08 (MLC, RD).



Milan noir  
reproduction 2016



Milan noir  
20/07/16, St-Pierre-de-Nogaret  
G. Tolmos

**MILAN ROYAL** (*Milvus milvus*) - NM (H) ass. comm. - 1410 données (1402 en 2015).

Au Puech Debon : migration du 20/02 au 28/03 pour un max de 154 le 25/02 (total 271) et du 17/09 au 19/11 pour un max de 133 le 08/10 (total 465).

Le comptage national de mi-janvier donne 37 oiseaux à Saint-Pierre-de-Nogaret et aucun ailleurs.

Jean-Luc Bigorne, coordinateur départemental sur les busards communique les résultats 2016 :

Sur les 19 sites contrôlés, 18 étaient occupés et 17 couples nichèrent, dont 12 (pour une quinzaine de couples présents) sur la zone-échantillon de 100 km<sup>2</sup> au Nord-Ouest de la Margeride. La répartition géographique est la suivante : 15 sites occupés et suivis dans l'Ouest de la Margeride et 3 dans les vallées du Lot et de la

Jourdan. Au total, le taux d'échec est de 41% et le succès reproducteur de 1,1. Les conditions météorologiques furent défavorables aux périodes sensibles de la reproduction avec notamment un important retard des premières fauches sur les hauts plateaux, celles-ci coïncidant en temps normal avec les premiers nourrissages des poussins. L'année 2016 est aussi une année crash en campagnols dans de nombreux secteurs du nord de la Lozère. La totalité des échecs répertoriés eut lieu sur ces hauts plateaux de la Margeride. Les couples localisés sur les contreforts et dans les vallées eurent de meilleurs résultats avec premiers envols des jeunes le 28/06 et derniers fin juillet/ début août.



Milan royal  
Le Moulinet, 10/10/16  
R. Destre

**GYPAÈTE BARBU** (*Gypaetus barbatus*) - réintroduit en 2011 - 37 données.

2 jeunes gypaètes furent relâchés cette année en Lozère :

- Cayla, femelle qui prit normalement son envol (cf photo jointe) et Aigoual qui décéda suite à la morsure d'une Vipère en juin.

En outre, au moins 4 oiseaux fréquentèrent les Grands causses en 2016 (infos Faune-LR et site LPO [rapaces.lpo.fr/gypaetes](http://rapaces.lpo.fr/gypaetes)).


- Layrou (lâché en 2013 en Aveyron) est observé régulièrement en 2016 sur les causses (principalement le Méjean) qu'il ne quitte plus après sa mésaventure qui lui valut quelques plombs... fera-t-il partie du premier couple nicheur dans les grands causses ?

- Basalte (lâché en 2012 en Lozère) est le doyen des gypaètes caussenards et semble être resté fidèle aux causses en 2015 même si son identification est délicate puisqu'il n'a plus ni balise ni marquage alaire. Il fait sans doute partie des deux oiseaux au plumage immature régulièrement observés sur le Méjean (avec Layrou).

- Cazals (lâchée en 2015 en Aveyron) est restée dans les Grands causses. Elle a fait l'objet de plusieurs sauvetages successifs entre janvier et juillet 2016 et n'a pas réussi à reprendre son envol avec succès. Elle rejoint finalement le réseau international d'élevage en captivité des Gypaètes barbus.

- Larzac (lâché en 2015 en Aveyron) est resté dans la région jusqu'en juin 2016 avant de partir au nord jusqu'au Schleswig-Holstein où son cadavre fut retrouvé sous une ligne électrique.

Avec ces déboires bien durs au moins 3 oiseaux survolent actuellement le ciel caussenard pour 10 oiseaux relâchés (mais 2 encore en vie partis sous d'autres cieux).



Gypaète barbu  
répartition 2016



Gypaète barbu (Cayla)  
causse Méjean, 21/08/16  
P. Foulquier



Gypaète barbu  
périple d'Adonis, 2014-2016

Quelques nouvelles et péripéties parfois tristes des gypaètes caussenards lâchés depuis 2012 dans les Grands causses en Lozère ou Aveyron :

- Adonis (lâché en 2014 en Lozère) est resté dans les causses jusqu'à début mai 2015 puis s'est beaucoup promené en France et en Europe (cf carte extraite du site de la LPO [rapaces.lpo.fr](http://rapaces.lpo.fr)) jusqu'en Roumanie où sa balise cessa d'émettre avant d'être revu en France dans la Drôme en 2016).

- Jacinthe (femelle lâchée en 2014 en Lozère) n'émet plus depuis le 29/09/2014 et ne fut pas réobservée...
- Dourbie (lâchée en 2013 en Aveyron) est morte en 2013 en percutant une ligne électrique.
- Cardabelle (lâchée en 2012 en Lozère) : dernière observation en mai 2016 dans les Pyrénées.

**VAUTOUR PERCNOPTÈRE** (*Neophron percnopterus*) - **Estivant N, loc.** - 21 données. Du 03/04 au 08/09.

Hors secteurs traditionnels causses/vallée du Lot, observé le 29/04 à Pied-de-Borne (AFé). Sur la région Grands causses, 1 couple en Aveyron et 1 en Lozère avec chacun une ponte et un jeune à l'envol (infos Philippe Lécuyer/LPO Grands Causses).

**VAUTOUR FAUVE** (*Gyps fulvus*) - **N séd., loc.** - 847 données.

Vu partout sur le département, de plus en plus régulier sur le Mont Lozère et la Margeride avec des oiseaux en vadrouille notamment en été et semblant concerner surtout des immatures en dispersion.

Bilan de la reproduction 2016 (infos Philippe Lécuyer/LPO Grands Causses) :


La colonie globale des Grands Causses (Aveyron, Lozère) donne : **530** couples qui ont pondu pour **418** jeunes à l'envol. 51 jeunes bagués au nid (2015 : 498 couples pondteurs, entre 370 et 375 jeunes à l'envol)



Vautour fauve  
Gorges de la Jonte, 28/12/16, D. Bonnet



Vautour moine  
La Malène, 15/03/16, F.Legendre



Vautour moine  
répartition 2016

**VAUTOUR MOINE** (*Aegypius monachus*) - **N séd., loc.** - 109 données. Contrairement au fauve, sort peu du domaine caussenard (et vallées adjacentes jusqu'aux gorges de l'Enfer au nord) hormis 1 au sommet de Finiels, Mont Lozère le 29/08 (FLe).

Bilan de la reproduction 2016 (infos Philippe Lécuyer/LPO Grands Causses) :

Il y eut 20 couples (21 en 2015) qui pondirent pour 14 jeunes à l'envol, tous bagués au nid. L'espèce semble marquer le pas depuis quelques années et semble ne plus guère progresser à moins que des couples passent inaperçus.

**CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC** (*Circaetus gallicus*) - **NM, comm.** - 601 données. Du 12/03 au 05/10.

Jean-Pierre Malafosse nous fait part du suivi 2016 sur la zone parc national des Cévennes et alentours.

Il y eut 66 sites contrôlés sur 179 connus (37 %) : 3 sites non occupés seulement (97 % de taux d'occupation).

44 couples suivis pour la reproduction : Ponte 35/41 couples = 0,89 ; Eclosion 25/40 couples = 0,62 ; Envol 20/40 couples = 0,45 juv à l'envol (pas terrible).  
Moyenne sur 25 ans : 0,53 j/couple.


Date moyenne de ponte 2016 : 19 avril. Moyenne sur 22 ans : 14 avril. Rappel (bonnes années de repro) 2014 et 2015 : 10 et 11 avril.

Le doyen Lozérien est revu sur son site de reproduction à l'âge de 20ans ! Un jeune né en 2014 sur Ispagnac est observé en Allemagne centrale en 2015 (7ème oiseau revu en 2ème année civile de retour en Europe pour notre population).

**BUSARD DES ROSEAUX** (*Circus aeruginosus*) - **M rég.** - 51 données pour 63 oiseaux. 29 oiseaux du 19/03 au 26/05 puis 34 du 12/08 au 07/10 surtout en S1 et S2.



Circaète Jean-Le-blanc Montrodat,  
29/05/16  
L. Destrade




Busard des roseaux  
répartition 2016

**BUSARD SAINT-MARTIN** (*Circus cyaneus*) - NMH - 243 données. Quelques oiseaux en janvier en dortoirs entre 2 et 4 a minima mais rien de précis ainsi qu'en décembre avec 3 dortoirs au moins entre 3 et 5 oiseaux sur l'Aubrac, Le Massegros et Montbel.

Jean-Luc Bigorne, coordinateur départemental sur les busards communique les résultats 2016 :

Sur les 7 couples observés, 3 furent suivis et nichèrent dans des milieux semi-naturels. Deux échouèrent et le troisième donna 1 seul jeune à l'envol.



Busard cendré  
Reproduction 2016



Busard cendré  
Les Bondons, 12/08/16  
P. Thouvenot

**BUSARD CENDRÉ** (*Circus pygargus*) - NM - 226 données. Du 12/04 au 07/09. Deux dortoirs postnuptiaux contiennent 14 oiseaux le 16/08 à Chanet, cause Méjean (FLe) et 9 le 10/08 à Arzenc-de-Randon (JLB).

Jean-Luc Bigorne, coordinateur départemental sur les busards communique les résultats 2016 :

2016 fut une année très difficile combinant un printemps pluvieux (record depuis 50 ans) et un large déficit en rongeurs (phénomène naturel après pullulation) et de ce fait moins de couples nicheurs, beaucoup de pontes tardives, des pontes abandonnées, un record de nids dans les cultures (3/4 pour le Busard cendré), un manque de bénévoles, un agriculteur refusant la protection et deux autres modifiant la position des jalons dans les prairies, la perte de 7 poussins dans et en dehors des protections....

Sur les 32 couples observés, 26 furent suivis et seulement 19 nichèrent. Onze échouèrent et les 8 autres donnèrent 25 jeunes à l'envol dont 13 grâce aux protections (dont 3 prédatés lors de leurs sorties) et un couple fut protégé d'un dérangement significatif en mai (Trèfle Lozérien).


Dans le Parc National des Cévennes, un seul couple fut trouvé nicheur, dans une prairie artificielle, et 4 autres couples sont nicheurs probables. La population lozérienne reste, malgré un investissement humain conséquent, une population puits avec un succès reproducteur oscillant entre 1,3 et 1,6. Sans les

interventions, ce succès reproducteur se situerait selon les années entre 0,6 et 1,24 pour une population estimée entre 30 et 45 couples nicheurs. Cette année, le succès reproducteur est de 1,32 et le taux d'échec de 58 %.

**AUTOUR DES PALOMBES** (*Accipiter gentilis*) - N séd., M - 48 données. 4 parades notées du 6 au 23/03 mais pas de reproduction certaine observée.

**ÉPERVIER D'EUROPE** (*Accipiter nisus*) - N séd., M - 344 données. Passages habituels de fin février à fin mars puis de fin août à mi-novembre sans jour remarquable (max de 6 par session au Puech Debon). Parades du 12/03 au 11/05 et nourrissages de juin au 19/08 sans nichée observée.

**BUSE VARIABLE** (*Buteo buteo*) - N séd., MH comm. - 1561 données. Aucun rassemblement hivernal notable n'est observé faute de petits rongeurs. Au Puech Debon, passages notés du 20/02 au 28/03 pour des max de 63, 46 et 46 les 24-25/02 et 06/03 (total 173) puis du 17/09 au 19/11 pour des max de 69 et 58 les 08/10 et 06/11 (total 296). Les parades commencent classiquement fin janvier pour culminer en mars/avril et s'achever en mai : 8 nichées notées produisent au moins 12 jeunes (1-2) du 26/06 au 02/08.



Autour des palombes  
reproduction 2016



Epervier d'Europe  
St-Alban-sur-Limagnole, 18/07/16  
J-L. Brunel



Epervier d'Europe  
Aumont-Aubrac, 18/07/16  
G. Tolmos



Buse variable  
Rimeize, 09/07/16  
M. Quiot


**AIGLE CRIARD x POMARIN** (*Aquila clanga x pomarina*) - **M, exc.**- 13 données. Un oiseau lituanien bagué poussin au nid en 2015, parti de Zhilino, Lituanie le 25/09/2016 passe en Lozère les 7 et 08/10 en traversant l'Aubrac : entré par Chaucahilles le 07/10 à 16h environ, il passe la nuit dans la forêt de La Blatte et repart vers 10h25 pour passer en Aveyron une demi-heure plus tard au niveau de Trélans en passant non loin du col de Bonnetcombe. Il hiverne au Sénégal en Casamance entre Goutou et Sakar où il arrive le 16/11/2016 après avoir passé Gibraltar le 07/11 et traversé l'Atlas et le Sahara.

**AIGLE ROYAL** (*Aquila chrysaetos*) - **N séd., loc.**- 155 données. Est de plus en plus souvent vu sur le nord Lozère où des oiseaux immatures traînent, prémices d'installations futures ou en cours.


Jean-Pierre Malafosse communique les résultats 2016 :

Pour la Lozère, 10 couples sont connus et il y en a 5 supplémentaires à rechercher. Seulement 3 jeunes furent produits en 2016 dans la Jonte, le Tarnon et la forêt de Fontmort. Certains couples n'ont même pas pondu notamment dans la vallée du Lot.

Un point ailleurs dans le Massif-Central : Gard : 6 couples et 3 jeunes. Aveyron : 6 couples et 5 jeunes. Hérault : 9 couples et 4 jeunes. Aude : 2 couples et 1 jeune. Ardèche : 4 couples et 1 jeune. Haute Loire : 1 couple à trouver (accouplement noté). Cantal : 2 couples (immatures) en formation. Population sud Massif central (y compris Aude) : 40 couples certains + 5 potentiels.




*Aigle royal*  
répartition 2016




*Aigle royal 2ème année civile*  
Gorges de la Jonte, 24/01/16, J. PINAUD

**AIGLE BOTTÉ** (*Aquila pennata*) - **N loc, M** - 31 données (44 en 2015) : du 27/03 au 17/09. Pas de reproduction suivie cette année mais des parades ou présences répétées notées à La Canourgue, Saint-Bonnet-de-Chirac et Marvejols et également en juin vers Les Bondons, secteur où l'espèce est vue régulièrement. L'espèce semble bien discrètement en expansion. Estimation de la population 5-10 couples entre Lot, Truyère, Bès et Tarn.




*Aigle botté, mâle adulte*  
St-Germain-du-Teil, 23/08/16, F. Legendre



*Aigle botté*  
reproduction 1995-2016

**BALBUZARD PÊCHEUR** (*Pandion haliaetus*) - **M rég.** - 45 données. 18 oiseaux du 21/03 au 14/05 pour un max de 3 le 21/03 au Malzieu (MiQ) puis 36 oiseaux du 18/07 au **16/11** (JBo) pour un max de 6 le 15/09 à Naussac (FLe) + 2 le même jour à Charpal (JLB) et 18 individus cette deuxième décennie de septembre (S2). Le Balbuzard est noté de plus en plus tard au printemps puis de plus en plus tôt en été. Il est également noté de plus en plus tard en postnuptial, quasiment annuellement en novembre dorénavant.



Balbuzard pêcheur  
répartition 2016

**FAUCON CRÉCERELLETTE** (*Falco naumanni*) - **Visiteur rég.** - 102 données du 03/08 au 25/09 principalement sur le causse Méjean. Du mieux dans la dispersion

postnuptiale de l'espèce cette année et énième changement de dortoir ! Ils sont 70 le 03/08, 150 le 14/08, 350 le 23/08, 500 le 26/08 (plus grand groupe depuis 2012), encore 300 le 31/08 (comptage national) et 24 le 24/09.

En dehors du causse Méjean, 1 mâle stationne au col de Bonnecombe du 24/08 au 01/09, 11 sont en chasse aux sources du Tarn, Mont Lozère le 29/08 (FLe), 1 au sommet de Finiels le 04/09 et le dernier au Pompidou le 25/09 (PFe).

**FAUCON CRÉCERELLE** (*Falco tinnunculus*) - **NMH comm.** - 953 données. Migration notée au Puech Debon du 24/02 au 10/04 pour un max de 11 le 28/03 puis du 2 au 26/10. Seules 27 données se rapportent à une reproduction certaine : 9 nichées complètes recensées donnent 26 poussins (4x2, 2x3, 3x4) entre le 29/04 et le 13/08 avec envol dès le 29/04 aux Vignes (MiQ) et seconde nichée à l'envol le 13/08 au Massegros (FLe).

**FAUCON KOBEZ** (*Falco vespertinus*) - **M, assez rare mais rég** - 7 données. Très petite année : 4 du 6 au 12/05 (3 mâles, 1 femelle) puis 1 lac du 04 au **16/09** autour de Sauveterre (EBa) et 1 autre lac dans le dortoir de Faucons crécerellettes le 07/09 (D. Roux).

**FAUCON ÉMERILLON** (*Falco columbarius*) - **MH rég.** - 22 données. 11 données du 23/01 au 25/04 puis 11 données du 06/10 au 30/12 pour max de 2 en session de migration au Puech Debon.

**FAUCON HOBEREAU** (*Falco subbuteo*) - **NM** - 51 données. Du 12/04 au 02/10. Aucune reproduction certaine mais 8 possibles ou probables, uniquement sur la moitié ouest du département.

**FAUCON D'ÉLÉONORE** (*Falco eleonora*) - **M rare** - 2 données. 1 le 02/06 sur le Méjean (M. SCHREIBER) et 1 le 11/07 sur le Sauveterre (FLe).

**FAUCON PÈLERIN** (*Falco peregrinus*) - **N séd., MH** - 153 données.

Jean-Pierre Malafosse qui coordonne le suivi pour la Lozère nous communique les résultats 2016 :

31 sites furent contrôlés pour 21 occupés et 12 reproducteurs qui donnèrent 18 jeunes à l'envol (3x1, 3x2, 3x3) soit 1,2 j/couple ce qui est peu.



Marouette ponctuée  
Booz, 06/09/16  
F. Legendre



Gallinule poule d'Eau  
Les Sallèles, 18/10/16  
D. Bonnet

**RÂLE D'EAU** (*Rallus aquaticus*) - **N rare, M trans.** - 8 données. Du 06/04 au 28/10. Deux seuls couples potentiels à Usanges et aux Salhiens cette année. Noté également aux passages à Ganivet et La Canourgue.

**MAROUETTE PONCTUÉE** (*Porzana porzana*) - **N rare, M trans.** - 2 données. Une lac les 5 et 06/09 à Booz (FLe), espèce pas notée en Lozère depuis 2009 et neuvième donnée départementale.

**GALLINULE POULE D'EAU** (*Gallinula chloropus*) - **N loc., M** - 65 données. Notée en janvier à Banassac et en décembre à Ganivet, Naussac et Saint-Alban. 4 nichées recensées du 30/05 au 14/07 à Saint-Germain-du-Teil et à Booz donnent 14 poussins au moins de 2x2, 4 et 6 poussins dont deux couvées pour l'un des couples. Nicheuse probable également à Saint-Alban, Usanges et Naussac.



- Faucon crécerellette, Méjean, 07/09/16, D. Roux
- Faucon crécerelle (accouplement), 25/04/16, Chanac, A. Brocard
- Faucon kobez 1ère ac Sauveterre, 04/09/16, E. Barthez
- Faucon émerillon fem., Malbouzon, 07/04/16, R. Destre
- Faucon crécerellette, Méjean, 27/8/16, P. Feldmann
- Faucons kobez à gauche et crécerellette à droite, Méjean, 07/09/16, D. Roux
- Faucon pèlerin, Les Bessons, 20/10/16, M. Quiot
- Faucon crécerellette, Méjean, 25/08/16, F. Legendre
- Faucon crécerelle, 27/08/16, Méjean, P. Feldmann
- Faucon crécerelle et Hibou des marais, Saint-Andéol, 24/01/16, T. Aucouturier

**FOULQUE MACROULE** (*Fulica atra*) - **N loc.**, **MH** - 29 données. Après hivernage et reproduction à Naussac en 2015 (pas notée en Lozère depuis bien longtemps), le petit plan d'eau de Naussac où se développaient les herbiers nécessaires à cette espèce fut quasiment mis à sec jusque tard dans le printemps ne fixant pas de foulque qui n'a donc pas reniché cette année. Retour sur ce site de 5 oiseaux le 28/08 puis de 14-15 oiseaux partis pour hiverner avec le retour des herbiers. Également 2 en halte le 10/04 à Booz mais sans suite puis 1 sur l'Aubrac le 27/08 (FLe), belle concordance de dates avec l'arrivée des oiseaux de Naussac.

**GRUE CENDRÉE** (*Grus grus*) - **M irrég.** - 18 données pour environ 373 oiseaux. 7 données du 06/03 au 03/04

pour un max de 100 en vol bas le 06/03 à Ribennes (JLB). 10 données du 30/10 au 02/12 pour un max de 100 se posant le 28/11 à Naussac (GCh). A noter cette observation rare de 16 oiseaux passant au col de Finiels le 25/11 (DBu). La fin novembre est la période qui "produit" le plus de grues depuis quelques années.



Grue cendrée  
répartition 2016



Grue cendrée  
Rieutort-de-Randon, 03/04/16, R. Destre

**HUITRIER PIE** (*Haematopus ostralegus*) - **M, acc.** - 1 donnée. Seconde mention départementale avec 1 oiseau à Naussac le 20/05 (JBo). La première mention datait du 14 au 25/05/1985 à Naussac également !



Echasse blanche  
Booz, 03/04/16, R. Destre



Echasse blanche  
Booz, 13/04/16, F. Legendre

**ÉCHASSE BLANCHE** (*Himantopus himantopus*) - **M, rare** - 6 données. Du 25/03 au 17/04. A Booz, 4 données : 1 m du 25 au 27/03 (FLe), 1 f le 03/04 (RD, FLe) et 8 le 13/04 (FLe). Également 1 le 03/04 (anonyme) sur le Méjean et 2 le 17/04 à Usanges (FLe).

**Addenda synthèse 2015 : AVOCETTE ÉLÉGANTE** (*Himantopus himantopus*) - **M, rare** - 2 données : pas notée depuis 2012 : 4 le 29/03/2015 au Malzieu (P. BARROT) et 15 le 02/05 à Naussac (Jbo).

**OEDICNÈME CRIARD** (*Burhinus oediconemus*) - **N loc.**, **M** - 71 données. Du 10/04 au 21/09 uniquement sur les causses comme il se doit. Un couple est accompagné de deux jeunes le 03/06 sur le Méjean (FLe). Max de 12 le 05/07 autour des Redoundous, cause Méjean dont au moins 3 jeunes.

**GLARÉOLE À COLLIER** (*Glareola pratincola*) - **M, exc.** - 1 donnée. Première mention lozérienne incroyable d'un oiseau en chasse le 03/04 à la gravière de La Chazette au Malzieu (R. MONLONG fide MiQ).

**PETIT GRAVELOT** (*Charadrius dubius*) - **N loc.**, **M** - 13 données (28 en 2015). Du 26/03 au 05/08 seulement. 1 couple à Usanges et au moins 3 sur Naussac, sans succès connu. Une observation atypique d'un oiseau posé sur une piste du Méjean le 05/08 (B. JEANNIN).

**GRAND GRAVELOT** (*Charadrius haticula*) - **M rare** - 6 données. Naussac : 4 à l'unité du 31/03 au 13/05 et les 15 et 22/09 pour un max de 7 le 15/09 à Naussac (FLe).



Glareole à collier  
Le Malzieu, 03/04/16  
R. Monlong

**PLUVIER GUIGNARD** (*Charadrius morinellus*) - **M, assez comm. Local.** - 42 données pour 226 oiseaux (44 oiseaux en 2015). 2 le 05/05 au sommet de Finiels (FLe), seule mention pré-nuptiale. Ensuite il y a 41 données pour 224 oiseaux entre le 16/08 et le 29/09 pour un max de 30 le 26/08 au sommet de Finiels (PLu) d'où viendront l'essentiel des données, les pelouses du causse Méjean (serre de Fourcat ou Mont Gargo) étant très épaisses cette année sans doute à cause du printemps très humide et de la baisse du pâturage extensif.

Beaucoup d'oiseaux sont sans doute passés inaperçus notamment mi-août qui connut un démarrage de la migration fort cette année avec déjà 16 individus le 16/08 sur le Méjean, haute valeur pour un début de saison.



Pluvier guignard  
sommet de Finiels, 05/05/16  
F.Legendre

**PLUVIER DORÉ** (*Pluvialis apricaria*) - **M, rare** - 2 données. 4 le 24/02 et 1 le 07/03 au Massegros, très petite année avec aucune donnée sur l'Aubrac.

**PLUVIER AGENTÉ** (*Pluvialis squatarola*) - **M, rare** - 2 données. 4 le 18/09 à Naussac (EBa, MLC, FLe) et 1 le 23/09 sur la lavogne du Fâisse près de Villeneuve, Vébron, causse Méjean (E. RUCHON).



Vanneau huppé  
Malbouzon, 25/04/16, M. Quiot

**VANNEAU HUPPÉ** (*Vanellus vanellus*) - **N loc., MH peu comm.** - 93 données. Passage du 29/01 au 22/03 mais surtout dernière décade de février pour un max de 52 et 68 les 24 et 26/02 au Puech Debon (FLe). Parades des couples de l'Aubrac du 11/03 au 10/04 pour un maximum de 13 couples sur 6 secteurs... mais seulement 5-10 jeunes observés début juin, peut-être faute de suivi et d'un printemps très pluvieux et frais. Premiers migrateurs le 11/08 et quelques oiseaux passant en petits groupes (max 25) mais souvent à l'unité jusqu'à début janvier.

**BÉCASSEAU MAUBÈCHE** (*Calidris canutus*) - **M, très rare.** - 1 donnée. 1 le 31/03 au lac des Salhiens (RD) faisant suite aux 2 du 28/03/2015 au même endroit. Huitième mention départementale.

**BÉCASSEAU SANDERLING** (*Calidris alba*) - **M, rare.** - 2 données. 9ème et 10ème mentions départementales : 1 le 09/05 (MLC, FLe) et 2 le 19/09 (EBa, MLC, FLe) à Naussac.

**BÉCASSEAU MINUTE** (*Calidris minuta*) - **M, rare.** - 1 donnée. 1 le 09/05 à Naussac (MLC, FLe).

**BÉCASSEAU DE TEMMINCK** (*Calidris temminckii*) - **M, très rare.** - 1 donnée. Troisième mention départementale : 1 le 15/09 en queue de lac (FLe).

**BÉCASSEAU COCORLI** (*Calidris ferruginea*) - **M, rare.** - 1 donnée. 1 le 15/09 à Naussac (FLe).

**BÉCASSEAU VARIABLE** (*Calidris alpina*) - **M, rare.** - 12 données pour 36 oiseaux ! Du 27/08 au 24/09 pour un très beau max départemental de 18 le 24/09 à Naussac (PTh).

**COMBATTANT VARIE** (*Philomachus pugnax*) - **M, peu comm.** - 2 données. 2 le 17/04 à Usanges et 1 le 06/10 à Montbel dans un labour (FLe).

**BÉCASSINE SOURDE** (*Lymnocryptes minutus*) - **MH, peu comm.** - 79 données (pour 110 total en région en 2016). 76 données du 01/03 au 27/04 pour 179 oiseaux vus et/ou bagués (info C. Rieutort FDC/48) dont 42 le 06/04 sur plusieurs sites de l'Aubrac pour un max de 15 sur la même place ce jour là (sinon 1-4 par place) mais avec un pic de passage la seconde décade d'avril (74 oiseaux). En automne, pas d'infos de la FDC et seulement 2 oiseaux notés les 8 et 15/10 sur l'Aubrac toujours.

Une bécassine sourde a été prélevée le 19 octobre 2016 aux Salces. 34 jours avant, elle avait été capturée et baguée en Russie ! Cet oiseau d'environ 50 grammes a fait 3012 km en 34 jours ! (info site internet FDC48).

**BÉCASSINE DES MARAIS** (*Gallinago gallinago*) - **N rarissime, M comm H rare** - 84 données. Passage du 22/02 au 27/04 seulement et aucune mention hivernale malgré la douceur globale de l'hiver. Net pic de passage en mars 3 et avril 1-2 (total 155 oiseaux) dont 12 le 06/04 sur la même place sur l'Aubrac. En postnuptial notée du 11/08 au 16/12 pour un max de 16 sur la même place le 10/09 sur l'Aubrac (RD). Deux sites favorables pour la reproduction accueillent des oiseaux au comportement nuptial en vols circulaires sans chants cependant... non confirmés par la suite par manque peut-être de suivi dans un printemps très humide peu favorable aux sorties sur l'Aubrac souvent bouché et aux tourbières humides partout rendant l'Aubrac notamment favorable en de multiples endroits.



Bécassine des marais  
Bonnecombe, 06/10/16, R. Destre

**BÉCASSE DES BOIS** (*Scolopax rusticola*) - **N loc., MH** - 65 données. 2 données en janvier, 4 en février, 0 en mars, 2 croulant en avril (JLB), 0 en mai, 6 croulant le 22/06 à Estables (MiQ)... le suivi nuptial est aléatoire et dépend de la motivation des naturalistes. Puis il y a 1 donnée en août, 0 en septembre puis 55 du 24/10 au 28/12 pour un max de 8 le 03/12 sur l'Aubrac (StC).



Bécasse des bois  
Estables, 22/06/16, M. Quiot

**BARGE À QUEUE NOIRE** (*Limosa limosa*) - **M, très rare** - 1 donnée. 1 le 06/04 aux Salhiens (RD), sixième mention départementale (précédente le 10/08/2015).


**COURLIS CORLIEU** (*Numenius phaeopus*) - **N loc., M rare** - 1 donnée. 1 le 17/04 en halte à Montbel (FLe).

**COURLIS CENDRÉ** (*Numenius arquata*) - **N loc., M rare** - 48 données (63 en 2015). Noté uniquement sur l'Aubrac du 06/03 au 14/06 pour une population d'au moins 10 couples (20-25 estimés) sans suivi particulier cette année. Parades du 14/03 au 07/06 mais à partir de fin avril les oiseaux se calment et ne sont plus vus en couple la plupart du temps, seul le mâle paradant encore et chargeant tout ce qui passe augurant de nichées en cours, comportements très agressifs en mai et juin avec sans doute des jeunes au sol, aucun n'étant cependant observé (exercice ardu dans les hautes herbes de l'Aubrac). Derniers nicheurs le 16/06. 1 seul migrateur le 17/04 à Naussac (JBo). Comme à l'accoutumée, les oiseaux disparaissent en juin sitôt les jeunes aptes à voler. 1 oiseau le 13/08 et 1 le 11/09 sont les seuls migrateurs détectés.

**CHEVALIER ARLEQUIN** (*Tringa erythropus*) - **M rég.** - 3 données. 1 du 11 au 13/04 à Montbel (RD) et 1 le 18/08 à Rocles (F. DUCORDEAU) sans doute en provenance de Naussac tout proche.

**CHEVALIER GAMBETTE** (*Tringa totanus*) - **M rég.** - 18 données. 17 données du 31/03 au 19/05 pour un max de 22 le 17/04 à Usanges (FLe) puis une seule donnée postnuptiale (???) de 1 oiseau le 05/07 à Naussac (JBo).

**CHEVALIER ABOYEUR** (*Tringa nebularia*) - **M, rég** - 21 données. 9 données du 31/03 au 19/05 pour un max de 17 le 18/04 au lac du Moulinet (PTh) puis 13 données du 27/08 au 24/11 sans max notable.



Chevalier culblanc  
phénologie 2016

**CHEVALIER CULBLANC** (*Tringa ochropus*) - **M rég.** - 78 données. Après un premier hivernage lozérien du 29/11/2014 au 13/03/2015, un oiseau hiverne à nouveau (potentiellement le même) du 11/01 au 23/03 au moins. Le passage prénuptial s'étale du 02/03 au 29/04 pour des max de 8 oiseaux à plusieurs reprises avec un net pic de données la première décade d'avril. Le passage postnuptial s'étale du 14/06 au 14/11.

**CHEVALIER SYLVAIN** (*Tringa glareola*) - **M rég.** - 10 données. Du 02/04 au 07/05 pour un max de 17 le 07/05 à Usanges (FLe). Aucune mention postnuptiale.

**CHEVALIER GUIGNETTE** (*Actitis hypoleucos*) - **H rare, N loc., M rég. Comm.** - 89 données. Nouvel hivernage après un hiver sans, à Booz du 02/12 au 01/04. Première arrivée (tardive) de migrateurs le 04/04 et pic de passage début mai avec un max de 10 sur ce site le 03/05 (FLe) pour s'achever le 17/05. 5 reproductions



Tournepierre à collier  
Naussac, 24/09/16, P. Thouvenot

certaines entre le 12/06 et le 14/07 pour au moins 10 poussins (2x1, 1x2, 2x3) sur le Lot à La Canourgue et Le Monastier, au Buisson, à Fontanes et sur le lac de Naussac. Sans doute beaucoup d'autres passent-ils inaperçus... Passage postnuptial jusqu'au 18/10 seulement sans max notable.

**TOURNEPIERRE à COLLIER** (*Arenaria interpres*) - **M rég.** - 2 données. Huitième et neuvième mentions départementales. 2 le 18/09 (EBa, MLC, FLe) et 1 le **24/09** à Naussac (PTh).

**MOUETTE MÉLANOCÉPHALE** (*Larus melanocephalus*) - **M, rare** - 1 donnée. 1 le 09/05 à Naussac (MLC, FLe), septième mention départementale.

**MOUETTE PYGMÉE** (*Larus minutus*) - **M, rare** - 7 données. Uniquement à Naussac : 2 le 15/09, 1 les 17 et 18/09, 4 le 18/10 (JBo) et 1 le **16/12** (FLe), bonne série après une année blanche.

**MOUETTE RIEUSE** (*Larus ridibundus*) - **A niché, MH rég.** - 38 données. Moins rare cette année : notée tous les mois sauf janvier, février et août avec net passage en mars pour un max de 150 environ en un seul groupe migrateur le 26/03 au Puech Debon (FLe).

**GOÉLAND BRUN** (*Larus fuscus*) - **M, rég** - 7 données : 1 le 08/01 à Charpal (GTo), 2 le 22/02 à Naussac, **14** en migration au Puech Debon le 27/03, beau score pour la région, 2 le 17/04 à Naussac et 6 le 04/12 à Charpal (3 ssp intermedius, 1 ssp graellsii, 2 lac - FLe).




Mouette pygmée 1ère année civile  
Naussac, 17/09/16  
P. Thouvenot

**GOÉLAND LEUCOPHÉE** (*Larus michahellis*) - **N loc., MH** - 214 données. 172 à Naussac au comptage Wetland. Max de 301 le 17/04 sur la colonie de Naussac dont 281 adultes pour 72 couveurs présumés... mais aucun poussin ne sera observé en mai sans doute suite à des dérangements répétés par des pêcheurs (certains furent verbalisés) sur l'île malgré son statut de réserve à accès interdit. Seuls 4 jeunes furent notés le 30/06 et le 03/08 (GCh) issus d'une seconde ponte, de nicheurs tardifs ou de survivants. C'est donc une année quasiment blanche pour la reproduction de cette espèce sur ce lac qui accueille 60-70 nicheurs et produit 120 poussins/an environ.

Des adultes sont quotidiennement vus sur l'Aubrac ou à Charpal sans reproduction constatée ou supposée. Deux dortoirs hivernaux se constituent en

Lozère de 200 oiseaux à Naussac et de 300 à Charpal (en décembre avant qu'il soit gelé) selon les jours mais sans comptage simultané, difficile d'estimer la population hivernante car il y a de nombreux échanges entre les dortoirs.



Goéland leucopnée  
reproduction 2016



Guifette noire  
Naussac, 17/04/16  
F. Legendre

**STERNE PIERREGARIN** (*Sterna hirundo*) - **M, très rare** - 1 donnée. Dixième donnée lozérienne : 1 le 15/09 à Naussac (FLe).


**GUIFETTE MOUSTAC** (*Chlidonias niger*) - **M rég.** - 2 données. 2 le 17/04 à Naussac (FLe) et 10 le 12/05 au lac du Moulinet (Pth).

**GUIFETTE NOIRE** (*Chlidonias niger*) - **M rég.** - 13 données (1 en 2015). 7 données du 11/04 au 30/05 pour un max de 5 le 17/04 à Naussac (FLe) et vue également au Moulinet et à Booz. Ensuite 6 données du 03 au 24/09 toutes de Naussac avec 3 oiseaux qui stationnent.

**PIGEON BISET féral (*Columba livia*) - N ? Très rare en milieu rupestre naturel, peu commun en ville.**

- 21 données. L'absence de commentaires sur les plumages et les localisations ne permettent pas de faire la part entre des bisets retournés à l'état sauvage (population férale) de ceux toujours domestiqués. Il serait pourtant fort intéressant de pouvoir suivre une éventuelle implantation naturelle de cette espèce.

**PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) - NM, peu comm. - 96 données.** Du 25/02 au 11/11. Passage notable de mi-mars à mi-avril pour un max de 97 le 14/04 à Chanet, causse Méjean (FLe) puis en octobre sans troupes notables. Chants du 10/04 au 24/07 : niche soit en falaises dans les gorges calcaires soit dans des loges de Pic noir sur la Margeride. Pas de reproduction certaine.



Pigeon colombin  
reproduction 2016

**PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) - NM, ass. Comm. - 468 données.** Semble devenir moins rare en hiver avec : 15 données en janvier, 16 en février, 9 en décembre. Chant du 24/01 au 20/10 et reprise le 30/12 ! Passage classique en mars, max de 358 le 13/08 au Puech Debon (FLe). Deux rares données de reproduction sont obtenues : 2 jeunes au nid le 22/05 à Saint-Germain-du-Teil et 1 jeune juste volant le 21/09 sur le Méjean (FLe). Au Puech Debon, passage du 24/09 au 27/11 pour un total de 1413 oiseaux dont 389 le 12/11 et pic de passage fin octobre (FLe).



Pigeon ramier  
Palhers, 07/05/16,  
P. Thouvenot

**TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) - N séd. - 384 données.** Chants notés tous les mois même si ceux-ci sont intermittents d'octobre à février. Pas de max supérieur à 26 cette année. Seules 6 données concernant des reproductions certaines du 06/04 au 20/07 pour seulement 2 poussins notés les 06/04 (JBr) et le 15/07 (DBu). Bien qu'omniprésente, elle fait peu l'objet d'attention de la part des observateurs.

**TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) - N rare, M peu commun - 9 données.** Du 12/04 au 30/07 seulement. 6 chanteurs seulement sur le quart sud ouest du département comme d'habitude.

**COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) - NM comm. - 394 données.** Du 26/03 au 15/09. Chants jusqu'au 08/07. 7 données en juillet, 2 en août, 1 en septembre. 2 cas certains de reproduction : un jeune non émancipé le 27/06 à Marvejols (RD) et 1 jeune nourri par deux Pipits rousselines le 23/08 (date tardive !) sur le Méjean (EBa, FLe).

**COUCOU-GEAI (*Clamator glandarius*) - NM rare. - 3 données.** 1 les 27 et 30/06 sur le Méjean (FLe) et 1 le 15/08 sur le Sauveterre (RD).



Tourterelle des bois  
Montrodat, 29/05/16  
L. destrade



Coucou geai  
causse Méjean, 30/06/16  
F. Legendre



Coucou gris juv.  
Marvejols, 27/06/16  
R. Destre


**EFFRAIE DES CLOCHERS (*Tyto alba*) - Rare - 14 données (0 à 1 depuis 5 ans) :** la reconquête du département se dessine a priori avec notamment ; première reproduction certifiée depuis 2008 en Lozère avec 2 poussins à l'envol fin août aux Bories de Saint-Bonnet-de-Chirac dans une cavité de bâtiment aménagée en nichoir pour la Chevêche chez des particuliers sensibles et sensibilisés (collectif ALEPE). Merci à eux !!! Egalement des indices de présence à Felgère et à La Borie, Bourgs-sur-Colagne ; La Vachellerie, Fournels ; La Jasse, Saint-Martin-de-

Lansuscle ; Saint-Laurent-de-Muret et un oiseau sauvé de justesse tombé dans une cheminée bouchée en bas à Sinzelles, Fontanes le 29/09 (JBo), indiquant une dispersion d'oiseaux assez proches l'espèce n'allant pas très loin en moyenne. A suivre avec attention en 2017 ! A vos nichoirs...

**PETIT-DUC SCOPS** (*Otus scops*) - **NM** - 49 données. Du 02/04 au 15/09. Chants jusqu'au 11/09. Minimum de 24 chanteurs (23 en 2015, comptages non exhaustifs et relatifs), pas de reproduction certaine. Semble disparu pour le moment de la vallée du Lot/colagne aval (de Banassac à Marvejols).

En région : un hivernant au Crès-34 au moins depuis le 08/02 mais sans doute avant (R. DALLARD) puis du 14/03 à Leucate-11 (P. MASSE) au 15/09 en Lozère.

**GRAND-DUC D'EUROPE** (*Bubo bubo*) - **N séd.** - 33 données. 14 territoires recensés sans jeune observé cette année faute de suivi. Chant audible toute l'année.




Petit-duc Scops  
répartition 2016

**CHEVÊCHETTE D'EUROPE** (*Glaucidium passerinum*) - **N ?**, Très rare - 0 donnée. Attendue depuis quelques temps en Lozère après l'expansion géographique notée chez cette espèce dans le Massif-Central et sa présence avérée dans le Puy-de-Dôme, la Loire et plus proches, la Haute-Loire et l'Ardèche, la présence de l'espèce est confirmée en 2016 sur l'Aigoual (comm. B. Guérin lors conférence petites chouettes de montagne au PNC). A suivre et à rechercher partout !

**CHEVÊCHE D'ATHÉNA** (*Athene noctua*) - **N séd. Peu comm.** - 90 données. 22 territoires identifiés aléatoirement sans suivi particulier mais seulement 3 nichées recensées du 21/07 au 11/08 (tardif, dû au printemps pourri ?) pour au moins 5 poussins. Redevient plus fréquente depuis 5 ans, les hivers sans neige lui profitant sans doute.


**CHOUETTE HULOTTE** (*Strix aluco*) - **N séd., comm.** - 140 données. Des chanteurs toute l'année. Seules 3 nichées découvertes du 27/03 au 03/06 pour au moins 5 poussins.



Chevêche d'Athéna  
répartition 2016

**HIBOU MOYEN-DUC** (*Asio otus*) - **NMH** - 20 données (63 en 2015). Le dortoir habituel du Massegros compte 51 oiseaux le 07/02 mais seulement 2 en décembre, plus bas score depuis 2007 faute de rongeurs, déficit alimentaire classique après une pullulation comme quoi la nature est bien faite et n'a pas besoin de bromadiolone pour être "gérée". Un autre dortoir de 4 oiseaux au moins est trouvé fortuitement à Barjac en janvier. Chants et parades du 22/02 au 04/06. Il n'y a cette année qu'une seule mention de reproduction certaine de 3 juv le 30/07 à La Fage-Saint-Julien (GCh), certains secteurs habituels n'ayant fourni aucune nichée.

**HIBOU DES MARAIS** (*Asio flammeus*) - **HM, rare** - 37 données (46 en 2015) !!! Année nettement moins folle que 2015 hors normes et retour à une situation plus classique : en janvier, 5 oiseaux sur l'Aubrac, max 3 au Massegros et 1 vers Sauveterre. Dernier le 07/03 au Massegros (FLe)... puis aucun oiseau sur l'Aubrac où il avait niché les années précédentes. Retour d'oiseaux à l'unité à partir du 28/10 en deux sites sur l'Aubrac, 1 à Montbel et 1 au Massegros.



Nyctale de Tengmalm  
reproduction 1995-2016

**NYCTALE DE TENGMALM** (*Aegolius funereus*) - **N séd loc.** - 34 données (59 en 2015) dont 18 données sans contact lors de prospections ciblées.

Après une année record en Lozère avec au moins 17 sites occupés par 17 chanteurs (hors PNC) grâce à une bonne reproduction de rongeurs eux-mêmes présents grâce à une abondante production des conifères, 2016 ne s'inscrit pas dans la même dynamique avec peu de rongeurs et peu de Nyctales détectées : chants du 20/01 au 14/04 puis le 25/06 sur le Méjean (dispersion ?) pour un total max de 7 chanteurs. Seule tentative de reproduction avérée : une ponte de 4 oeufs abandonnée dans un nichoir à Arzenc-de-Randon, découverte lors de contrôle ultérieur du nichoir (JLB).



*De haut en bas et de gauche à droite :*

- *Hibou des marais, Le Massegros, 07/03/16, F. Legendre*
- *Chevêche d'Athéna, Brugers, 22/03/16, B. Grindel*
- *Chouette hulotte poussin, La Parade, 26/05/16, F. Legendre*
- *Petit-duc Scops, Meyrueis, 15/09/16, C. Giordano*
- *Hibou moyen duc, Le Massegros, 02/12/16, F. Legendre*
- *Hibou des marais, Le Massegros, 28/01/16, F. Legendre*
- *Chouette de Tengmalm, Arzenc-de-Randon, 07/04/16, J-L. Bigorne*


**ENGOULEVENT D'EUROPE** (*Caprimulgus europaeus*) - **NM, ass. Comm.** - 72 données (81 en 2015). Du 05/05 au 03/09. Chants du 10/05 au 18/07. Max de 4 le 22/06 à Servières avec chants, cris et claquements d'ailes (CGo).

21 données au-dessus de 1000 m dont une à 1457m le 22/06 à la croix de Bor (MiQ).

En région : du 16/04 à Quissac-30 (J. PINAUD) et Canet-en-Roussillon-66 (C. PEIGNOT) au 24/09 à Cubières-sur-Cinoble-11 et Soulatgé-11 (C. RIOLS).



Engoulevent d'Europe  
cause Mejean, 23/08/16  
F. Legendre



Engoulevent d'Europe  
reproduction 2016

**MARTINET NOIR** (*Apus apus*) - **NM, comm.** - 299 données. Du 10/04 au 14/09 mais arrivées locales massives les 27 et 28/04. Max de 500 oiseaux en groupe estivaux de chasse. 17 données de reproductions certaines entre le 05/06 et le 23/07, les oiseaux s'étant installés tard pour cause d'un printemps « pourri » et ayant peu niché visiblement dans nos contrées.

Jean Belhache nous communique quelques résultats du suivi 2016 (qu'il réalise annuellement sur plusieurs colonies de Lozère) :

Sur 156 cavités connues pour avoir été utilisées au moins une fois depuis 7 ans, 105 furent contrôlées en 2016 ; 54 furent fréquentées soit un faible taux de 51 %.

Sur ces 54 cavités, 63 % (n=34) seulement furent utilisées par des reproducteurs.

Huit colonies furent suivies en 2013 (printemps pluvio-neigeux froid) et douze en 2016 (printemps pluvieux mais doux) : en 2013, sur 48 cavités fréquentées, 50 % (n=24) furent le siège d'une reproduction effective. Il apparaît donc que l'impact climatique fut moins sévère en 2016 qu'en 2013, année de sinistre mémoire !

4 nichées tardives furent détectées en 2013, 0 en 2016 (donc, a priori, aucune ponte de remplacement), alors qu'en 2010 au contraire, il en avait été découvert 12 (dernier envol le 14 septembre), autre année néfaste durant laquelle les intempéries, tout aussi rudes mais de moins longue durée, avaient permis à certains couples de se "ressaisir".

Les départs massifs eurent lieu les 25 et 26/07.


En région : du 17/03 à Montpellier (A. LAFORGE) au 16/10 à Beaucaire (C. SABRAN).



Martinet noir, Marvejols  
28/04/16, R. Destre


**MARTINET À VENTRE BLANC** (*Apus melba*) - **N loc., M** - 41 données. Du 27/03 au 20/09. Max de 18 les 27/03 et 13/04 vers Banassac (FLe). Des données de Prévencières et de Langogne en période de reproduction mériteraient confirmation dans les années à venir. Rare donnée certaine de reproduction : 3 jeunes quittent le nid le 05/07 à La Malène entraînés par les adultes (FLe).

En région : du 05/03 sur 2 sites du littoral (A. CHAILLOU, D. GAILLY) au 24/10 à Sorède-66 (D. THIBAUT).



Martinet à ventre blanc  
reproduction 2016


**MARTIN-PÊCHEUR** (*Alcedo atthis*) - **N, trans.** - 182 données (72 en 2012 après vague de froid de février). Légère baisse des observations d'altitudes rapportées ces dernières années, avec seulement 2 données au-dessus de 1000 m à Charpal



Martin-pêcheur  
phénologie 2016


(1325 m) où l'espèce est régulièrement vue au passage mais sans nicher... sans doute à relier à une moindre pression d'observation, conséquence de printemps à météo capricieuse. Comme l'année passée on observe un grand nombre d'observations en période postnuptiale (47 données de février à août pour 135 de septembre à janvier).

Une seule donnée de reproduction certaine avec 1 jeune nourri le 31/10 à Rimeize (MiQ) et une observation originale en janvier : un oiseau suit une Loutre et profite des poissons qu'elle dérange pour se nourrir (Plu).



Guêpier d'Europe  
répartition 2016

**GUÊPIER D'EUROPE** (*Merops apiaster*) - **M peu commun, régulier** - 28 données. Drôle d'année ! **Total minimal de 278 oiseaux** (ancien record de 182 en 2015) dont un max de **76** le 01/09 à Bonnetcombe (FL). Vingt données du 21/04 au 04/06 dont 4 données le 04/05 pour un max de 30 le 21/04 à La Salle-Prunet (JF) et 1-3 oiseaux qui traînent fin mai/début juin sur Marvejols sans nicheurs trouvés (RD). Trois données seulement du 18/08 au 08/09.



Rollier d'Europe  
répartition 2016


**ROLLIER D'EUROPE** (*Coracias garrulus*) - **M très rare** - 25 données pour **35 oiseaux**. Du 08/08 au **26/09**. Observation remarquable : dortoir exceptionnel avec un **minimum de 19** oiseaux le 28 août sur la Can de l'Hospitalet, Vebron, 1032 m d'altitude (PFe) puis 1 ou 2 individus revus du 29/08 (RD) au 26/09 (PFe, Mch).

**HUPPE FASCIÉE** (*Upupa epops*) - **NM, peu comm.** - 124 données (89 en 2015). En région, on observe une nette augmentation du nombre de données d'hivernage depuis 2012 avec extension de la zone géographique vers hors du littoral (92 données d'hivernage en région pour 2012/13, 100 données 2013/14, 93 données 2014/15, 171 données 2015/16). 1 individu le **25/02** à Ribennes (JLB)... début d'hivernage ou migrateur précoce ? puis du 24/03 au 31/08.


Chant le **25/02** (JLB) puis du 10/04 au 20/05 et 1 chanteur le **19/07** à Saint-Pierre-des-Tripiers (P. JOURDE). Becquées à partir du 14/05 et 2 nichées de 2+3 jeunes les 21/06 et 06/07.




Rollier d'Europe  
Sauveterre, 04/09/16  
F. Legendre




Huppe fasciée  
hivernage 2012/2013  
en Languedoc-Roussillon



Huppe fasciée  
hivernage 2015/2016  
en Languedoc-Roussillon



Huppe fasciée  
reproduction 2016



Torcol fourmilier  
reproduction 2016

**TORCOL FOURMILIER** (*Jynx torquilla*) - **NM, peu comm.** - 130 données (94 en 2015). L'espèce semble en expansion depuis 4 ans. Rare donnée hivernale : 1 individu du 17 au 30/01 à Montrodât (L. DESTRADE). Plus classiquement, du 29/03 au 10/09 et chant du 29/03 au 07/07. Sept mentions de reproductions certaines du 06/06 au 26/06.

**PIC VERT** (*Picus viridis*) - **N séd.** - 564 données. Chant du 08/01 au 10/08 puis le 23/09. 4 nichées à l'envol pour 9 jeunes (3x2 et 1x3) du 15/06 au 14/07.


**PIC NOIR** (*Dryocopus martius*) - **N séd.** - 208 données. Tambourinage du 17/01 au 28/05. Seulement 2 données de reproduction certaine dont au moins 2 jeunes volants le 06/06 à Ribennes (JLB).

**PIC ÉPEICHE** (*Dendrocopos major*) - **N séd.** - 400 données. Tambourinages du 19/01 au 19/07 puis 3 données le 08/10 à Saint-Germain-du-Teil (FL) puis les 18 et 31/12 à Servières (CG) ! 6 nichées produisent au moins 10 jeunes du 03/06 au 14/07 (3x1, 2x2, 1x3).

**PIC MAR** (*Dendrocopos medius*) - **N rare** - 11 données. 5/6 territoires sont notés autour de Banassac. Un chanteur est observé à Bédouès le 21/03 (JPM) ce qui constitue une belle avancée vers l'est de l'espèce en Lozère et confirmation de sa présence dans les gorges du Tarn. Chants notés les 24/01 et 21/03 et becquée le 29/05 à Saint-Saturnin (FLe).




Pic mar, Bédouès  
21/03/16, J-P.Malafosse



Pic mar  
reproduction 2006-2016

**PIC ÉPEICHETTE** (*Dendrocopos minor*) - **N séd. Peu comm.** - 27 données. 4 tambourinages notés le 05/02


et les 28/09, 15/10 et 18/12 à Barre des Cévennes (MCh). Chants les 29/04 et 16/05. Aucune donnée de reproduction certaine cette année. N'a dépassé 1000 m d'altitude qu'à 3 reprises, uniquement en février (dispersion ?) et ne dépasse pas 1000 m cette année en période de reproduction.




Pic épeichette  
reproduction 2012-2016

**ALOUETTE CALANDRELLE** (*Calandrella brachydactyla*) - **N loc. Rare** - 1 donnée. 2 oiseaux aux Redoundous, Méjean le 15/04 (FLe), pas revus ensuite malgré des recherches. Migrateurs probables soit locaux soit en dépassement d'aire.

**ALOUETTE LULU** (*Lulula arborea*) - **NM, H rare** - 475 données. Du 25/01 au 26/11. Deux données éparses les 6 et 8 janvier et une donnée le 20/12. Chant du 25/01 au 30/07 puis reprise du 22/09 au 15/10. Becquées du 16/04 au 12/07. 5 nichées répertoriées produisent 15 jeunes (2x3, 2x2, 1x5). Migration notée du 10/02 au 21/03 et du 25/09 au 19/11. 1 chanteur noté le 21/06 à 1500 m (FLe).



Alouette lulu  
reproduction 2016



Alouette des champs  
reproduction 2016

**ALOUETTE DES CHAMPS** (*Alauda arvensis*) - **NM, H rare** - 788 données. Notée toute l'année avec 6 données en décembre et 5 en janvier. Chant le 21/02 puis du 07/03 au 30/07 puis deux notés les 04/09 et 07/10. Max de 200 individus le 21/10 à Gatuzières (RBe, MLC, FLe). Migration notée du 17/02 au 27/03 et du 06/10 au 19/11. Nourrissages du 12/05 au 30/07.

**HIRONDELLE DE RIVAGE** (*Riparia riparia*) - **M rare** - 14 données. Du 20/03 au 09/05 puis du 14/07 au 29/09 pour un petit max de 7 le 09/05 à Naussac (MLC, FLe).

**HIRONDELLE DE ROCHERS** (*Ptyonoprogne rupestris*) - **NM** - 454 données.

Notée régulièrement du 24/01 au 08/12 mais très rare du 15/10 au 15/02. Nourrissages du 19/06 au 29/08 et 11 nichées sont bien détaillées pour 42 jeunes (1x2, 3x3, 4x4, 3x5).

**HIRONDELLE RUSTIQUE** (*Hirundo rustica*) - **NM, comm.** - 549 données. Du 15/03 au 26/10. Migration notée du 15/03 au 26/05.

Seulement 6 nichées sont notées produisant 16


jeunes (2-5) du 01/07 au 09/08. Aucune nichée à l'envol mentionnée avant, sans doute à mettre sur le compte du printemps humide ? Ou d'un effet observateur ?

Migration postnuptiale notée du 14/08 au 26/10 avec un petit max de 595 en 3h30 de suivi au Puech Debon.


En région : du 16/02 à Argelès-sur-Mer-66 (J. HIARD) au 01/12 à Salses-le-Château-66 (Y. ALEMAN, G. ESCOUBEYROU) avec 11 données en novembre et 8 en février.



Hironnelle de rochers  
Bagnols-les-Bains, 03/06/16  
D. Bugaud



Hironnelles de rochers  
reproduction 2016



Hirondelle de fenêtre  
reproduction 2016

**HIRONDELLE DE FENÊTRE** (*Delichon urbicum*) - **NM, comm.** - 363 données.

1 individu à Ste-Enimie le 14/02 (D. BIZET) puis du 14/03 au 16/10. Migration pré-nuptiale notée du 28/03 au 10/05 sans observation de groupe supérieur à 12. Poussins au nid du 22/06 au 23/08. Huit petites nichées inventoriées de 1 ou 2 poussins seulement.

Migration postnuptiale notée du 28/08 au 15/10 avec gros passage mi septembre et max de 1000 en 3h à Langogne le 15/09 (FLe).




Pipit rousseline  
causse de Sauveterre 04/05/16,  
M-L. Cristol

**PIPIT ROUSSELINÉ** (*Anthus campestris*) - **NM, comm. Loc.** - 166 données.

Du 15/04 au 21/09 essentiellement sur les causse Méjean et de Sauveterre, 1 territoire au Masegros (FLe) et 1 chanteur à Altier le 09/07 (JLB).

Becquées du 24/06 au 11/07 puis observation étonnante sur le Méjean d'un nourrissage de jeune coucou gris le 23/08 (EBa, FLe), revus 25/08 (J. CABRE-RA)!



Pipit farlouse  
reproduction 2016

**PIPIT DES ARBRES** (*Anthus trivialis*) - **NM, comm.** - 257 données. Du 30/03 au 11/10. Chants du 10/04 au 18/07.

Seulement 5 nourrissages notés du 07/06 au 17/07. Présence en période de nidification dans l'ensemble du département.

Migration postnuptiale notée au Puech Debon du 28/08 au 25/09 avec petit max de 8 en 2h20 le 17/09 (FLe).



Pipit à gorge rousse  
Lac des Salhiens, 07/05/16  
F. Legendre

**PIPIT FARLOUSE** (*Anthus pratensis*) - **NM, H rare** - 322 données. Contacté toute l'année mais se fait rare de mi-décembre à début mars.


Chant du 15/03 au 22/06. Nourrissages du 05/05 au 13/08. Au moins 21 territoires notés dans la vallée glaciaire du Bès et alentours du refuge des Salces (1300m) le 05/06.

En migration du 24/02 au 10/04 puis du 04/09 au 26/11.

**PIPIT À GORGE ROUSSE** (*Anthus cervinus*) - **M, rare** - 4 données. Sur l'Aubrac : mâle le 25/04 à Usanges (L.FÉDON) et le 07/05 ainsi que 2 (mâle et femelle) aux Salhiens le 07/05 (FLe). Également 1 en migration active sur le Mont Lozère le 05/05 (FLe).

En région, quasi-uniquement sur le littoral : 28 données pour 39 oiseaux (54 en 2015) du 12/04 (F. GARCIA) au 16/05 (G. OLIOSO) et 1 en migration active à Gruissan le 06/09 (collectif LPO Aude).

**PIPIT SPIONCELLE** (*Anthus spinoletta*) - **N loc., MH peu comm.** - 131 données (76 en 2015). Rare du 10/05 au 10/10 et migrateur d'octobre à fin avril. Beau max de 53 à Montbel le 17/04 (FLe). Des prospections ciblées le 05/06 autour du refuge des Rajas et dans la vallée glaciaire du Bès donnent 9 territoires occupés sur les pentes drainées (tourbières très humides cette année) uniquement en ubac, avec 3 nourrissages (FLe, Eba). Une donnée de reproduction avec nourrissage sur le Mont Lozère (ruisseau de Banassac) le 21/06 (FLe).



Pipit spioncelle  
reproduction 2016



Pipit spioncelle  
Allenc, 13/04/16, R. Destre

**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE (*Motacilla flava*) - N loc., M peu comm.**

Sous-espèce non spécifiée : 67 données du 06/04 au 23/05 puis du 13/08 au 28/10.

Sous-espèce britannique *flavissima* (*B. flavéole*) : 3 données le 10/04 sur le causse Méjean, 17/04 et 15/09 à Montbel (FLe).

- Sous-espèce type *flava* : 8 données du 23/03 au 13/05, puis 1 donnée estivale (couple avec femelle *sp*) le 11/06 (à compléter IOL) à Saint-Laurent-de-Muret (FLe), première mention estivale lozérienne.

- Sous-espèce « centratlantique » *flava x iberiae* : 17 données du 09/04 au 19/07. 7 territoires au moins sur 2 sites aubracois (lac des Salhiens, Usanges) et 1 nourrissage noté le 11/06 à Usanges (FLe).

- Sous-espèce d'Italie *cinereocapilla* : 2 données à Usanges le 17/04, et apparié à une femelle *sp* le 11/06 (FLe).



Bergeronnette printanière  
ssp *cinereocapilla*  
11/06/16, Usanges, F. Legendre




Bergeronnette printanière  
28/10/16, Nasbinals  
F. Legendre

**BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) - N séd., trans. - 294 données.** Chant du 21/03 au 16/05 et nourrissages du 02/05 au 24/07. Seulement 2 nichées inventoriées pour au moins 4 jeunes (2x2).

**BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) - NM comm., H rare - 647 données.** Peu fréquente en hiver. Chant du 24/02 au 26/06 (FLe), 1 chanteur


le 03/10 à Florac (EBa). Nourrissages du 07/05 au 01/08. Peu de nichées inventoriées : 6 nichées avec au moins un jeune à l'envol et 3 nichées de 2 jeunes. Max de 57 à Naussac 18/09 (MLC, FLe). Beau passage du 15/09 au 20/10 avec des groupes de plusieurs dizaines d'oiseaux notés régulièrement.




Bergeronnette des ruisseaux  
reproduction 2016



Bergeronnette grise juvénile  
Chastanier, 21/06/16  
Y. Ponthieux



Troglodyte mignon  
reproduction 2016




Cincle plongeur  
reproduction 2016

**CINCLE PLONGEUR (*Cinclus cinclus*) - N séd, trans. - 264 données.** Chant le 02/09 puis du 12/10/2015 au 13/04 et reprise le 20/09. Nourrissages de jeunes du 27/04 au 04/07. Jeunes notés à l'unité sans inventaire précis de nichées.

**TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) - N séd. - 587 données.** Chante toute l'année, surtout de mi-mars à mi-mai et peu en juillet/août. Seulement 4 données mentionnent une reproduction certaine du 02/05 (occupation du nid) au 07/08 (envol de 3 jeunes). Noté à toutes les altitudes, sur l'ensemble du département.

**ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) - NMH - 312 données.** Chant du 22/02 au 07/07, puis un chant le 08/10 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Seulement 2 données de reproduction certaine, le 31/05 à La Malène (becquées), et un nid contenant au moins 2 poussins au Col de Trébatut le 04/06 (FLe). Noté à toutes les altitudes, sur l'ensemble du département.




Accenteur mouchet  
reproduction 2016



Accenteur alpin  
La Malène, 19/02/16. F. Legendre


**ACCENTEUR ALPIN** (*Prunella collaris*) - **H loc.** - 48 données (64 en 2015) et 61 hiver 2015/2016 (et 42 hiver 2014/2015). Du 23/10/15 à Florac (L. MARTIN) au 24/03/16 à Palhers (JF. COURSIMAULT) et La Malène (FLe), 2 données tardives cette année : le 05/05 sur le Mont Lozère : 6 sur un névé au ruisseau de Banassac et 1 aux sources du Tarn (FLe).

Retour le 09/10 à l'Aigoual (A. LAURENT). Max de 16 le 04/02 à Barjac (FLe).



Accenteur alpin  
répartition 2016


**ROUEGEGORGE FAMILIER** (*Erithacus rubecula*) - **NMH** - 845 données. Chante toute l'année mais plus rarement en fin d'été (une seule donnée en août) et au cœur de l'hiver. Noté majoritairement sous 1200 m mais présent jusqu'à 1600 m. Nourrissages notés à partir du 17/05 et jeunes du 26/05 au 24/08. Seulement 9 données de nidification certaine concernent cette espèce pourtant très commune.



Rougégorge familier  
reproduction 2016

**ROSSIGNOL PHILOMÈLE** (*Luscinia megarhynchos*) - **NM ass. Comm.** - 324 données. Du 13/04 au 06/09.

En région, du 29/03 au 13/09. Chant continu jusqu'au 07/07 et par bribes jusqu'au 23/07. À nouveau noté à Langogne, le 14/05 seulement qui peut encore concerner un migrateur (JBo). A suivre en 2017...



Rossignol philomèle  
reproduction 2016

**GORGEBLEUE À MIROIR** (*Luscinia svecica*) - **NM comm., H rare** - 1 donnée. 3 le 10/09 à Usanges (RD), date et lieu classiques.

**ROUGEQUEUE NOIR** (*Phoenicurus ochruros*) - **NM comm., H rare** - 891 données. 13 données en décembre et janvier et 9 en février, sur l'ensemble du département hormis le quart nord-est moins prospecté, suite logique d'un nouvel hiver doux.


Arrivée notée mi-mars et départs massifs fin octobre mais suivis d'observations

régulières jusqu'en fin d'année. Chant le 25/01 à Florac (FLe) puis du 16/03 au 25/11. Nourrissages à partir du 12/05. 24 nichées inventoriées pour 73 poussins (2-5). Observation d'une nichée de 3 poussins nourris par deux "types femelles" le 03/06 à Marvejols (RD).

**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC** (*Phoenicurus phoenicurus*) - **NM ass. Comm.** - 191 données. Après une bonne augmentation ces dernières années l'espèce se maintient. Du 27/03 au 08/10. Chant du **05/04** (FLe) au 05/07. Nourrissages notés du 25/05 au 23/06 (seconde nichée) de 1 ou 2 poussins, avec premier envol noté à partir du 06/06. Noté en période de nidification dans l'ensemble du département jusqu'à 1200 m.



nourrissage de Rougequeue noir  
Montrodât, 29/05/16, L. Destrade




Rougequeue à front blanc  
reproduction 2016




Rougequeue à front blanc  
Le Malzieu, 27/03/16, M. Quiot

**TARIER DES PRÉS** (*Saxicola rubetra*) - **N loc.**, **M** - 284 données (231 en 2015). Peut-être une des espèces à bénéficier d'un printemps humide ? Du 10/04 au 08/10. Chant du 17/04 au 08/07. 11 nichées recensées du 07/06 au 10/08 (JLB) dont une de 6 jeunes le 08/06 à Arzenc-de-Randon (JLB) et un jeune sorti du nid le 10/09 à St-Laurent-de-Muret (RD). 29 jeunes au minimum (4x1, 2x2, 2x3, 1x4, 1x5, 1x6). Max de 20 à Recoules-d'Aubrac le 18/08 (JLB).




Tarier des prés  
reproduction 2016



Tarier pâtre  
reproduction 2016

**TARIER PÂTRE** (*Saxicola torquatus*) - **NM**, **H rare** - 523 données. Toujours quelques oiseaux ça et là en hiver mais sans dépasser une dizaine de données par mois de novembre à février. Retour des oiseaux mi-mars suivi d'un pic la première décennie d'avril et baisse progressive à partir de mi-octobre. L'espèce dépasse très rarement 1400 m (6 données). Chants du 15/03 au 29/06, nourrissages notés du 02/05 au 30/07 et premier envol le 07/05. 15 nichées détaillées pour 43 poussins (7x2, 4x3, 3x4, 1x5).



Traquet motteux  
reproduction 2016



Tarier des prés  
Lac du Moulinet, 17/05/16  
P. Thouvenot

**TRAQUET MOTTEUX** (*Oenanthe oenanthe*) - **NM ass. Comm. Loc.** - 685 données (545 en 2015). Du 25/03 au 26/10 dont 6 données après le 15/10. Chants du 06/04 (JLB) au 27/06 et nourrissages notés du 31/05 au 16/08.

24 nichées bien renseignées pour un minimum de 53 jeunes à l'envol (6x1, 9x2, 8x3, 1x4) du 29/06 au 16/08. Max seulement de 15 le 01/07 à Hures-la-Parade (FLe).



Traquet oreillard  
Drigas, 28/04/16, F. Lecourtier

**TRAQUET OREILLARD** (*Oenanthe hispanica*) - **MN**, très rare - 9 données dont 3 avec oiseau. Uniquement sur le causse Méjean. Retour du mâle observé en 2015 à Nivoliers, revu seulement les 12 (FLe) et 15/04 (EBa) sans suite. Également un mâle 28/04 à Drigas (F. LECOURTIER), sans suite là aussi.

**MONTICOLE DE ROCHE** (*Monticola saxatilis*) - **N loc.**, **M** - 30 données (69 données en 2015). Du 16/04 au 29/08 et chants du 29/04 au 13/06. Quelques données cette année hors causse Méjean en période de nidification (ce qui était commun auparavant

mais devient rare maintenant) : parades et chants le 03/06 à Vialas (PLu), secteur toutefois encore habituel, aux Boissets le 04/05 (MLC), Quézac le 06/07 (R. JARDIN) (plus noté sur le Sauveterre depuis bien longtemps) et à Vébron (Can de l'Hospitalet) le 20/05 (Pfe).

Un seul jeune noté le 16/08 à la Fromagère (FLe) et nourrissage observé puis échec avec construction d'un nouveau nid les 11/06 et 13/06 au-dessus de Meyrueis (R. NADAL).


**MONTICOLE BLEU** (*Monticola solitarius*) - **N loc**, **H rare** - 5 données. Du 05/05 au 11/08 : 1 mâle au ranc de Jouqueirou, Prévencières le 05/05 (E. VERICEL), 1 au Rozier le 06/05 (FLe), 1 le 24/05 au cirque de Pugnadoires, Sainte-Enimie (A. DESNOS), 1 c le 30/05 à Frépstel, Meyrueis (C. JARASSIER, F. LESCURE, R. NADAL), et enfin 1 tué par un chat le 11/08 à Saint-Martin-de-Lansuscle (R. BOUAT), mortalité co-anthropique dont l'espèce se passerait bien. Le secteur de La Malène est abandonné encore cette année. L'espèce semble plus répandue qu'il n'y paraît et la recherche systématique dans toutes corniches rocheuses de la moitié sud du département s'impose.

## MERLE À PLASTRON (*Turdus torquatus*) - N loc., M - 47 données (32 en 2015).


Sous-espèce indéterminée : 24 données du 16/03 au 21/06 puis du 29/08 au 13/11 pour un max de 14 en vol le 12/11 sur le Mont Lozère (EBa, FLe).

*Ssp torquatus* : 7 données du 29/03 au 09/04 puis 1 le 28/09 avec un max de 6 le 09/04 au lac de Born (FLe).

*Ssp alpestris* (se reproduisant en Lozère) : 16 données du 10/04 au 12/05 puis les 21/10 et 12/11. Alarmes et chants notés sur le sommet de Finiels, Mont Lozère, le 05/05 pour 5 territoires potentiels et 1 jeune juste volant le 21/06 (FLe).



Merle noir  
reproduction 2016



Grive litorne  
reproduction 2016

**MERLE NOIR** (*Turdus merula*) - **NMH comm.** - 1052 données. Rare au-delà de 1300 m. On observe une baisse nette des observations de début août à mi-novembre. Chants le 07/01 à Marvejols (RD) puis du 26/01 au 05/07 suivis d'un chant le 15/10 à Saint-Germain-du-Teil et de 3 en décembre. Nourrissages du 02/03 au 26/07 et 5 nichées bien détaillées pour au moins 14 poussins (2x2, 2x3, 1x4).

**GRIVE LITORNE** (*Turdus pilaris*) - **N loc., MH** - 394 données (288 en 2015, 190 en 2014). L'espèce semble plus fréquente, mais le nombre de données nuptiales reste le même que l'an dernier (44 données avec un code atlas pour 2015 et 2016 mais en augmentation par rapport aux années antérieures). Notée migratrice jusqu'au 19/03 et à partir du 27/10. Pic remarquable des observations durant la première quinzaine de décembre avec des bandes de plusieurs centaines d'individus et un max de 1000 dans des sorbiers à Arzenc-de-Randon le 16/12 (FLe).

Notée en période nuptiale dans le nord du département et sur le Mont Lozère, de 900 à 1300m d'altitude. Chants notés les 19/02 et 05/03, nourrissages du 02/05 au 20/07 et envols à partir du 11/06. 2 nichées notées pour 4 poussins (2x2).

**GRIVE MUSICIENNE** (*Turdus philomelos*) - **NMH ass. Comm.** - 274 données. Notée toute l'année, à l'unité en hiver, et sans grand groupe noté. Chant du 26/01 au 19/07 puis le 15/10 aux Salces (RD) et le 09/12 à Saint-Pierre-des-tripiers (P.



LECUYER). Seulement 2 données de nidification certaine : 2 poussins à l'envol le 29/04 à Bagnols-les-bains (DBu) et une becquée le 04/05 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Migration postnuptiale notée du 25/09 au 28/10.

**GRIVE MAUVIS** (*Turdus iliacus*) - **MH comm.** - 59 données. Petite année... Hivernage 2015/2016 du 16/10 au 27/03 avec max de 37 le 15/11 à Mas d'Orcières (DBu) puis à partir du 06/10 avec max de 300 le 16/12 dans les sorbiers avec des litornes à Arzenc-de-Randon (FLe).

**GRIVE DRAINE** (*Turdus viscivorus*) - **NMH ass. Comm.** - 683 données. Migration observée de fin février au 22/03 puis du 07/10 au 26/11 avec un gros passage la première quinzaine de mars. Max de 150 le 13/11 à Mas d'Orcières (DBu). Chants du 04/12/2015 au 05/06/2016 puis reprise ponctuelle à partir du 19/11. 8 données de reproduction certaine avec nourrissage du 17/04 au 23/06 et deux nichées de 2 poussins chacune les 12/06 et 05/07.

## CISTICOLE DES JONCS

(*Cisticola juncidis*) - **N rare., M - 38 données.** Après une année 2015 à 8 données (il y en avait 12 jusqu'alors, 2015 inclus), 2016 connaît un phénomène sans précédent dans l'ensemble du Massif-Central. La Lozère enregistre 38 observations un peu partout indiquant que nous en avons raté : notée du 23/05 au 18/12, le département enregistre également ses premières mentions d'octobre, de novembre et décembre ! Au moins 17 territoires occupés par 1 chanteur et/ou un couple sont notés cette année et



Cisticole des joncs  
- phénologie  
- reproduction

même deux avec 3 oiseaux et des comportements de reproducteurs dans 2 cas notamment fin août/septembre (comme la reproduction prouvée fin août 2014). Les habitats recherchés sont des landes buissonneuses plus ou moins lâches avec des zones ouvertes à proximité principalement entre 800 et 1200 m. A suivre en 2017... même si à l'heure où ces lignes sont écrites la vague de froid de janvier 2017 semble avoir mis un terme à cette belle série.


**LOCUSTELLE TACHETÉE** (*Locustella naevia*) - **N rare.**, **M - 5 données.** En migration : 2 x 1 le 11/05 puis les 2 et 15/09. Un oiseau quitte son nid au pied d'un genêt puis alarme le 18/08 près du col de Bonnecombe (FLe), première mention certaine de reproduction depuis 2001.

**PHRAGMITE DES JONCS** (*Acrocephalus schoenobaenus*) - **M, rare - 3 données.** Seconde mention printanière en Lozère : 1 chanteur le 17/04 à Naussac (enregistré). Ensuite, 1 le 15/08 au Moulinet et 27/08 à Usanges (FLe).

**ROUSSEROLLE EFFARVATTE** (*Acrocephalus scirpaceus*) - **N ?**, **M peu comm.** - 11 données. 3 données pré-nuptiales le 06/05 au Malzieu-Forain (A. ROUGE), 1 chanteur à Mende le 11/05 (JLB) et 1 chanteur le 21/05 à Barre des Cévennes (PFe) puis 8 données post-nuptiales du 07/09 au 07/10 dont 6 entre Banassac et Booz (FLe).

En région : du 28/03 à Mireval-34 (P. DEVOUCOUX, B. VOLLOT) au 18/11 à Leucate-11 (T. GUILLOSSON)

**HYPOLAÏS POLYGLOTTE** (*Hippolais polyglotta*) - **NM, peu comm.** - 92 données (contre 123 en 2013). Du 30/04 au 02/08 et 1 *Hippolais sp.* le 03/09 sur le Méjean. Chant jusqu'au 07/07. Trois nourrissages de 5 jeunes au moins (3+1+1) sont notés du 08/06 au 17/07.



Hypolais polyglotte  
reproduction 2016




Hypolais polyglotte  
Montrodât, 29/05/16, L. Destrade


**FAUVETTE À TÊTE NOIRE** (*Sylvia atricapilla*) - **NM, H rare - 713 données.** Rare en hiver avec 3 données en janvier, 2 en février, 8 en novembre et 9 en décembre sans dépasser 700 m d'altitude. Arrivées bien marquées la dernière décade de mars pour derniers départs mi-octobre. Chants du 17/03 au 18/10 jusqu'à 1350 m et un chant en sourdine isolé le 23/11 à Saint-Bonnet-de-Chirac (MLC, FLe). A noter un chant le 07/07 à Saint-Frézal-d'Albuges, **1452 m** (FLe). Nourrissages du 06/06 au 16/08 et 5 nichées inventoriées pour 12 jeunes (4x2, 1x4).

**FAUVETTE DES JARDINS** (*Sylvia borin*) - **NM, ass. Comm.** - 71 données (103 en 2015). Du 01/05 au 23/09.


Chants du 05/05 au 27/07 surtout au-dessus de 800 m. Aucune donnée de reproduction certaine.



Fauvette à tête noire  
reproduction 2016



Fauvette des jardins  
reproduction 2016



Fauvette orphée  
reproduction 2016

**FAUVETTE ORPHÉE** (*Sylvia hortensis*) - **Estivant N loc.** - 79 données (57 en 2015 mais deux fois moins notée qu'en 2013, ce printemps pluvieux 2016 ayant sans doute un impact négatif sur les chanteurs). Du 29/04 au **23/09** (date très tardive, ancien record un **09/09**) uniquement sur les grands causses et aucune donnée dans la vallée du Lot : désertion de cette zone en cours de colonisation ou oiseaux passés inaperçus ? À suivre en 2017...  
En région : du 09/04 au 22/09.

**FAUVETTE GRISETTE** (*Sylvia communis*) - **NM, comm.** - 404 données (352 en 2015). Espèce en augmentation depuis 3 ans. Du 06/04 au 25/09. Chant du 14/04 au 12/07. Chant le 21/06 à **1616 m** d'altitude au Pont-de-Montvert (FLe).

Nourrissages du 11/06 au 17/07. 5 nichées de 1 à 3 poussins notées produisent 8 poussins au moins.

En région : du 02/04 à Leucate-11 (S. REYT) et Vinça-66 (F. GILOT) au 08/10 à Vendres-34 (S. REYT).



Fauvette grisette  
Rimeize, 05/05/16, M. Quiot




Fauvette à lunettes  
cause Méjean, 12/05/16, F. Legendre

**FAUVETTE À LUNETTES** (*Sylvia conspicillata*) - **NM, rare** - 7 données. Confirmation de l'espèce sur le causse Méjean. À Nivolières, notée au moins du 12/05 au 29/06 avec 3 chanteurs le 12/05 et 3 territoires occupés le 29/06 dont un couple nourrissant 3 poussins hors du nid (EBa, FLe). Également un couple nourrissant le 24/06 à Rivalte (JF) mais aucun contact malgré plusieurs recherches sur le secteur de Peyregrosse occupé en 2015 (FLe). D'autres secteurs sont sans doute occupés...


**FAUVETTE PITCHOU** (*Sylvia undata*) - **N séd. Loc. Irrég.** - 47 données (27 en 2015). L'espèce semble être en progression régulière depuis 2011. Notée toute l'année sur la moitié sud du département hors Mont Lozère, rarement au-dessus de 1000 m sans dépasser 1300 m. Chants notés du 12/03 au 01/07. 1 nid noté les 29 et 30/05 sur le causse de Sauveterre (FLo) en limite nord en Lozère.

**FAUVETTE PASSERINETTE** (*Sylvia cantillans*) - **N loc., M** - 64 données. Du 07/04 au 20/09 et chants jusqu'au 08/07. 6 données de becquées du 24/05 au 15/06. Aucune donnée de nicheur dans la vallée du Lot hormis deux observations de migratrices possibles.


**FAUVETTE MÉLANOCEPHALE** (*Sylvia melanocephala*) - **N loc ? rare., M** - 0 donnée. Aucune mention des vallées cévenoles, l'espèce demeurant fort rare et très localisée en Lozère sans que sa présence permanente ne soit établie.



Fauvette pitchou  
histogramme 2011-2016



Fauvette pitchou  
reproduction 2016




Fauvette passerinette  
reproduction 2016

**POUILLOT BRUN** (*Phylloscopus fuscatus*) - **M, exc.** - 1 donnée. Première mention départementale de ce Pouillot sibérien avec un oiseau se nourrissant pendant 1h20 dans les herbes hautes du plan de Booz le 11/10 (FLe). Il est à noter que deux autres observations suivirent en région (Aude et P.O) les 14 et 15/10... peut-être fut-il revu à l'un de ces moments ? Il s'agit de la 316<sup>ème</sup> espèce en Lozère.



Pouillot de Bonelli, Montrodat  
29/05/16, L. Destrade



Pouillot de Bonelli  
reproduction 2016

**POUILLOT DE BONELLI** (*Phylloscopus bonelli*) - **NM ass. Comm.** - 204 données. Du 06/04 au 16/08 et chant jusqu'au 20/07. Reste confiné sur le sud-ouest du département, il est étonnant qu'il ne soit pas noté vers Villefort. Données de nourrissages du 28/05 au 20/06.



Pouillot véloce  
Les Sallelles, 05/06/16  
R. Destre



Pouillot siffleur,  
Saint-Germain-du-Teil,  
F. Legendre

**POUILLOT SIFFLEUR** (*Phylloscopus sibilatrix*) - **N rare M rare.** - 7 données. Un migrateur le 13/04 puis 3 chanteurs dans la chênaie habituelle de Saint-Germain-du-Teil (FLe) et enfin d'autres chanteurs ailleurs, en hêtraie : 1 le 03/06 à Saint-Frézal-de-Ventalon à 990 m d'altitude et 1 le 27/06 à Mas d'Orcières à 1320 m d'altitude (Plu).

**POUILLOT VÉLOCE** (*Phylloscopus collybita*) - **NM comm.** - 721 données (622 en 2015). Aucune donnée pour janvier et février et 3 en décembre. Passages migratoires bien marqués la dernière

décade de mars et la première d'octobre avec plusieurs groupes de 10 à 20 individus du 23/03 au 06/04 à Booz (FLe). Chants du 12/03 au 15/10 **sans interruption estivale**. Seulement 4 données de reproductions certaines : poussins au nid le 05/06 aux Sallelles (RD), 2 le 29/06 à Mas-Saint-Chély, jeune à l'envol le 14/07 à Booz (FLe) et le 19/07 à Saint-Pierre-des-Tripiers (P. JOURDE).


**Pouillot de Sibérie (sp. tristis) : 1 le 23/03 et probablement aussi le 06/04 à Booz (FLe).**

**POUILLOT FITIS** (*Phylloscopus trochilus*) - **N prob, M** - 43 données. Du 22/03 au 01/05 puis du 12/08 au 12/09. Chant les 25/03 et 14/04 puis du 27/08 au 04/09 mais pas de chant cette année en période nuptiale.

Maximum de 8 moucheronnant à Booz le 02/04 (FLe).


En région du 21/03 en plusieurs localités littorales au 05/11 à Narbonne-11 (Y. BORREMAN)

**ROITELET HUPPÉ** (*Regulus regulus*) - **N séd., M** - 166 données (214 en 2015, 149 en 2014). Chants du 14/03 au 29/06 puis du 10/09 au 26/09. Chanteurs notés à Servières à partir du 27/01 et jusqu'au 31/12 (CGo). Max de 10 les 21/01 à La-Fage-Saint-Julien (GCh) et 29/06 à la forêt de la Gardille (Y. PONTHEUX). Aucune donnée notée de nidification.



Pouillot fitis  
répartition 2016

**ROITELET TRIPLE-BANDEAU** (*Regulus ignicapilla*) - **NM, H local** - 177 données. 6 données en janvier, 1 en février, retours à partir de la première décade de mars puis départs fin novembre et 4 données en décembre. Données hivernales localisées dans les gorges et Cévennes avec cependant 4 données au-delà de 950 m sur le causse Méjean et autour de Bagnols-les-Bains, sans dépasser 1050 m.



Gobemouche gris  
reproduction 2016

**GOBEMOUCHE GRIS** (*Muscicapa striata*) - **N loc., M** - 44 données (39 en 2015). Du 30/04 au 26/09. L'espèce semble en augmentation. 4 nourrissages observés du 08/06 au 23/07 pour 3 nichées inventoriées de 1, 2 et 3 poussins.

**GOBEMOUCHE NOIR** (*Ficedula hypoleuca*) - **N loc.**, **M** - 164 données (70 en 2015, 141 en 2013). Du 02/04 au 06/06 puis du 13/08 au 27/09. 2 chanteurs à Cubières (27/05 et 06/06) et Saint-Privat-de-Vallonque (25/05) (PLu) et un couple observé à Montrodât le 29/05 (L. DESTRADE). Beau passage du



Gobemouche noir  
Montrodât, 29/05/16, L. Destrade


20/08 au 10/09 avec max de 19 le 09/09 à La Villedieu (M. JAMIER). En région : Du 02/04 en plusieurs localités sudistes au 16/10 à Montpellier-34 (P. DECOUVOUX).



Mésange à longue queue  
27/11/16, Cirque des Baumes  
E. Barthez

**MÉSANGE À LONGUE QUEUE** (*Aegithalos caudatus*) - **N séd.** - 271 données (240 en 2015, 189 en 2014). Max de 50 en plusieurs bandes le

27/01 au Malzieu-Forain (MiQ). Nourrissages à partir du 15/05 et 5 nichées notées pour 19 jeunes (2x3, 2x4, 1x5). Dernière nichée à l'envol le **02/08**, pour une deuxième nichée de 3 jeunes à Marvejols (RD). 14 données seulement concernent des données au-delà de 1200 m (max 1493m).



Mésange nonnette  
reproduction 2016

**MÉSANGE NONNETTE** (*Poecile palustris*) - **N séd.** - 355 données. Chants du 21/01 au 09/06 puis du 06/09 au 10/10 et de façon sporadique entre ces dates. Reproduction essentiellement dans les vallées jusqu'à 1200m, rare au-delà. Nourrissages à partir du 17/05 et envols du 30/05 au 29/06 de 2 nichées (3 et 2 jeunes).

**MÉSANGE HUPPÉE** (*Lophophanes cristatus*) - **N séd.** - 372 données. Chants notés du 27/06 au 12/08 puis sporadiquement du 24/09 au 06/11. Envols du 09/05 au 28/07. 3 nichées inventoriées pour 9 jeunes (1x2, 1x3, 1x4). Données de reproduction de 500 à 1400 m.

**MÉSANGE NOIRE** (*Periparus ater*) - **N séd.** - 757 données. Présence partout au-delà de 400 m et principalement de 800 à 1600 m. Chants toute l'année. Nourrissages du 05/05 au 11/07 et 5 nichées détaillées pour minimum 11 jeunes (4x2, 1x3).

**MÉSANGE BLEUE** (*Cyanistes caeruleus*) - **N séd.**, **MH** - 667 données. Chants du 09/01 au 27/05 et du 23/09 au **16/10** et quelques chants d'été sporadiques. Nourrissages du 14/05 au 10/07 et 10 nichées détaillées pour 26 jeunes (6x2, 3x3, 1x4).



Mésanges charbonnières juvéniles  
Montrodât, 29/05/16, L. Destrade


**MÉSANGE CHARBONNIÈRE** (*Parus major*) - **N séd.**, **MH** - 854 données. Chants du 02/01 au 16/04 puis reprises du 11/05 au 28/07 et à partir du 24/09. Nourrissages du 06/05 au 15/08 et envols du 29/05 au 19/08. 16 nichées bien détaillées pour 45 jeunes au moins (7x2, 5x3, 4x4).

**SITTELE TORCHEPOT** (*Sitta europaea*) - **N séd.** - 439 données. Chants du 08/01 au 16/04 et un chanteur le 15/12 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Envols du 23/05 au 01/08 et 6 nichées détaillées pour 15 jeunes (4x2, 1x3, 1x4).


**TICHODROME ÉCHELETTE** (*Tichodroma muraria*) - **H loc.** - 70 données (84 hiver 2015-2016 pour 56 en 2014/2015). Du 11/10/2015 au 04/04 puis à partir du 28/10.

Noté sur 43 lieux-dits durant l'hiver 2015/2016 (29 pour 2014/2015). Un bel hivernage pour l'espèce tant sur le département qu'en région (127 données hors Lozère pour l'hiver 2015/2016 pour 98 en 2014/2015).

En région : du 20/10/15 à Saint-Bauzille-de-Montmel-34 (R. DALLARD) au 15/04 à Aumelas-34 (P. BOUDAREL) et à partir du 06/10 à Notre-Dame-de-la-Rouvière-30 (Gto).




Tichodrome échelette répartition 1997-2016




Tichodrome échelette répartition 2016

**GRIMPEREAU DES BOIS** (*Certhia familiaris*) - **N, localisé** - 34 données. Chants du 30/03 au 07/07 puis chants isolés notés le 13/02 à Booz (FLe), 2 le 05/09 à Finiels (PLu) et 1 le 31/12 à Servières (CGo). 1 becquée notée le 22/05 à Saint-Germain-du-Teil (FLe).



Grimperreau des bois reproduction 2016



Grimperreau des jardins reproduction 2016




Grimperreau des jardins Naussac, 27/06/16, Y. Ponthieux

**GRIMPEREAU DES JARDINS** (*Certhia brachydactyla*) - **N séd ass. Comm.** - 275 données (226 en 2015). Jusqu'à 1200 m sauf exception. Chants du 22/01 au 05/07 occasionnellement entre ces dates. Couvaison à partir du 13/04, nourrissages du 22/05 au 27/07 et 2 nichées notées de 3 poussins chacune.

**RÉMIZ PENDULINE** (*Remiz pendulinus*) - **M; très rare** - 2 données. 4ème et 5ème données lozériennes : 1 le 07/10 à la station d'épuration de Banassac (FLe) et 2 au lac du Moulinet le 02/11 (P. HONNORAT).

**LORIOT D'EUROPE** (*Oriolus oriolus*) - **N loc., M rare** - 20 données. 1 chanteur vu le 16/04 (FLe) puis du 08/05 au 16/07, migrateurs probables annuels jusqu'au 20-25/05... Chant du 16/04 au 14/07. Une nichée de 3 jeunes avec adultes se nourrit à Saint-Germain-du-Teil le 14/07 (FLe). 7 territoires possibles (chants) dont 2 hors vallée du Lot : au col de Montmirat le 03/06 (anonyme) et Gabriac le 27/06 (M-N. et B. COUTURAUD).

En région, du 11/04 à Campoussy-66 (P. JOURDE) au 30/09 à La Palme-11 (L. BETBEDER).



Lorient d'Europe reproduction 2016

**PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR** (*Lanius collurio*) - **Estivant N, ass. Comm.** - 606 données (45 % des données régionales et 8 % de plus qu'en 2015). Du 27/04 au 26/09. Principalement de 800 à 1200 m. Nourrissages du 03/06 au 03/09.

Jeunes notés à l'unité ou par 2 seulement jusqu'au 30/07 puis 6 nichées de 3 jeunes à partir du 30/07. 21 nichées répertoriées pour 48 jeunes au moins (15x2, 6x3).

Minimum 8 territoires autour de Saint-Germain-du-Teil, 4 sur la plaine de la Plone, cause Méjean.

En région du 29/04 à Blandas-30 (GTo) au 24/09 à Eyne-66 (S. ALBOUY).



Philippe Feldmann © 2016




De haut en bas et de gauche à droite :


- Grimpereau des bois, Saint-Privat-du-Fau, 23/03/16 , C. Mroczo
- Pie-grièche écorcheur, Carnac, 01/07/16, E. barthez
- Pie-grièche méridionale juvénile, Chanet, 03/08/16 , R. Destre
- Pie-grièche écorcheur, Saint-Julien d'Arpaon, 26/06/16, P. Feldmann
- Rémiz penduline, Lac du Moulinet, 02/11/16, P. Honnorat
- Tichodrome échelette, 16/03/16, Sainte-Enimie, E. Barthez
- Pie-grièche à tête rousse, La-Fage-Saint-Julien, 13/04/16, T. Aucouturier
- Pie-grièche méridionale, cause Méjean, 27/01/16, E. Barthez

### PIE-GRIÈCHE GRISE (*Lanius excubitor*)


- N loc., H - 385 données pour 436 oiseaux (384 données pour 415 oiseaux en 2015). L'espèce semble maintenir ses effectifs suite aux hivers doux successifs et poursuit sa progression vers de nouveaux territoires plus au sud de l'Aubrac et de la Margeride. Présence en période nuptiale sur l'Aubrac et la



Pie-grièche grise  
reproduction 2015



Pie-grièche grise  
reproduction 2016



Pie-grièche grise  
reproduction 1984-2016

Margeride de 900 à 1300 m avec maximum entre 1000 et 1200 m.

Il n'y a cependant cette année au printemps pluvieux que 3 données de reproduction certaine seulement avec nourrissages du 20/05 au 19/07.

### PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE (*Lanius meridionalis*) - N loc., H - 232 données pour 295 oiseaux (185 données pour 252 oiseaux en 2015).

L'espèce poursuit la remontée de ses effectifs après les hivers rigoureux de 2008 à 2010. Présence notée uniquement sur les causses Méjean et de Sauveterre en période nuptiale. 23 territoires notés avec reproduction probable sans recensement exhaustif dont 9 couples avec reproduction certaine, avec des secteurs favorables non prospectés du fait de leur éloignement (causse Méjean). Nourrissages du 16/05 au 16/08 et 6 nichées détaillées pour au moins 15 jeunes (3x2, 3x3).

### PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE (*Lanius meridionalis*) - N loc., H - 5 données.

3 observations simultanées le 13/04 ! 1 à La-Fage-Saint-Julien (GCh), 1 à Finiels (PLu), 1 à Palhers (JF. COURSIMAULT) puis 2 le 27/04 à Montbrun (E. OUVRARD), 1 le 28/04 à Hyelzas (F. LECOURTIER).




Geai des chênes  
Rimeize, 26/04/16, M. Quiot

### GEAI DES CHÊNES (*Garrulus glandarius*) - N séd, MH - 704 données.


Nourrissages du 29/05 au 15/07 avec 3 nichées nourries du 01 au 15/07 de 1, 2 et 4 poussins à minima. Pas plus de 6 ensemble et à dire vrai l'espèce bien qu'abondamment notée ne fait pas l'objet d'une grande attention dans ses comportements.

### PIE BAVARDE (*Pica pica*) - N séd., H - 596 données.

Quelques dortoirs et/ou rassemblements hivernaux sont notés de 8 à 22 oiseaux jusqu'au 15/03. Ensuite les oiseaux sont notés par paires la plupart du temps. Constructions notées dès fin mars. Las, seules deux données concernent des nichées avec jeunes les 12 et 21/07 de 2 et 3 poussins nourris (P. JOURDE, FLe).



Geai des chênes  
reproduction 2016



Pie bavarde  
reproduction 2016


### CASSENOIX MOUCHETÉ (*Caryocatactes caryocatactes*) - NH séd.

- 1 donnée. 1 le 16/05 à Ribennes (JLB), l'espèce pouvant être vue toute l'année. La bonne connaissance du cri est la meilleure façon de le détecter. gare cependant aux geais qui l'imitent très bien et une confirmation visuelle s'impose.

### CHOCARD À BEC JAUNE (*Pyrrhocorax graculus*) - NH séd. - 1 donnée. Première mention


lozérienne sûre, l'espèce ayant été notée parfois mais sans preuves avec de régulières confusions avec le jeune Crave à bec rouge qui a lui aussi le bec jaune. Il n'est toutefois pas surprenant de le contacter de temps en temps, notre région étant sans doute traversée par des oiseaux en transit entre Alpes et Pyrénées. 1 le 07/04 aux Vignes (FLe) qui prend de l'altitude et trace au nord, sans doute en migration. Le cri typique reste le meilleur critère et en l'absence de celui-ci le doute persistera à moins d'une photo incontestable.

**CRAVE À BEC ROUGE (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) - NH séd. - 312 données.** Max de 221 le 10/02 se nourrissant sur la neige sur le Méjean. Une meilleure attention aux comportements de nourrissages permettrait d'avoir des preuves de reproduction...



Crave à bec rouge  
reproduction 2016

**CHOUCAS DES TOURS** (*Corvus monedula*) - **N séd., H** - 199 données. Quelques dortoirs de 100-160 oiseaux à Saint-Chély-d'Apcher, Le Recoux, Les gorges du Tarn, La Canourgue et Marvejols. Envols de jeunes notés fin juin et rassemblements postnuptiaux dès juillet. Pas noté au-delà de 1200 m.



Corneille noire  
reproduction 2016


**CORNEILLE NOIRE** (*Corvus corone corone*) - **NH séd.** - 1162 données. Peu notée au-delà de 1300 m et ne semble toujours pas nicher au-delà de 1200 m. Peu de données de reproduction l'espèce étant jugée peu intéressante : seulement 6 nichées de 1-2 poussins sont observées entre le 10/05 et le 15/06. Quelques beaux dortoirs et/ou bandes hivernales sont notés : Mende (150), Montbel (140), La Canourgue (100), Javols (80).

À noter une hybride mantelée x noire le 15/09 à Saint-Chély d'Apcher (TAu).

**GRAND CORBEAU** (*Corvus corax*) - **NH séd.** - 571 données. Nicheur principalement de 700 à 1100 m mais jusqu'à 1300 m. 7 données seulement de reproductions certaines du 14/04 au 01/06 pour 3 nichées de 2, 2 et 3 poussins. Quelques groupes hivernaux : 46 à Sainte-Lucie, 88 à Chanac, 85 à Grèzes et 150 vers Mende.

**ÉTOURNEAU UNICOLERE** (*Sturnus unicolor*) - **NMH** - 0 données. Aucun contact cette année malgré quelques recherches ciblées.


**ÉTOURNEAU SANSONNET** (*Sturnus vulgaris*) - **NMH** - 378 données. Quelques données de petits dortoirs n'excédant pas 100 oiseaux en janvier/février. Migration notée dès fin février jusqu'à fin mars et dernière troupe notée le 10/04. Ensuite et même avant les oiseaux se cantonnent et nourrissent du 14/04 au 18/07. 23 jeunes issus de 7 nichées complètes (2-5 juv). Premiers rassemblements postnuptiaux dès la mi-mai culminant à 4000 oiseaux sur l'Aubrac le 25/10 (RD).




Moineau domestique  
reproduction 2016

**MOINEAU DOMESTIQUE** (*Passer domesticus*) - **N séd.** - 562 données. Ne dépasse que très peu 1200 m en reproduction. Les grandes troupes semblent révolues, max 40 (en général 10-15) indiquant sans doute une régression numérique de l'espèce. Toujours pas de données des vallées cévenoles... Premiers "chants" le 26/01. Nourrissages de poussins du 02/05 au 28/08, 4 nichées complètes produisant 10 poussins (2x2, 2x3).

**MOINEAU FRIQUET** (*Passer montanus*) - **N loc., H** - 25 données. Un des nicheurs les plus menacés de Lozère : noté sur 6 communes de Margeride avec 1-3 oiseaux sauf



Moineau friquet  
reproduction 2016



Moineau Soulcie  
reproduction 2016

10 le 05/12 à Sinzelles, Fontanes où 3 poussins sont notés le 20/07 (JBo). Egalement 1 oiseau en migration le 12/11 au Puech Debon indiquant des mouvements d'oiseaux toujours porteurs d'espoir. Population nicheuse estimée en Lozère : 5-20 couples.

**MOINEAU SOULCIE** (*Petronia petronia*) - **N loc., trans.** - 106 données. Hivernage à Fontanes (mangeoire) et sur le causse de Sauveterre à La Bazalgette, secteur habituel. Premiers retours mi-février jusqu'à mi-avril dont 8 à Fontans le

06/04 (JLB). 2 nourrissages de 2x1 poussins les 29/06 et 13/07 constituent les seules reproductions avérées ce printemps. Semble progresser encore sur la Margeride. Max de 46 le 21/09 sur le Méjean. Aucune donnée en octobre et novembre mais 4 en décembre dont une à Fontans.


**NIVEROLLE ALPINE** (*Montifringilla nivalis*) - **H rare** - 1 donnée. 1 le 12/11 au sommet de Finiels momentanément enneigé (FLe).

**PINSON DES ARBRES** (*Fringilla coelebs*) - **NMH, comm.** - 1553 données. Chant du 18/02 au 28/07. Nourrissages du 28/05 au 14/08. Gros mouvement de retour du 19 au 26/03 avec près de 14 500 et 18 000 oiseaux en 3h au Puech Debon mais aucun mouvement massif en automne.

**PINSON DU NORD** (*Fringilla montifringilla*) - MH - 236 données. Plus fréquent en hiver 2015/2016 que l'hiver précédent. Quelques troupes de 100-200 oiseaux en janvier, retour ressenti fin février avec quelques bandes jusqu'à 500 oiseaux puis devient rare à partir de mi-mars et dernier le 07/04 à Cassagnas (L. BELLION). Premiers de retour le 08/10 mais pour un automne où l'espèce se distingue par sa vraie rareté avec seulement 10 données jusqu'à fin décembre pour un max ridicule de 7 le 15/10 (FLe).



Pinson du nord femelle  
Cassagnas, 03/01/16, L. Bellion




Serin cini  
reproduction 2016


**SERIN CINI** (*Serinus serinus*) - N comm., M - 315 données. Du 24/02 au 06/11 et un oiseau de passage le 06/12 à Fontanes (JBo). Chant du 12/03 au 29/07. Nourrissages de jeunes du 12/06 au 05/09, 6 nichées produisant seulement 12 jeunes. Globalement pas ou peu noté sur est Margeride et dans les vallées cévenoles. Y est-il vraiment absent ?

**VENTURON MONTAGNARD** (*Serinus citrinella*) - N loc., MH - 71 données. Max de 30 le 29/01 sur le Mont Lozère (PLu). Chants notés en avril et mai avec confirmation de sa présence sur le Méjean en période nuptiale (découverte en 2015). Seule nichée notée avec 2 juv le 21/06 près du col de Finiels, Mont Lozère

(FLe). L'espèce se fait discrète en postnuptial avec seulement 8 données de septembre à décembre.



Venturon  
reproduction 2016



Verdier  
reproduction 2016

**VERDIER D'EUROPE** (*Carduelis chloris*) - NMH - 272 données. Pas noté nicheur au-delà de 1100 m. Répartition semblant discontinue sur le département. A mieux rechercher dans les villages. Max de 29 à la mangeoire le 10/02 à Saint-Germain-du-Teil (FLe). Chant du 12/03 au 23/07. Deux nichées seulement sont observées les 29/05 et 31/08 de 1 et 2 poussins. Peu noté à l'automne, phénomène général chez les granivores.

**CHARDONNERET ÉLÉGANT** (*Carduelis carduelis*) - NMH - 570 données. Reproduction notée jusqu'à 1300 m. Afflux remarqué aux mangeoires fin février/début mars avec plusieurs observations de 20-30 oiseaux. Chants toute l'année mais surtout du 07/04 au 15/06. 21 poussins au moins issus de 11 nichées (1-4 juv) sont nourris du 20/06 au 05/09. Quelques troupes de 50 oiseaux sont notées à l'automne.



Venturon montagnard  
Montrodat, L. Destrade, 30/01/16



Verdier mâle et juvénile  
Montrodat, 29/05/16, L. Destrade



Tarin des aulnes et Verdier d'Europe  
Sainte-Enimie, 01/03/16, O. Barthez

**TARIN DES AULNES** (*Carduelis spinus*) - N loc.? MH - 299 données (180 en 2015). Quelques hivernants et de plus en plus d'oiseaux aux mangeoires en février. Devient commun en mars avec quelques troupes de 50-70 oiseaux et un max de 107 oiseaux en migration le 10/04 au Puech Debon. Derniers le 16/04 hormis un oiseau à Arzenc-de-Randon le 18/07 (JLB) et premiers le 23/09 pour un max de 230 le 10/11 à Ribennes (JLB) et quelques oiseaux ou petites bandes en maraude en décembre.


**LINOTTE MÉLODIEUSE** (*Carduelis cannabina*) - NM comm., H rare - 425 données (365 en 2015). Désormais considérée hivernante sur les causses avec un max de 250 les 18/01 et 15/02 sur le Méjean (FLe) dans un champs non retourné. Migratrices en bandes jusqu'au 20/04. Chants du 12/04 au 29/06. 6 nichées complètes produisent 20 jeunes (2-6) du 11/05 au 06/08. Max de 100 le 21/10 sur le Méjean et pas d'autres troupes excédant 20-30 oiseaux.



Linotte mélodieuse  
Malbouzon, 17/05/16, M-L. Cristol


**SIZERIN FLAMMÉ** (*Carduelis flammeus*) - NM comm., H rare - 1 donnée. 1 oiseau en migration active le 06/03 au Puech Debon (FLe), bien maigre récolte après quelques années fastes.

**BEC-CROISÉ DES SAPINS** (*Loxia curvirostra*) - NMH - 228 données. Chants notés presque toute l'année jusqu'au 22/06 et à partir du 08/09 ! Peu noté au printemps (seulement 60 données) avec moult secteurs habituels vides d'oiseaux faute de graines en hiver 2015/2016. Retour marqué à partir de fin juillet les oiseaux se mettant à nicher avec quelques cas de nourrissages toujours difficiles à observer en septembre. Max de 54 le 08/10 à Bonnacombe (FLe).



Bec-croisé des sapins  
reproduction 2016


**BOUVREUIL PIVOINE** (*Pyrrhula pyrrhula*) - N séd., H - 254 données. Noté partout en hivernage mais seulement au-dessus de 800 m en reproduction où il est très rare des causses aux vallées cévenoles. Chant du 02/01 au 19/07. Max de 9 le 10/02 à Meyrueis (EBa) et de 12 le 19/11 à Saint-Germain-du-Teil (FLe) dans un automne où l'espèce est bien fréquente (bonne reproduction 2016 ?). Une seule nichée de 3 juv le 16/08 à Grèzes (MLC).



Grosbec casse-noyaux  
répartition 2016

**GROSBEC CASSE-NOYAUX** (*Coccothraustes coccothraustes*) - N rare, MH - 167 données. (284 en 2015). Petite année. Max de 5 en janvier-février et le plus souvent noté à l'unité puis retours décelés début mars jusqu'au 09/04 pour un max de 26 en migration le 19/03. Seul oiseau probablement local, 1 le 28/07 à Lachamp (JLB) puis retour à partir du 24/09 sans max notable et total de 58 seulement sur la saison au Puech Debon en migration conformément à un automne/hiver où l'espèce brillera par son absence comme nombre de granivores avec seulement 4 données en novembre et 1 seule en décembre !

**BRUANT JAUNE** (*Emberiza citrinella*) - NMH, comm. - 525 données. 2 fois plus noté en hiver 2015/2016 que le précédent avec notamment une superbe troupe (devenu rare) de 150 le 26/01 sur le causse de Sauveterre (FLe). Chants du 14/03 au 15/08. Nourrissages du 02/06 au 28/07 mais sans nichées complètes recensées.



Bruant zizi  
reproduction 2016




Bruant zizi poussin  
Bagnols-les-Bains, 21/07/16  
D. Bugaud

**BRUANT ZIZI** (*Emberiza cirlus*) - NM, H rare - 308 données. Semble moins rare en hivernage avec 10 données en janvier/février mais peut-être est-ce une meilleure attention de la part des observateurs ? Chants du 14/02 au 25/08 puis reprises ponctuelles du 22/09 au 14/12 (16 données) ! Nourrissages du 11/05 au 23/08 avec deux nichées complètes de 4 poussins les 21/07 et 23/08.



Bouvreuil pivoine, Aumont-Aubrac, 12/03/16, O. Reisinger  
 Grosbec casse-noyaux, Marvejols, 04/03/16, R. Destre  
 Bec croisé des sapins, Charpal, 18/12/16, D. Bonnet




Bruant fou  
 reproduction 2016



Bruant fou  
 Le Pont de Montvert, 09/07/16 A.  
 Fleixas

**BRUANT FOU** (*Emberiza cia*) - N séd., err. - 126 données. Surtout noté sur les versants raides des gorges, monts et vallées où il descend en hiver. Est-il absent de l'Ouest Margeride/Aubrac ? Sans doute présent dans les gorges de Bès et de la Truyère qui manquent cruellement d'observateurs. Chants du 21/05 au 04/07 et becquées du 23/06 au 27/07 sans jeunes observés. Quelques petits groupes de 4-6 en automne/hiver.




Bruant ortolan  
 reproduction 2016

**BRUANT ORTOLAN** (*Emberiza hortulana*) - N loc., M - 89 données. Du 19/04 au 23/09 uniquement sur les causses et le Mont Lozère mais avec un chanteur le 11/07 au col Solidès, Bassurels (JD. MÉRIC), nouveau site inconnu jusqu'alors, à suivre. Un mâle est en halte sur l'Aubrac le 10/09 (RD) où des habitats favorables sont présents mais où l'espèce n'est pas connue nicheuse. Chants du 19/05 au 20/07 et un anachronique le 31/08. Un seul indice certain d'un nourrissage le 01/07 sur le Méjean.

**BRUANT DES ROSEAUX** (*Emberiza schoeniclus*) - N prob. loc., M - 72 données. Passage du 18/02 au 17/04 pour un petit max de 8 le 13/03 à Booz (FLe) puis du 05/10 au 12/11 sans max supérieur à 3. 1 et 3 oiseaux traînent à Montbel et Usanges jusqu'au

10/12. Nicheur uniquement sur l'Aubrac avec 2 et 1 chanteurs au moins aux Salhiens et 1 à Usanges (Souveyrols non suivi).

**BRUANT PROYER** (*Emberiza calandra*) - **N loc.**, **M** - 168 données. Du 14/04 au 11/09 pour les locaux et les 06/10 et 11/11 en migration. Chants du 09/05 au 12/07 pour au moins 111 chanteurs. Nourrissages du 10/06 au 25/07.



Bruant proyer  
reproduction 2016



Bruant des roseaux mâle  
Usanges, 19/03/16, F. Legendre



Bruant proyer  
cause Méjean 28/05/16, E. Barthez

**MERCI** encore une fois à tous ceux et toutes celles qui se donnent la peine de transmettre leurs observations en espérant avoir pu retranscrire le plus complètement possible dans la présente synthèse le fruit de leurs efforts.



Cisticole des joncs  
11/12/16, Ispagnac, E. Barthez

**Texte achevé le 30/01/2016**

**Validation des données** : Marie-Laure CRISTOL, Christine GONELLA, Rémi DESTRE, François LEGENDRE, le CHR-LR et le CHN le cas échéant

**Coordination** : François LEGENDRE

**Rédaction** : François LEGENDRE et Emmanuelle BARTHEZ

**Relecture** : Emmanuelle BARTHEZ et François LEGENDRE

**Mise en page** : Emmanuelle BARTHEZ

**Couverture** : Séverine MERLY

**Ont contribué à cette synthèse** de près ou de loin par leurs informations : Jean-Luc BIGORNE, Gaël KARCZEWSKI/PN des Cévennes, Philippe LECUYER/LPO Grands Causses, Jean-Pierre MALAFOSSE/PN des Cévennes.

## Inventaire des oiseaux de Lozère au 31/12/2016

Espèce		
Cygne tuberculé	Max : 3 le 16/05/87 à Villefort.	
Cygne de Bewick	Naussac : 5 le 19/11/89.	
Cygne chanteur	Naussac : 2 le 14/11/84. Ganivet : 1 le 18/04/2014.	
Oie cendrée **	23/09-22/12 et 16/02-16/05.1 ssp <i>rubirostris</i> le 11/10/92 à Naussac. Hiv. 4 ind 2014/2015 et 8 en 2016/2017 et repro 2015 et <b>2016</b> (3 et 5 juv)	Max : 150 le 15/11/2010 à Mende.
Bernache nonnette	Naussac : 1 du 05/11 au 03/12/00, sauvage probable.	
Bernache cravant	Naussac : 1 du 16 au 24/05/85, 1 du 26/04 au 06/05/02 (ssp <i>bernicla</i> ) et 1 le 04/05/03.	
Tadorne de Belon	Du 24/07 au 22/05.	Max : 72 le 12/10/03 à Naussac.
Canard siffleur	Du 08/09 au 24/05.	Max : 119 le 10/12/02 à Naussac.
Sarcelle d'hiver**	Nidif. en 1983 à Naussac et 1983, 1984, 1985, 1993 à Charpal.	
Canard colvert**	Accouplement à partir du 17/03. Max de 11 pulli.	
Canard pilet	Du 17/09 au 10/04.	Max : 53 le 20/03/88 à Naussac.
Canard souchet	Du 13/06 au 08/05.	Max : 68 le 09/02/92 à Naussac.
Canard chipeau	Du 15/06 au 30/04.	Max : 137 le 14/11/99 à Naussac.
Sarcelle d'été**	Du 07/03 au 28/10, nidif. à Barrandon en 1986.	Max : 23 en 03/91 à Naussac.
Nette rousse	Du 03/09 au 27/05.	Max : <b>10 le 24/11/2016</b> à Naussac.
Fuligule milouin	Toute l'année, régulier du 28/08 au 28/03.	
Fuligule nyroca	Naussac : 1 le 11/09/83 et 1 le 03/11/03.	
Fuligule morillon	Surtout du 12/10 au 31/03, rare hors ces dates.	Max : 26 le 20/03/88 à Naussac.
Fuligule milouinan	Naussac : 6 le 01/01/85 puis 1 du 08/12/91 au 05/01/92, du 16/02 au 06/03/94, le 16/01/96 et 2 le 23/12/01.	
Eider à duvet	Du 01/09 au 14/04 (7 données).	Max : 3 le 01/09/88 à Barrandon.
Harelde boréale	1 immature le 21/10/2009 à Booz.	
Macreuse noire	Naussac : 1 le 28/11/96 et 1 le 14/11/99. Charpal: 3 le 05/11/2007.	
Macreuse brune	Naussac : 1 le 22/10/83, 3 le 12/12/84, 1 le 28/02/93, 1 du 16/12/00 au 23/12/01. Charpal : 3 le 11/11 puis 9 le 15/11, 2 le 18/11 et 1 le 08/12/01, <b>2 le 30/11/2016</b>	
Garrot à œil d'or	Naussac : du 03/12 au 26/03 et le 02/05/09. 3 hivernages : 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004.	Max de 2 ensemble.
Harle piette	Naussac : 1 fem du 04/01 au 23/02/85 et 1 fem le 15/01/2011.	
Harle huppé	Du <b>18/10</b> au 27/04.	Max : <b>9 le 24/11/2016 Naussac</b>
Harle bièvre	Du 09/12 au 22/04 et <b>1 le 27/10/2016 à Charpal.</b>	Max : 3 le 27/12/10 à Naussac.
Gélinotte des bois	Introduite entre 1991 et 1997, dernière observation en septembre 1998.	
Tétras-lyre	Introduit entre 1975 et 1985, dernière observation en 1994.	
Grand Tétras**	Introduit entre 1978 et 1993, quelques lâchers depuis. Se maintient au Sapet et forêts du Mont Lozère.	
Perdrix rouge**	Chant du 31/01 au 07/10. Max : 24 le 28/09/04 à Marvejols ; <b>18 pulli le 08/07/2016 à St Sauveur de Ginestoux.</b>	
Perdrix grise**	Souche sauvage sur le Mont Lozère, lâchées ailleurs.	
Caille des blés**	Du 16/04 au 01/11. Chant du 16/04 au 18/08 jusqu'à 1100 m. 1 tuée à la chasse le 13/11/2010.	Max : 9 chanteurs le 16/06/92 à Chanet et 15 le 29/08/95 à Recoules-de-Fumas.
Faisan de colchide **	Lâchers de chasse. Une repro : <b>9 poussins le 17/06/2016 Mont Lozère.</b>	
Plongeon catmarin	11 de nov à janv, 1 le 03/04/88 à Naussac, 1 le 02/05/2007 à Pied-de-Borne.	Max : 2 le 20/12/87 à Naussac.
Plongeon arctique	Du 09/11 au 04/05.	Max : 7 le 03/05/86 à Naussac.
Plongeon imbrin	À Naussac : 1 le 23/02/85 et 1 H1 le 12/01/2013. 2 le 17/01/2015 puis 1 jusqu'au 25/03/2015.	
Grèbe castagneux**	Chant du 04/03 au 18/07. Rares hivernants.	
Grèbe huppé**	Nidif. Naussac depuis 1982 et Charpal 1992-2008, St Andéol 2015. Parades du 13/02 au 29/05.	Max : 38 le 13/10/07 à Ganivet. Max : 134 le 03/09/2015 Naussac. Max : 13 Cples à Naussac en 1983.
Grèbe jougris	Naussac : 1 le 17/10/93 et le 03/05/2014 ; antérieurement 4 le 02/11/84 au Moulinet.	
Grèbe esclavon	Naussac : 1 le 27/01/97, du 12 au 16/11/99 et le <b>15/12/2016</b>	
Grèbe à cou noir	Nidif à Naussac en 1982 et Charpal en 1983.	Max : 16 le 22/08/82 à Naussac. Aucune obs en février.
Océanite tempête	2 après la tempête du 26/12/99 (Mt Lozère), 5 après la tempête du 24/01/09 (Mt Lozère, Aubrac, Margeride).	
Grand cormoran	Migration et hivernage du 30/07 au 15/04, rare après. <b>Estivant depuis</b> Max : 304 le 13/11/05 sur toute la Lozère. <b>2016.</b>	
Butor étoilé	1 le 16/05/90 à Usanges, 1 le 15/11/2000 au lac du Born, 1 le 25/09/2010 au Moulinet, 1 le 16/03/2012 à Marchastel.	
Blongios nain	Mende : 1 fem épuisée dans un platane le 31/03/82. Le Malzieu : 1 m le 17/05/08, 1 m à Booz le 20/05/2014.	
Bihoreau gris**	Du 22/03 au 10/11. Repro 2008 Booz (1 juv), prob 2016	Max 5 le 10/09/93 à Naussac et 18 total en 2015
Crabier chevelu	28/05/85 Naussac, 04/06/02 aux Vignes, 24/05/2012 Booz, mig 06/06 et 18/08 Aubrac	
Héron garde-bœufs	35 mentions du 02/03 au 30/06 et du 06/08 au 28/11.	Max 30 le 12-17/05/85 Sauveterre et 10/05/2015 Marvejols
Aigrette garzette*	Mig du 12/03 au 17/06 et du 19/07 au 31/12. Hivernage du 19/12/13 au 18/02/14.	Max 16 le 31/05/08 à Montbel. 32 en 2008. Repro 2011 à Booz
Grande aigrette	Toute l'année, surtout d'octobre à mars	
Héron cendré**	A niché : Espagnac, Florac, Naussac, Banassac, Aubrac.	Max : 15 le 01/04/04 à Naussac. <b>274 données en 2016.</b> Max : 38 à Naussac le 13/09/02 et Max de 28 nids en 2004.
Héron pourpré	Du 01/04 au 24/05 et du 30/07 au 07/10.	
Cigogne noire*	Du 04/02 au 25/10. Nidif possible en 2004.	Max : 6 le 02/04/2011 à Booz. Max : 16 le 06/08/98 au Pompidou, 57 en 2008 ; 21 le 20/03/12.
Cigogne blanche	Du 27/01 au 09/06 et du 13/07 au 01/12.	
Spatule blanche	Naussac : 1 le 11/10/92.	

Flamant rose	1 dans l'été 1980 à Naussac, 1 en vol au Point Sublime le 01/06/98 et 6 à Naussac le 25/05/03.	
Bondrée apivore**	Du 16/04 au 05/10. Parades jusqu'au 25/08. Mig du 16/04 au 06/06 et du 02/08 au 05/10.	Max : 300 le 15/05/09 à Barre des C. ; 281 le 26/08/09 aux Salces. 2009: 556 pré., 686 post. = 1242 mig. 1088 en 2011 au Puech Debon.
Élanion blanc*	Nicheur en 1998, 2014, 2015, <b>2016</b> . 1 le 12/04/2006 Sauveterre, 05/08/2011 Servières, 2012 : 30/05 Drigas, 25/09 Le Massegras + 2 obs février et novembre 2015	
Milan noir**	Du 10/02 au 22/10. Parades apd 19/03, envol apd 07/06. Mig du 10/02 au 20/05, 09/07 au 22/10.	Max : <b>Puech Debon : 1628 prénup 2016, 806 le 27/03/16 total 2020 en 2016</b>
Milan royal**	Acplt apd 09/03, envol juv apd du 25/06. Mig du 13/01 au 24/05 et 24/08 au 17/12.	Max : 304 le 06/10/2012 migr. Puech Debon, et 58 en dortoir le 17/11/2008 au Tensonnieu. Max mig post total 1120 dont 801 Puech Debon en 2012.
Pygargue à queue blanche	1 du 05/12/95 au 01/02/96, 1 le 30/12/01 et 1 le 15/11/03, secteur des gorges du Tarn et de la Jonte.	
Gypaète barbu	Réintroduction en 2012 : 2 oiseaux lâchés dans la Jonte ; 3 lâchés en 2013 dans l'Aveyron.	
Percnoptère d'Égypte**	Du 09/03 au 01/09. Nicheur en 1997, 1998 et 2007. 3 c en 48/12 en 2007, 0 en 2009, 3 en 2012 pour 2 jeunes à l'envol.	
Vautour fauve**	Disparu en 1945, réintroduit de 1981 à 1986, première repro 1982, 414 c et 309 jeunes en 2012 sur Lozère-Aveyron.	
Vautour moine**	Disparu en 1906, réintroduit de 1992 à 2003, première repro 1996. 20-21 c sur Lozère-Aveyron de 2010 à 2013.	
Circaète Jean le Blanc**	Du 16/02 au 09/11, parades du 27/02 au 02/07, pontes du 27/03 au 16/05. Très mauvaises repro en 2010 et 2012.	Max : 27 le 28/08/05 aux Bessons en migration.
Busard des roseaux	Du 18/02 au 30/11. Max : 52 en 2 h 30 le 01/04/04 au Rozier et total de 111 en 2004.	
Busard Saint-Martin**	Nidif. jusqu'à 1460 m. Max : 17 dortoir 17/10/10 Malbouzon. Mig du 02/03 au 01/04 et du 02/09 au 20/11. Envols apd 17/06.	
Busard pâle	Méjean : 1 m le 03/04/04, 1 j le 07/09/08, 1 f le 04/05/10, 1 m le 05/04/06 à Lanuéjols, 1 f le 22/05/10 sur Sauveterre et 1 m le 30/09/2012 au Massegras, 1 juv le 02/09/14 sur Aubrac.	
Busard cendré**	Du 27/03 au 25/09. Nourrissage jusqu'au 24/08.	Max : 17 le 03/08/81 vers Charpal.
Autour des palombes**	Parades du 13/02 au 30/04. Tiré le 24/08/96 à St Etienne-du-Valdonnez. Mig du 02/03 au 07/04 et du 28/08 au 13/10.	
Épervier d'Europe**	Parades du 20/02 au 16/06. Envols juv du 26/06 au 31/08. Mig du 16/02 au 02/05 et du 20/08 au 07/11.	Max : 20 mig le 21/10/2012 au Puech Debon ; total 101 en 2012.
Buse variable**	Parades du 18/01 au 18/05. Mig du 20/01 au 18/04 et du 27/08 au 23/11. Juv apd du 08/04.	Max : 35 le 18/12/11 au Puech Debon en migration, 171 en 2012 et 36 le 30/12/14 au Recoux en hivernage.
Buse pattue	1 le 09/12/98 sur l'Aigoual vers Bassurels.	
Aigle criard	Gorges du Tarn en 1934 et 1954. Tonn (estonien équipé d'une balise) : Vallée Française le 13/11/2008, Aubrac (12) le 05/04/2010 et Fontanes le 30/03/2012.	
Aigle Impérial	Gorges de la Jonte, Saint Pierre des Tripiers le 23/11/2008, juvénile.	
Aigle royal**	Envol juv entre le 25/06 et le 10/08. 12 territoires en 2010 et 9 couples reproducteurs en 2012.	Tirs en 1992 et 1998.
Aigle botté**	Du 02/03 au 24/10. Accouplement apd 25/04. Envol juv apd 10/07. Nidification certaine depuis 2004. 5-10 c	
Aigle de Bonelli	14 données de février-mars et juillet-septembre ainsi que décembre, 1ac ou imm.	
Balbusard pêcheur	29/02-26/05 et 14/07-16/11, juin 2009. Max : 58 en mig 2014, 8 en 1 j le 01/04/04, 7 ens le 25/03/08 au Malzieu.	
Faucon crécerellette	Du 29/07 au 25/09. Max 1700 le 24/08/2012 sur le Méjean.	
Faucon crécerelle**	Accouplements du 08/03 au 30/05, envol 03/06-10/09. Max : 114 sur le Méjean le 29/07/97... sans doute pas 7 juv en 2014. Mig du 11/03 au 01/05 et du 30/08 au 03/11. du crécerelle...	
Faucon kobez	Du 18/04 au 30/06 et 29/07 au 16/09 (19 données d'automne).	Max : 22 le 22/05/08 à La Parade, 104 en 2008.
Faucon émerillon	Du 10/09 au 09/05. Max : 36 total en 2012 et 3 le 10/09/2007 à Chanet.	
Faucon hobereau**	Du 04/04 au 22/10. Mig jusqu'au 14/05 et apd 17/08. Juv apd 07/07 jus. 31/08.	Max : 4 le 24/08/2007.
Faucon lanier	1 le 26/05/95 à Marchastel (origine inconnue).	
Faucon d'Éléonore	Du 22/04 au 14/09 et 1 le 29/10/11 (45 données : 0-7 par an)	Max : 4 les 17/06/00, 23/07/94 et 09/08/88.
Faucon sacre	1 fem le 25/02/00 sur l'Aigoual (origine inconnue).	
Faucon pèlerin**	Parades du 11/02 au 22/03. accplt apd 15/02. Envol juv apd 15/05.	Tir en 1997. Max : 6 (dont 4 juv).
Râle d'eau**	Hivernage 1973 à Florac, 2012/2013 à Booz. Nidif cert. dep. 1998 à Usanges. Max : 8 le 27/06/04 à Usanges. 5 c en 2012.	
Marouette poussin	1 fem. Le 24/03/2012 au Malzieu.	
Marouette ponctuée	9 d. Naussac : 14/01/94, 30/08 et 08/09/96, 08/08/99 et 1 chanteur le 27/06/04 ; 1 le 07/09/05 et du 27/08 au 07/10 au Moulinet (5 contacts d'un oiseau). 1 le 09/05/07 sur le Mont Lozère. <b>Booz : 5-6/09/2016.</b>	
Râle des genêts	1 cht à Recoules-de-Fumas le 20/09/97, La Fage-Montivernoux 01/06/01, Pont-Archat 11/07/01 puis 1 au Chastel-Nouvel le 28/08/05. 2008 : 3 chts dont 1 du 11/06 au 22/07 à Mende ; 2012 : 9 chts du 29/05 au 12/07 ; 1 en 2013.	
Gallinule Poule d'eau**	Nid jusqu'à 1320 m à Bonnacombe, Aubrac. Juv apd 09/05.	Max : 46 le 04/10/07 à Booz. 8 nichées en 2008.
Foulque macroule**	A niché à Naussac, Les Salhiens, Charpal.	
Grue cendrée	Du 08/10 au 29/12 et du 28/01 au 10/04. Max : 500 le 27/10/10 à Palhers et 727 en 2010.	
Outarde canepetière**	Du 10/04 au 02/10. Chant du 02/05 au 04/07. Dernière reproduction en 1995. Max : 10 en 09.	
Outarde barbue	Signalée fin XIXème siècle.	
Huitrier-pie	Naussac : 1 du 14 au 25/05/85 et le <b>20/05/2016</b>	
Échasse blanche**	Du <b>25/03</b> au 06/08. Nidif à Naussac en 1982 et 1983. Max : 15 le 05/06/06 au Moulinet et 21 en 2012.	
Avocette élégante	Du 16/03 au 02/05 et du 23/07 au 25/11 (12 données). Max : 15 le 02/05/2015 à Naussac.	
Oedicnème criard**	Du 13/03 au 15/10. Max : 20 le 11/09/93 à Mas-de-Val.	

<b>Glaréole à collier</b>	<b>1 le 03/04/2016 au Malzieu</b>	
Petit gravelot**	Du 21/03 au 09/10. 3-5 c.	Max : 40 les 25/09/01 et 20/08/02 à Naussac.
Grand gravelot	Du 25/03 au 22/11.	Max : 14 le 22/09/84 à Naussac.
Gravelot à collier int.	Naussac : 1 le 14/05/83.	
Pluvier guignard	Du 14/08 au 18/10, 1 le 11/03/09 et du 18/04 au 14/05.	Max : 55 le 04/09/10 au Fourcat et 337 en 2010.
Pluvier doré	Du <b>24/02</b> au 22/05 et du 15/09 au 18/12.	Max : 200 le 29/10/75 sur le Méjean.
Pluvier argenté	1 le 01/03/08. Du 06/05 au 30/05 et du 02/09 au 01/11.	Max : 7 le 06/05/03 à Naussac.
Vanneau huppé**	Parades apd du 03/03. Nidif. sur l'Aubrac et Margeride.	Max : 355 le 19/03/11 au Puech Debon (mig). 5-17 c.
Bécasseau maubèche	Du 28/03 au 26/05 et du 21/08 au 27/09 (8 données).	<b>Dernière obs : 31/03/2016 aux Salhiens</b>
Bécasseau sanderling	Du 29/04 au 22/05 et du 21/08 au 07/10 (10 données).	<b>Dernière obs 19/05/2016 à Naussac</b>
Bécasseau minute	Du 23/03 au 14/05 et du 10/07 au 05/11.	Max : 11 les 25/09/88 et 29/09/84 à Naussac.
Bécasseau de Temminck	Charpal : 1 le 12/06/91. 2 le 11/09/2014 et <b>1 le 15/09/2016 à Naussac.</b>	
Bécasseau cocorli	1 le 19/05/84 puis du 09/08 au 07/10.	Max : 6 les 27 et 28/08/02 à Naussac.
Bécasseau variable	20/03-26/04 puis 31/07-21/11. Max : 15 le 02/10/88 à Naussac.	
Combattant varié	Du 05/03 au 13/05 et du 18/07 au 27/09.	Max : 21 le 14/04/11 à Usanges.
Bécassine sourde	Du 25/01 au 28/04 et du 11/09 au 24/11. Max 98 en 2012, 35 baguées 04/04/2012 Aubrac.	
Bécassine des marais**	Du 13/07 au 23/04 surtout. Parade apd 10/04; 1-4 c depuis 2010.	Max : 30 le 13/08/2012 à Usanges.
Bécassine double	Tuée à la chasse sans plus de précisions. 1 le 26/04/2015 à Usanges	
Bécasse des bois**	Ponte apd 21/03, croûle jusqu'au 22/06.	Max : 12 le 25/05/96 en Margeride et 15 le 27/11/03 à Chanac.
Barge à queue noire	Naussac : 1 les 06/07/82, 03/07/83, 03/04/88, à Charpal le 08/03/93, au Moulinet le 09/04/02, Le Malzieu 10/08/2015	
Barge rousse	1 le 13/09/87 et Max 11 du 08/09 au 22/09/91 à Naussac et 1 le 09/05/04 à Usanges.	
Courlis corlieu	Du 12/04 au 11/05 et du 06 au 31/07.	Max : 8 le 31/07/83.
Courlis cendré**	Du 20/02 au 24/12 ; 1 le 02/01/00 à Naussac. Parades 13/03-10/06. 15-20 c.	Max : 25 fin 08/05 vers Malbouzon.
Chevalier arlequin	Du 18/03 au 09/05 et du 31/07 au 16/11.	Max : 8 le 27/09/99 et 4 le 28/04/97.
Chevalier gambette	Du 22/02 au 10/10.	Max : 36 le 13/05/83 à Rieutort-de-Randon.
Chevalier stagnatile	1 le 11/09/2014 à Naussac.	
Chevalier aboyeur	Du 25/03 au 31/05 et du 06/07 au 21/11.	Max : 25 le 30/04/09 à Montbel.
Chevalier culblanc	Du 04/01 au 02/02/10 ; du 02/03 au 12/12.	Max : 11 les 30/03/10, 01/04/00, 15/04/08 ; hivernage 2014/2015 à Booz.
Chevalier sylvain	Du 04/04 au 25/05 et du 29/06 au 12/10.	Max : 28 le 01/05/10 à Usanges.
Chevalier guignette**	Surtout du 15/03 au 15/10. Hivernage apd 2006/2007. Parades apd 12/04, envol apd 21/05.	Max : 27 le 28/04/2012 à Charpal.
Tournepierrre à collier	6 d de Naussac, 1 Charpal (2 le 22/08/06), 2 du « Ventalon » du 07-08/05 et du 17/08 au <b>24/09</b> . Derniers : <b>24/09/2016</b>	
Labbe pomarin	1 se pose sur le Mont Lozère le 24/10/00.	
Labbe parasite	1 juv en migration le 04/09/2012 à Booz ; 1 en mig le 21/10/14 sur le Méjean.	
Mouette mélanocéphale	Naussac : 2 le 22/04/83, 10 le 17/04/03, 1 les 29-30/04/03, 11 le 23/11/08, 2 le 06/05/09, <b>1 le 09/05/16</b> . Booz : 1 le 02/07/14.	
Mouette pygmée	Du 16/04 au 24/05 et du 06/07 au 10/12.	Max : 12 le 26/04/02 à Naussac.
Mouette rieuse**	Nidif. en 1982 à Naussac (90 cples), tentatives en 83, 84 et 85 à Charpal.	Max : plus de 220 le 14/11/99 à Naussac.
Goéland d'Audoain	Naussac : 1 le 03/05/86.	
Goéland cendré	Du 22/11 au 14/03. 1 le 18/06/02 à Naussac possible.	
Goéland brun	Toute l'année sauf août. Repro 2013 à Naussac (1 juv)	Max : 7 le 12/04/03 à Naussac.
Goéland argenté	Depuis 2000 : 1 le 27/02/07 à Booz, 1 le 18/11/07 ; Charpal : 2 le 03/10/08, 4 le 14/12/10 , 1 le 06/02/13 CTE.	
Goéland leucopnée**	Nidif. à Naussac dep. 1983 et Charpal vers 2000. 35 c	Max : 400 à Langogne les 05 et 06/11/97 ; 20-25 c en 2010. 2013.
Goéland marin	Naussac : 1 à 3 oiseaux du 03 au 22/12/83, 1 le 26/01/09.	
Mouette tridactyle	1 le 01/01/75 au Mt Aigoual, 8 du 05 au 08/02/84 à Florac ; 3 le 23/02/84 à Mende , 13/03/08 dans le Valdonnez, 9 du 25 au 28/01/2009.	
Sterne caugek	1 le 29/06/85 à Naussac, 2 les 03 et 04/05/86 à Naussac, 1 le 17/04/98 au Moulinet.	
Sterne pierregarin	Du 26/04 au 04/10/2015 à Naussac et le 17/10/83 à Villefort (10 données).	
Sterne naine	Naussac : 4 le 11/06/89 et 2 le 23/09/01.	
Guifette moustac	Du 11/04 au 01/07 et du 14/08 au 06/09.	Max : 30 le 20/04/83.
Guifette noire	Du 16/04 au 25/09, surtout mai et septembre.	Max : 143 le 06/05/03.
Pigeon biset	Souche sauvage à préciser : apd du 28/01 au 09/10. Surtout noté en mars.	Max : 5.
Pigeon colombin*	30/01-10/12 et 06/01/2015. Chant du 23/02 au 21/08.	Max : 31 le 08/03/85 à Barjac.
Pigeon ramier**	Chant du 15/01 au 05/10. Mig du 18/02 au 15/04 et du 10/09 au 27/11.	Max : 1442 le 19/03/11 au Puech Debon.
Tourterelle turque**	Chant tous les mois. Couve à partir 29/01.	Max : 82 le 01/12/11 au Recoux.
Tourterelle des bois*	Du <b>12/04</b> au 23/09. Chant du 19/04 au 05/07.	Max : 6 le 17/07/09 à St Bonnet de Chirac.
Coucou gris**	Du 12/03 au 28/09. Chant du 12/03 au 24/07.	Max : 17 le 16/05/05 aux Aygüières (Chanac).
Coucou geai*	Du 08/04 au 08/09. Chant jusqu'au 26/05. 1 le 17/01/12. Nidif. Irrég. depuis 1975.	Max : 3 juv sur les grands causses.
Effraie des clochers**	Altitude max de 1180 m.	Max : 7 le 22/06/95 à Ste-Enimie (dont 5 pulli).
Petit duc scops**	Du 17/03 au 29/09. Chant du 22/03 au 09/09.	Max : 4 chanteurs ensemble et 25 en tout en 2006.
Grand-duc d'Europe**	Chant tous les mois. 20-30 c en 2013.	7 électrocutions de 1992 à 2000, piégé en 2004.
Chevêche d'Athéna**	Chant toute l'année. Envol juv du 29/05 au 26/08. Pas au-delà de 1250 m.	
Chouette hulotte**	Chant tous les mois. Juv apd 02/03. Nourrissage jusqu'au 04/09.	

Hibou moyen-duc**	Chant du 11/01 au 30/05. Sortie du nid du 03/05 au 21/09. Dortoir de 66 le 15/02/08 et 81 le 24/01/2015 au Massegros.	
Hibou des marais	Nidif. en 1976 à Charpal (4-5 eplés) et 2014. Du 29/09 au 26/05.	Max 32 le 11/01/08 au Massegros, 53 hiver 2014/2015.
Nyctale de Tengmalm*	Chant du 11/01 au 05/07 et 20/09. Alt min 820 m. 10-30 c supposés ; 66 chanteurs causses/Cévennes (30/48) en 2012.	
Engoulevent d'Europe**	Du 16/04 au 01/10. Chant du 16/04 au 24/08. Jusqu'à 1450 m.	Max : 10 le 10/06/94 à Mas-Saint-Chély.
Martinet noir**	Du 30/03 au 10/10/99. Nidif. jusqu'à 1250 m et 14/09.	Max : plusieurs dizaines de milliers à Marvejols le 01/08/93.
Martinet à ventre blanc**	Du 14/03 au 01/10.	Tarn, Jonte, Balduc. Max : 120 le 21/09/09 au Rozier.
Martin pêcheur d'Europe*	Pas plus de 3 ensemble. Jeunes du 22/05 au 26/08. Max à 1238 m.	
Guêpier d'Europe	Du 13/04 au 21/09. Rare du 28/05 au 14/08.	<b>Max : 76, 01/09/2016 Bonnetcombe et tot. 266 en 2016</b>
Rollier d'Europe	Du 06/05 au <b>26/09</b>	<b>Total 50 ind. en 2016, 19 ens. 28/0816 Vébron (dortoir)</b>
Huppe fasciée**	Du 05/03 au 25/09. Chant 25/02/2016 puis du 27/03 au 19/07. Max : 8 le 29/06/14 ; 43 chanteurs en 2014.	
Torcol fourmilier**	<b>1 du 17-30/01/2016 Montrodar.</b> Du 05/03 au 24/09. Chant du 05/03 au 19/07. Envol juv jusqu'au 20/09. Max : 4	
Pic cendré (disparu)	1 chanteur le 22/06/1993 dans le bois des Oubrets, Meyrueis. Pas au-delà de 800 m.	
Pic vert**	Chant du 03/01 au 22/07. Tambour du 25/02 au 18/05.	Max 6 le 13/12/08 à Canilhac.
Pic noir **	Chant du 01/01 au 13/07, tambourinage jusqu'au 13/08 puis <b>10/09 au 10/12/2016.</b>	
Pic épeiche**	Tambour du 04/01 au 08/06 et du 03 au 19/10. Chant jusqu'au 20/06. Envol juv apd 19/05.	
Pic mar**	Lot aval depuis Chanac jusqu'à 1000 m (chênaie). Tambours du 01/03 au 26/05. Repro depuis 2006. 5-10 c en 2013.	
Pic épeichette*	Chant du 16/01 au 03/09. Tambours surtout du 15/01 au 14/05 et <b>28/09-18/12</b>	
Alouette calandre**	Du 12/06 au 27/08. Nidif 2005 à Chanet de 3-4 c. Max : 32 le 31/07/05. 1 c du 08/05 au 10/06/06 à Chanet., 2 à Chanet le 03/04/07, 8 à Champerboux le 08/09/07, 1 à Chanet les 17/05/08 et 02/05/09.	
Alouette calandrelle**	Du <b>15/04</b> au 26/08. Chant du 27/04 au 29/07.	1 à Naussac le 04/05/86. Max : 6 le 26/05/80 à Hures.
Cochevis huppé (disparu)	Naussac : 11/06/83, 16/06/84. Les 24 et 30/07/89 à Saubert, le 23/09/97 au Villaret (Méjean), le 04/08/97 à Chanac.	
Alouette lulu**	Chant du 10/01-14/08 et 17/09-31/10. Juv apd 28/04.	Max : 34 ens. Le 24/10/03 les Vignes ; 281 en 2014 Puech Debon.
Alouette des champs**	Chant du 04/02 au 12/08. Becquées du 06/05 au 29/08.	Max : 264 le 10/01/10 à Booz ; 787 migration Puech Debon en 2011.
Alouette haussecol	1 le 18/10/03 au sommet de Finiels.	
Hirondelle de rivage*	Du 17/03 au 17/10. Très rare juin-juillet. Repro prob en 2008 à Florac.	Max annuel: 77 en 2015 ; 30 le 24/08/15 Malzieu
Hirondelle de rocher**	Surtout du 20/02 au 15/10, rare en hiver, toute l'année en 2012.	
Hirondelle rustique**	Du 03/03 au 09/11. Mig jusqu'au 24/05 et à partir du 03/08. Envol du 04/06 au 17/09. Repro inf. à 1340 m.	Max : 700 le 05/09/03 au Rozier. Max : 15 000 le 30/09/2012 Banassac et 18368 21/09/14 Puech Debon.
Hirondelle rousseline	3 le 22/05/79 vers Meyrueis, 1 le 26/06/05 à Saint-Urcize (Cantal) limite Lozère.	
Hirondelle de fenêtre**	Du <b>14/02</b> au 31/10. Envol du 04/06 au 12/09. Mig apd 20/08.	Max : 4000 le 28/09/93 à Chanac.
Pipit de Richard	2 le 26/09/2011 au Ségala, Fraissinet de Fourques.	
Pipit rousseline**	Du 11/04 au 15/10. Chant du 16/04 au 24/08. Parades dès le 23/04, becquée jus 07/08. Max 40 le 22/08/11 Méjean.	
Pipit des arbres**	Du 08/03 au 22/10, chant du 08/04 au 03/08. Migration jusqu'au 25/04 et à partir du 17/08.	Puech Debon : max de 74 le 31/08/14 et 258 en 2011 .
Pipit farlouse**	Chant du 26/02 au 22/07. Nourrissage jus 15/08.	Max : 394 le 05/04/14 au Puech Debon.
Pipit à gorge rousse	Du 03/04 au 18/05 et du 15/09 au 18/10 (38 données).	Max : 5 le 26/04/15 à Usanges et <b>53 le 17/04/16 Montbel</b>
Pipit spioncelle**	Chant du 25/04 au 07/08.	Max : 69 le 14/04/11 sur Méjean.
Bergeronnette printanière**	Du 11/03 au 20/10. Mig jusqu'au 30/05 et apd 12/08. ssp <i>flava, flavissima, thunbergi, cinereocapilla, iberiae.</i>	Max : 110 le 22/08/11 à Usanges. 6-8 c flava x iberiae (= centratlantique) sur Aubrac.
Bergeronnette citrine	1 m chanteur du 03 au 07/07/2012 à Usanges, Aubrac.	
Bergeronnette des ruisseaux**	Chant du 23/02 au 04/07. Envol juv apd 17/04-07/08.	Max : 10 ensemble.
Bergeronnette grise** <i>Bergeronnette de Yarell</i>	Chant du 20/02 au <b>26/06</b> . Mig du 01/02 au 05/04 et du 19/08 au 03/11. Envol du 05/06 au 20/09. Max de plusieurs centaines. <i>7 données en mars/avril (dernière en 2013)</i>	
Jaseur boréal	Total de 90 ind du 19/12/04 au 14/03/05.	Max : 34 le 13/02/05 à Rocles. 2 le 09/01/2009 à La Garde.
Cincla plongeur**	Chant du 17/09 au 10/05. Ponte à partir du 20/02 et envol juv du 05/02 au 26/07.	Max : 23 le 12/01/08 sur Truyère.
Troglodyte mignon**	Chant possible toute l'année. Envol juv du 16/04 au 21/08.	
Accenteur mouchet**	Chant possible toute l'année. Peu fréquent en hiver. Becquées 21/04-31/08.	Max 33 le 27/05/10 en 10 EPS à La Canourgue.
Accenteur alpin	Du 29/09 au 25/04. 1 chanteur le 10/05/08 à Serviès.	Max : 30 le 23/12/78 à La Malène.
Rougegorge familier**	Chant possible toute années. Poussins 23/03 - 27/08.	
Rossignol philomèle**	Du 06/04 au 16/09. Chant du 08/04 au 13/07. Rare au-dessus 1050 m en repro, max à 1250 m en migration.	
Gorgebleue à miroir	Du 04/03 au 13/04 et du 22/08 au 09/09. 14 mentions toutes de la ssp <i>cyanecula.</i>	
Rougequeue noir**	Chant du 27/01-21/12. Envol du 04/05-01/10. Max 6 juv.	Max de 40 + le 29/10/11 Barrandon.
Rougequeue à front blanc**	Du 20/03 au 14/10 et 1 le 04/11 (mort). Chant du <b>05/04</b> au 08/07. Nidif. jusqu'à 1260 m. Juv au nid un 30/08.	Max 10 le 05/09/13.
Tarier des prés**	10/04-21/10. Cht <b>17/04 -08/07</b> . Envol juv du 30/05- <b>10/09</b> . Mig jus	Max : 40 le 12/08/14 sur Aubrac.

	20/05 apd 13/08.	
Tarier pâtre**	Chant du 15/02 au 22/07. Envols du 27/04 au 21/09. Nourrissage jusqu'au 02/10. Jusqu'à 1541 m en repro.	
Traquet motteux**	Du 15/03 au 12/11. Chant du <b>06/04</b> au 04/07. Nourrissage du 20/05 au 25/08. ssp <i>leucorrhoea</i> prob Méjean: 14/09 au 08/10. Mig jus 19/05 et apd 15/08.	Max : 80 le 11/09/13 Sauveterre.
Traquet oreillard**	Du 10/04 au 26/09. Chant du 04/05 au 01/06. Nicheur encore en 2006 et 2013.	Max : 6 localement.
Traquet rieur (disparu)	Signalé au XIX ème siècle.	
Monticole de roche**	Du 30/03 au 26/09. Chant du 23/04 au 18/07. Envol juv du 11/06 au 13/08.	Max : 8 localement.
Monticole bleu**	Chant du 22/03 au 09/06. Nourrissage du 23/04 au 27/07.	Max : 5 ensemble. 1-10 couples, 5 possibles en 2016.
Merle à plastron**	Du 05/03 au 01/12; 23/12/1987, 16/12/09, 3 d en 12/2014, 1 le 28/01/98 à Fraissinet-de-L. Chant du 07/04 au 10/06.	Max : 200 les 02 et 03/04/94 à Mas-d'Orcières (Mont Lozère).
Merle noir**	Chant du 07/01 au 23/09. Nourrissages du 25/02 au 05/08.	Max : 31 le 13/12/08 à St Germain du Teil.
Grive litorne**	Nidif depuis 1984 du 26/04 au 10/07. Mig 19/09-13/04. Chant 12/05 au 24/06. Juv 14/06 au 07/07.	Max : 2700 le 12/12/04 à Bonnetcombe.
Grive musicienne**	Chant du 10/01 au 31/07. Mig jus. 29/03 et apd 01/10.	Max : 1600 le 05/03 en mig en 1 h à St Germain du Teil.
Grive mauvis	Du 08/10 au 11/04.	Max : 340 le 05/03 en mig à St Germain du Teil.
Grive draine**	Chant du 06/11 au 15/07. Nourrissage du 05/04 au 15/07.	Max : 204 le 21/03/04 à La Garde-Guérin en migration.
Bouscarle de Cetti*	Du 20/03 au 28/09 au Rozier jus. 2003, 13/07/85 à St Etienne VF, 1 le 04/10/01 à Pied-de-Borne, 02/11/2012 à Florac.	
Cisticole des joncs**	50 données : Chant 17/08/75 Méjean, 27/08/2008 aux Salhiens, + 15/09/09 Pt Sublime et repro 21/08/14 Allenc. 2 chanteuses 2015 Sauveterre et Ispagnac + SGTeil 28/09/15. <b>38 d pour 17 territoires du 23/05 au 18/12/2016</b>	
Locustelle tachetée*	Du 09/04 au 30/09. Chant du 12/04 au 29/07 et le 19/08.	Max 4 18/06/07 Finiels. 0 en 2012. <b>Nid 18/07/2016 Bonnetcombe</b>
Phragmite des joncs	21 mentions; 17/04/16, 01/05/86, 18/07/13 puis du 07/08 au 04/10.	Max 2 le 12/09/10 à Usanges.
Rousserolle effarvate	Du 27/04 au 27/10, 3 fois chants en juin jus 01/07.	Max 13 le 10/09/08 aux Salhiens.
Locustelle lusciniotide	Salhiens 22/09/2006 et Usanges 26/08/2013.	
Hypolaïs icterine	1 le 27/04/2009 à Booz ; 04/05/2012 à St G de Lévécac, 1 le 01/06/2015 à SGTeil	
Hypolaïs polyglotte**	Du 19/04 au 11/09. Chant du 19/04 au 16/07 jusqu'à 1250 m (adret)	Max : 8 chanteurs au Massegros le 02/06/10.
Fauvette à tête noire**	Chant du 05/01 au 07/11 jusqu'à <b>1450 m</b> . Nour. du 28/04 au 20/08 .	Max : 10 ensemble.
Fauvette des jardins**	Du 10/04 au 27/09. Chant du 25/04 au 01/08 surtout au-dessus 800 m.	
Fauvette babillarde	Récemment : 28/04/08 à Booz et du 24/08 au 24/09	
Fauvette orphée**	18/04-09/09 (et <b>23/09/16</b> ). Chant du 27/04 au 18/07 jusqu'à 1240 m (1460 m).	100-200 c estimés a minima.
Fauvette grisette**	Du 29/03 au 28/09. Chant du 02/04 au 01/08 jusqu'à <b>1600 m</b> .	Nour. 31/05-29/08.
Fauvette à lunettes**	Lande à buis. Du 05/05 au 31/07. Nidif. sûre Méjean 1982, 2007, 2015, <b>2016</b> prob tous les ans. Sauveterre : Caramonde, 2007 : 7 chtrs le 10/05 et repro sûre.	
Fauvette pitchou**	Chant du 01/03 au 30/07 et du 05/10 au 12/11. Notée jusqu'à 1200 m.	Max : 4 chanteurs le 01/04/02 aux Balmelles.
Fauvette passerinette**	Du 28/03 au 20/09. Chant du 08/04 au 12/07 jusqu'à 1140 m.	Max : 6 ensemble.
Fauvette mélanocéphale*	Du 25/03 au 30/10. Chant du 25/03 au 12/07 jusqu'à 500 m en Cévennes. Quelques mention sur Causses.	
Pouillot à grands sourcils	1 le 13/10/2012 à Booz, 1 le 21/11/2014 à SGTeil.	
<b>Pouillot brun</b>	<b>1 le 11/10/16 à Booz, St-Germain-du-Teil.</b>	
Pouillot de Bonelli**	Du 24/03 au 04/09. Chant du 24/03 au 20/08 jusqu'à 1380 m. Max de 20 chanteurs le 10/05/11 au Massegros.	
Pouillot siffleur**	Du 31/03 au 03/09. chants annuels à SGTeil en 05-06, 3 juv nourris 2007 les Hermaux, chanteurs Mont Lozère, Vébron, Mende selon années. Chênenaie, hêtraie 9000-1300 m.	
Pouillot véloce** <i>Pouillot de Sibérie</i>	Surtout du 01/03 au 01/11, rare en hiver. Cht <b>29/02-29/10</b> . <i>6 d : du 06/02 au 27/03 et 01/11/14.</i>	Max : n centaines le 21/03/98 sur le Tarn.
Pouillot fitis*	Du 19/03 au 30/09. Chant du 29/03 au 20/09. Nidif. à confirmer.	Max 22 le 10/09/10 à Booz.
Roitelet huppé**	Chant du 25/01 au 21/07 et du 02/09 au 14/10. Nourrissage jusqu'au 29/08.	Max : 23 le 19/11/2015 à Cabrunas
Roitelet triple bandeau**	Chant du 11/02 au 09/07 puis 30/08 au 18/09. En hiver : vallées sous 700 m surtout.	Max : 19 le 20/09/2013 Les Vignes
Gobemouche gris**	Du 22/04 au 28/09. Chant du 16/05 au 20/06. Envol juv du 22/06 au 23/08.	Max : 17 c dans Tarn en 2006.
Gobemouche noir**	Du 09/03 au 11/11 mais surtout du 18/04 au 26/09.	Max : 20 le 04/09/2013 La Canourgue.
Mésange longue queue**	Construction du nid apd 02/03 et envol 25/05- <b>02/08</b> .	Max : 30 ensemble 01/1998 et 06/2012 1 ssp <i>caudatus</i> le 12/12/10 sur le Méjean.
Mésange nonnette**	Chant du 16/12 au 18/07 puis du 28/08 au 06/11.	Max : 8 le 21/01/13 Bagnols les Bains.
Mésange boréale	À confirmer : 1 le 20/03/93 St Bonnet-de-C, le 30/03/98 au Mt Aigoual, Vébron en 1985, 1 le 21/10/02 au col de la Banette, 1 le 19/04/05 Canilhac, 4 d Pont-Archat 18/02 au 23/03/06 et 30/12/06, 2 le 23/01/08 à Luc.	
Mésange huppée**	Chant du 09/12 au 10/08 et 04-31/10 de 600 m à 1550 m.	Max : 25 le 06/10/12 La Villedieu.
Mésange noire**	Chant toute l'année . Nourrissages du 26/04 au 25/08.	Max : 60 en 02/2005 et 10/2012.
Mésange bleue**	Chant du 09/12 au 11/10. Envol juv du 12/05 au 30/07. Max : 11 pulli à Marvejols le 30/05/10.	Max : Mig 28/09 au 11/11. Puech Debon : Max 416 en 2012 et 149 le 21/10/12 .
Mésange charbonnière**	Chant toute année mais surtout 10/01-30/05. Poussins 13/04 au 27/08.	Max : 10 <i>pulli</i> le 09/05/00 à Pied-de-Borne. 34 mig 21/10/12 Puech Debon.
Sittelle torchepot**	Chant du 23/12 au 26/10. Envol apd 12/05.	Max : 6 ensemble.
Tichodrome échelette	Du 11/10 au 21/04. 1 le 14/06/98 à Rochefort (Florac) et le 20/06/07 à Ispagnac.	Max 3 le 29/10/06 et 13/11/10.
Grimpèreau des bois**	Chant du 08/01 au 24/07 de 800 à 1440 m. 3 nourrissages notés du 10/05 au 12/07.	
Grimpèreau des	Chant toute l'année. Nidif. du 17/03 au 21/07. Rare au-dessus de 1230 m.	

jardins**		
Rémiz penduline	1 le 14/04/2011, 14/03/12 Malzieu, 8 le 02/10/15 lac du Born, <b>1 le 07/10/16 Banassac, 2 le 02/11/16 Moulinet</b>	
Loriot d'Europe**	Du <b>16/04</b> au 16/09. Chant du <b>16/04</b> au 01/08. Repro vallée du Lot/Banassac et Tarn/Le Rozier.	
Pie-grièche écorcheur**	Du 21/04 au 03/10. Chant du 08/05 au 22/07 jusqu'à 1350 m. Envol juv du 12/06 au <b>03/09</b> .	Max : 20 le 20/08/06.
Pie-grièche à poitr. rose	Dernière mention vers 1970. 1 le 19/07/2014 à Arzenc-de-Randon.	
Pie-grièche grise**	Max 5 juv. Chant apd 07/03. Nour. jusqu'au 23/08. 30-60 couples. Hivernage du 26/08 au 27/03. max <b>385</b> d en 2016	
Pie-grièche méridionale**	Chant du 17/01 au 26/06 et du 21/08 au 18/10. Envol juv (max 5) 20/05-13/08. 30-60 couples.	
Pie-grièche à tête rousse*	Du <b>13/04</b> au 27/05 en mig sinon jusqu'au 24/08.	Max : 8 c St Chély-d'A 1977-1978. Nidif. j' 1994 prob.
Geai des chênes**	Chant du 20/04-24/06. Nour. 27/05-01/08	Max : 41 le 24/02/05 à St Germain-du-Teil.
Pie bavarde**	Envol 11/05-31/07.	Max : 46 le 03/01/10 à Booz en dortoir. Jus. 1300 m.
Cassenoix moucheté	Nidif 1977 Méjean. 08/82, 1987 (3 dont 1 <i>macro</i> . 30/05/87), 1999, 1 09/10/05, 16/10 et 06/12/07 Mt Lozère. 1 <i>macro</i> . 22/08/08 à Barre. 2012 : 12 du 04/08 au 09/01, max 4 La Blatte 2012 et 1 20/09/2015 ; 1 le 26/09/14 Les Bondons. <b>1 16/05/2016 Ribennes.</b>	
<b>Chocard à bec jaune</b>	<b>1 circonstancié le 07/04/2016 aux Vignes</b>	
Crave à bec rouge**	Parade à partir du 04/03. Envol juv à partir du 04/06.	Max : 310 le 25/07/04 à Frépestel (Méjean).
Choucas des tours**	Max : 30 couples 2010 à Canilhac. Parade apd 19/02.	Max : 1200 le 10/11/89 en dortoir à Mende.
Corbeau freux	40 le 17/03/85 en dortoir à Mende et 7 le 22/02/2015 à St Germain du Teil	
Corneille noire**	Incub. apd 28/03, envol juv 17/05-19/07. 1200 m max.	Max : 800 en dortoir le 24/01/84 à Langogne.
Corneille mantelée	07/02 -11/04/94 Florac, 09/11/95 St Ch.-d'A, 16/10/98 Marvejols, 30/01/09 Langogne, 29/10/10 St P des Tri.	
Grand corbeau**	Juv du 08/02 au 29/07. Max : 6 juv à envol.	Max : 400 à La Parade en 02/97.
Etourneau unicolore**	Méjean (11 mentions) : 1 le 18/07/2011 ; 03/08 et 04/10/12, 20/05 au 04/06/13, 5 d en 2015 dont repro à Niveliers	
Etourneau sansonnet**	Nour 17/04-07/07, juv apd 11/05. Chant 07/01-29/05.	Max : 70 000 le 30/11/11 sur Aubrac.
Etourneau roselin	5 le 03/06/02 à St Laurent-de-Trèves, 1 le 04/06/02 à Drigas.	
Moineau domestique**	Nourrissages du 26/03 au 27/08.	Max : 80 le 5/02/2014 Blavignac.
Moineau friquet**	Mende, Lanuéjols, Le Born, alentours St Chély d'A.	Max : 50 le 25/02/05 à Rimeize.
Moineau soulcie**	Du 09/02 au 28/12. Hivernage 2013/2014. Nourrissages du 01/06 au 13/07 jus 1230 m.	Max : 160 le 26/08/01 à Niveliers.
Niverolle alpine	Du 30/10 au 03/04 ; hivernage en 1968,1978 et 1980.	Max : 50 le 01/12/72 sur le Méjean.
Pinson des arbres**	Chant du 02/02 au 07/08. Nour. 22/04-08/08. Mig 27/01-05/05 et 27/08-26/11.	Max : 6000/h le 10/03/00 à Servières.
Pinson du Nord	Du 03/10 au 12/04. 1 le 29/04/01 à St R. de D. et 07/05/11 Bonnacombe.	Max : 500 000 le 09/02/05 à Mas-d'Orcières.
Serin cini**	Du 10/02 au 27/11 ; 21-30/12. Chant du 23/02 au 07/08 et du 24/08 au 02/11. Envol du 09/05 au 03/09 jus. 1265 m.	Max : 200 le 17/10/03 au Rozier.
Venturon montagnard*	Chant du 12/01 au 10/07. Envol du 19/05 au 08/07.	Max : 98 le 14/11/99 à Servières.
Verdier d'Europe**	Chant du 04/02 au 29/07. Nour. du 22/04 au 16/08.	Max : 200 le 09/03/03 au Massegros en migration.
Chardonneret élégant**	Chant du 04/01 au 16/08. Nour. du 25/04 au 23/09.	Max : 300 le 19/09/01 au Mazet (Lachamp).
Tarin des aulnes*	Hivernants du 12/09 au 21/05. Repro pos. apd 2003	Max : 400 le 02/04/00 Mende.
Linotte mélodieuse**	Chant du 18/03 au 31/07. Nour. du 24/05 au 27/08.	Max : 359 le 28/02/2014 sur le Méjean.
Sizerin flammé	33 mentions du 22/10 au 08/04, 1 ssp <i>cabaret</i> 27/01/03 à Pied-de-B.	33 le 26/01/2014 Naussac, 11 d 2014.
Bec-croisé des sapins**	Chant du 02/10 au 06/08. Nour. 04/01-08/10. repro hiver 2014/15	Max : 300 le 31/08/00 à Charpal.
Roselin githagine	1 mâle le 30/05/2015 au Peyrou, Saint-Julien-du-Tournel, 1320 m	
Bouvreuil pivoine**	Chant du 11/01 au 18/07. Nourrissages du 19/05 au 31/08.	Max : 20 en 01/10 à Bagnols les Bains.
Bouvreuil trompette	Du 24/11 au 11/12.	
Grosbec casse-noyaux*	Repro rare. Surtout du 20/09 au 20/03. Max 100 le 04/02/13 et 23/01/15 Montrodât ; Puech Debon : 1394 mig 2013 et 605 le 21/10/13.	
Bruant des neiges	12 données (5 en 2013) du 28/11 au 17/03 ; Mt Lozère : 7 données (4 en décembre) ; max 8 le 07/02/99 ; Naussac: 1 le 28/11/10 ; Méjean : 1 f 12/01/11 et 5-6/12/13.	
Bruant jaune**	Chant du 15/02 au 20/08. Nour. du 16/04 au 01/09.	Max 200 le 16/12/97 Marvejols, 30/10/13 Mt Lozère.
Bruant zizi**	Chant du 18/01 au 06/12. Envol juv 30/04-28/09.	Max de 20
Bruant fou**	Chant du 15/02 au 23/07. Envol juv du 31/05 au 18/08.	Max : 20 le 27/03/84 à Mende et 21/09/08 col du Sapet.
Bruant ortolan**	Du 17/04 au 29/09 . Chant du 26/04 au 03/08. Ponte jusqu'au 15/07.	Max : 30 bagués le 04/09/97 au Buffre.
Bruant des roseaux**	Mig du 20/02 au 22/04 et du 20/09 au 14/11. Chant du 18/03 au 14/07. Hiv. Booz de 2006-07 à 2011-12.	Max : 80 ensemble le 11/03/05 à Marvejols.
Bruant mélanocéphale	Le Pompidou : 1 m le 10/08/91, Champerboux : 1 m le 26/06/98, 1 fem le 10/05/02 ; Niveliers 1 m chtr 22/06 au 26/06/02 avec 1 fem pos ; 1 m 20/07/2013.	
Bruant proyer**	Du 10/03 au 28/11. Chant du 11/04 au 26/07 jusqu'à 1230 m.	Max : 154 chanteurs 2015 ; 100-200 c.

## Exotiques / échappés

Pélican frisé	1 le 16/07/2004 au Monastier
Faisan vénéré	1 en mars 2008 à Marvejols
Bernache du Canada	1 durant l'automne 1998 à Naussac
Canard mandarin	1 le 14/05/1990 Naussac, 1 fem adulte le 10/09/2003 à Booz, présence à Ste Cécile d'A. et Mende (depuis 2009)
Canard carolin	2 en vol le 16/03/2009 à Banassac
Vautour de Rüppel	1 le 06/06/2004 aux Vignes, 1 le 31/05/2005 à La Canourgue et 1 le 12/09/2009 sur le Méjean (échappés de volière)
Serin du Mozambique	1 du 10/12/2004 au 04/01/2005 à Pied-de-Borne (mangeoire)
Perruche ondulée	1 le 30/06/2000 au Mazet

### Bilan de l'inventaire des oiseaux de Lozère au 31 décembre 2014

316 espèces d'oiseaux recensées : 308 sauvages et 8 échappées de captivité ou de populations férales.

159 espèces nicheuses certaines\*\* et possibles/probables\*, au moins une fois depuis 50 ans (dernières : Cisticole des joncs et Elanion blanc en 2014, **Faisan de Colchide en 2016**).

28 nouvelles espèces depuis l'Atlas 2000 : Bernache nonnette, Labbe pomarin (2000) ; Avocette (2001), Étourneau roselin (2002), Alouette haussecol (2003), Busard pâle (2004), Jaseur Boréal, Bergeronnette de Yarell (ssp), Alouette calandre, Faucon crécerellette (2005), Locustelle luscinoïde (2006) Aigle Impérial (2008), Canard carolin, Hypolaïs ictérine, Harelde boréale (2009), Rémiz penduline, Étourneau unicolore, Pipit de Richard (2011), Marouette poussin, Gypaète barbu (réintroduction), Bergeronnette citrine, Labbe parasite (2012), Chevalier stagnatile (2014), Roselin githagine (2015), **Chevêchette d'Europe (mars 2016), Glaréole à collier 03/04/2016, Chocard à bec jaune 07/04/2016, Pouillot brun 11/10/2016**

Max : 223 espèces en 2008, 224 en 2012, 226 en 2015, **236 en 2016**